

Biopsia Estereotáctica de Seno con Aguja Gruesa

Basado en los resultados de su última mamografía, el doctor (radiólogo) sugiere una biopsia estereotáctica con aguja gruesa. Durante este procedimiento extraeremos nuestras de tejido del seno usando una aguja gruesa. El doctor guía la aguja hacia el sitio correcto usando imágenes de mamografía.

Antes de la Biopsia

Una enfermera del Centro del Seno revisará con usted todos sus medicamentos recetados y de venta libre. Es posible que deba suspender los medicamentos anticoagulantes (para adelgazar la sangre) antes de la biopsia. La enfermera le explicará todo esto.

Usted puede tomar Tylenol® si lo necesita (si no sufre de enfermedad hepática).

La enfermera le preguntará sobre sus alergias.

Usted permanecerá despierta durante la biopsia. Si desea algo que le ayude a relajarse antes, por favor llame a su doctor primario con anticipación. Si usted decide tomar un medicamento, debe venir con alguien que pueda llevarla a casa. Usted no debe conducir ni tomar decisiones importantes hasta el día siguiente.

Usted no necesita estar en ayunas antes de la biopsia. Si tiene diabetes, siga su rutina normal de cuidados.

Vístase con una vestimenta de dos piezas. Le pediremos que se desvista de la cintura hacia arriba.

No use talco, lociones o desodorante en los senos ni en el área de las axilas.

Permanecerá en el Centro del Seno por aproximadamente 2 horas.

Durante la Biopsia

Usted se sentará en una silla especial que puede ser colocada en diferentes ángulos para permitir acceso al lugar de su seno en el que se hará la biopsia.

Su seno se mantendrá en su lugar usando compresión con unas paletas, similares a las que se usan para las mamografías. Realizaremos una mamografía. Esto nos ayudará a localizar el sitio correcto para la biopsia. El personal se colocará detrás de un escudo protector. Le pediremos que no respire. Se le pedirá que contenga la respiración y permanezca lo más quieta posible.

Limpiaremos la piel de su seno con un antiséptico. Esto puede sentirse frío.

Le inyectaremos un medicamento anestésico (Lidocaína) en su seno. Podría sentir un ardor.

El doctor (a) realizará un corte pequeño en la piel de su seno y luego insertará la aguja. Usted podría sentir presión cuando se coloca la aguja, pero no debería sentir dolor. Si siente dolor, avísele a nuestro personal.

Usted escuchará un zumbido producido por la máquina de las biopsias cuando tomamos las muestras. Mandaremos las muestras al laboratorio.

Después de la biopsia colocaremos un pequeño marcador de titanio en el seno. Servirá para marcar el área de la biopsia. Si usted necesita una cirugía en el futuro, este guiará al doctor (a) hacia el lugar correcto.

Si no necesita una cirugía, el clip permanecerá en ese sitio. Usted podrá verlo en mamografías futuras. No existen riesgos conocidos por llevar un clip. Los detectores de metales o las imágenes por resonancia magnética no afectarán a estos marcadores. Se realizará una mamografía final para ver la ubicación del marcador.

Extraeremos la aguja de su seno. Podría presentar un sangrado escaso. Aplicaremos presión hasta que el sangrado se detenga. Cubriremos el sitio con tiras delgadas de cinta adhesiva (Steri-strips) y le colocaremos una compresa fría por alrededor de 10 minutos. Se le pedirá que se siente por unos 10 a 15 minutos para asegurarnos de que no haya problemas con el sitio de la biopsia.

Cuidados del Sitio de la Biopsia

- Aplique hielo por 20 a 30 minutos, por lo menos 3 veces durante el día de la biopsia. Luego use hielo cuando lo necesite para reducir la hinchazón
- Use un sostén que le de soporte, como un sostén deportivo, por 24 a 48 horas.
- Puede retirar el vendaje de gasa sobre el sitio de la biopsia al día siguiente. Tendrá unas tiras delgadas de cinta o “Steri-Strips” sobre el sitio. Estas se despegarán y se caerán por sí solas en unos 5 días. Si aún siguen ahí después de 5 días, usted puede despegarlas con cuidado.
- Usted puede ducharse a la mañana siguiente. No se sumerja en una bañera o una piscina por 48 horas.

Dolor

Usted podría sentir algo de dolor y presentar moretones. Esto debería desaparecer más o menos en una semana. Puede tomar Tylenol durante las primeras 24 horas si no tiene

problemas al hígado. Puede volver a tomar aspirina o ibuprofeno 24 horas después de la biopsia (si no hay signos de sangrado) o según las indicaciones de su doctor(a).

Anticoagulantes

Pregunte a su doctor(a) cuándo puede volver a tomar Coumadin[®], aspirina u otros anticoagulantes (medicamentos para adelgazar la sangre).

Actividad

Evite movimientos vigorosos con el brazo y levantar mucho peso por 24 horas. Puede volver a su rutina normal al día siguiente o cuando se lo indique su doctor (a).

Resultados

Los resultados de su biopsia estarán listos en 3 a 4 días hábiles. Su doctor(a) o el personal del Centro de Seno le llamarán para entregárselos.

Cuando debe llamar

- Fiebre de más de 100.4°F en dos lecturas tomadas con 4 horas de diferencia
- Aumento de la hinchazón, endurecimiento, enrojecimiento o calor en el área
- Pus alrededor del sitio de la biopsia
- Sangrado abundante en el sitio de la biopsia

A Quien Llamar

Llame a su doctor (a) o al Centro del Seno si tiene preguntas o preocupaciones sobre su atención.

Centro del Seno de UW Health en el Centro de Ciencias Clínicas (Highland Avenue)
Lunes a viernes, 8:00 am a 4:30 pm
608-266-6400

Después del horario de oficina, llame al **608-262-2122**. Pida hablar con el radiólogo de guardia. Dé su nombre y número telefónico con el código de área. El doctor (a) le regresará la llamada.

Centro del Seno de UW Health en 1 S. Park Street
Lunes a viernes, 8:00 am a 4:30 pm
608-282-8190

Después del horario de oficina, llame al **608-417-6000**. Pida hablar con el radiólogo de guardia en el Hospital Meriter/Unity Point.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 7/2020 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#7933.

Stereotactic Core Needle Breast Biopsy

Based on the results of your last mammogram, the doctor (radiologist) suggests a stereotactic core needle biopsy. In this procedure, we remove breast tissue samples with a core needle.

Before the Biopsy

A Breast Center nurse will review all prescribed and over-the-counter medicines. You may need to stop blood thinners before the biopsy. The nurse will discuss this with you. You may take Tylenol® as needed, if you do not have liver disease. The nurse will also review all allergies.

You will be awake for the biopsy. If you would like something to help you relax before the biopsy, please contact your primary doctor in advance. If you take this medicine, you must have someone drive you home. Do not drive or make important decisions until the next day.

You do not need to fast before the biopsy. If you are diabetic, follow your normal care routine.

Wear a two-piece outfit. We will ask you to undress from the waist up.

Do **not** wear talcum powder, lotions or deodorant on the breast and underarm area.

Your stay at the Breast Center will be about 2 hours.

During the Biopsy

You will sit in a special chair that can be positioned at different angles to allow access to the spot of your breast to be biopsied.

Your breast will be held in place by compression with paddles, like when you have a mammogram. We will take mammograms. This will help us locate the correct site for biopsy. Staff will step away behind a shield. We will ask you to hold your breath and be as still as you can.

We will clean your breast with an antiseptic. This may feel cool on your skin.

We will inject a numbing medicine (Lidocaine) into your breast. You may feel a sting.

The doctor will make a small nick in the skin of your breast and then insert the needle. You may feel pressure as this needle is placed, but should not feel any pain. If you do feel pain, let the staff know.

You will hear a whirring sound from the biopsy machine as we take the samples. We will send the samples to the lab.

After the biopsy, we will place a small titanium marker in the breast. This will mark the area of the biopsy. If you need a future surgery, this will help guide the doctor to the right spot. If you do not need surgery, the clip will stay in place. You can see it on future mammograms. There are no known risks with having the marker. Metal detectors or MRIs will not affect this marker. You will have a final mammogram to look at the placement of the marker.

We will remove the needle from your breast. You may have some light bleeding. We will apply pressure until it stops. We will cover the site with thin strips of tape (Steri-strips) and apply an ice pack for about 10 minutes.

Site Care

- Apply ice for 20-30 minutes at least 3 times the day of the biopsy. Then, use ice as needed to reduce swelling and pain.
- Wear a support bra, like a sports bra, for 24-48 hours.
- You may remove the gauze bandage over the biopsy site the next day. You will have thin strips of tape or Steri-Strips over the site. These will loosen and come off on their own in about 5 days. If they are still in place after 5 days, you may gently peel them off.
- You may shower the next morning. Do not soak in a bath or pool for 48 hours.

Pain

You may have some pain and bruising. It should go away in about a week. You may take Tylenol® for the first 24 hours if you do not have liver problems. You may resume taking aspirin or ibuprofen 24 hours after the biopsy (if no signs of bleeding) or as directed by your doctor.

Blood Thinners

Ask your doctor when you can resume taking Coumadin®, aspirin, or other blood thinners.

Activity

Avoid forceful arm movements and heavy lifting for the first 24 hours. You may resume your normal routine the next day or as directed by your doctor.

Results

Your biopsy results should be ready in 3-4 working days. Your doctor or the Breast Center staff will call you with your results.

When to Call

- Fever over 100.4° F for two readings taken 4 hours apart
- Increased swelling, firmness, redness or warmth
- Pus around the site
- Heavy bleeding from the site

Who to Call

Call your doctor or the Breast Center if you have questions or concerns about your care.

UW Health Breast Center at the Clinical Sciences Center (Highland Avenue)
Monday-Friday, 8:00 am to 4:30 pm
608-266-6400

After hours, call **608-262-2122**. Ask for the radiologist on call. Give your name and number with the area code. The doctor will call you back.

UW Health Breast Center at 1 S Park Street
Monday-Friday, 8:00 am to 4:30 pm
608-282-8190

After hours, call **608-417-6000**. Ask for the radiologist on call at Meriter/Unity Point Hospital.