

# Omvårdnad 2

ISBN 978-91-47-14519-5


Tyvärr är bedömningsunderlag för beteendeskalan Abbey Pain Scale på sidan 65 felaktig. Vi beklagar detta.

Nedan syns den korrekta versionen som även finns tillgänglig i följande länk:

<https://palliativregistret.se/media/ptegvyh5/aps-roag.pdf>

**Abbey Pain Scale-SWE – För bedömning av tecken på smärta hos personer med demenssjukdom som inte kan uttrycka smärta i tal. Observera personen och gör en bedömning med hjälp av frågorna.**

**Inte alls=0 Lite=1 Måttligt=2 Mycket=3**



1. Ljuduttryck – t ex gnyr, jämrar sig, gråter	<input type="checkbox"/>
2. Ansiktsuttryck – t ex ser spänd ut, rynkad panna/ihopdragna ögonbryn, grimaserar, ser rädd ut	<input type="checkbox"/>
3. Förändrat kroppsspråk – t ex rastlös, vaggar, skyddar en kroppsdel	<input type="checkbox"/>
4. Förändrat beteende – t ex ökad förvirring, vill inte äta, förändring i det vanliga beteendemönstret, tillbakadragen	<input type="checkbox"/>
5. Fysiologisk förändring – t ex förändrad kroppstemperatur, puls/BT, svettningar, rodnad, blekhet	<input type="checkbox"/>
6. Kroppslig förändring – t ex hudskador, trycksador, artrit, kontrakturer	<input type="checkbox"/>

Typ av smärta: Långvarig  Akut

Ingen=0 – 2 Mild=3 – 7 Måttlig=8 – 13 Svår=14+

Summa:

Framtagen av universitetslektor Christina Karlsson, Örebro universitet  
Originalskala: Abbey J, Piller N, De Bells et al (2004) The Abbey pain scale: a 1-minute numerical indicator for people with end-stage dementia. Int J Palliat Nurs 10(1): 6–13