

Circuncisión (Pediatria)

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico realizado para extirpar el prepucio, la piel que cubre el extremo del pene. La cirugía se realiza en la sala de operaciones bajo anestesia. La circuncisión puede realizarse a cualquier edad. Su hijo podrá irse a casa el mismo día de la cirugía. Este folleto le explicará cómo cuidar a su hijo en casa después de la circuncisión.

Beneficios

- Previene o trata la Fimosis. Fimosis es cuando la piel del extremo del pene es demasiado estrecha y no puede empujarse hacia atrás para exponer la cabeza del pene. Es normal que la piel no pueda empujarse hacia atrás en bebés y niños pequeños y, con frecuencia, no es posible hacerlo hasta la pubertad.
- Prevenir o tratar la Balanitis. La Balanitis es el enrojecimiento, hinchazón e irritación de la cabeza del pene.
- Para disminuir el riesgo de infecciones del tracto urinario en bebés varones.

Cuidados en Casa

El pene se verá rojo, hinchado y puede supurar una pequeña cantidad de sangre o líquido después de la cirugía, esto es normal. Use acetaminofén (Tylenol®) para el dolor. Su doctor puede recetar un medicamento más fuerte si su hijo es mayor.

Su hijo puede tener un vendaje sobre el pene. Este debe quitarse en casa en 48 horas. Después de quitar el vendaje, aplique Vaselina en el sitio de la cirugía varias veces

al día o con cada cambio de pañal, por 5 días. Si su hijo tiene puntos de sutura, estos se disolverán en 2 a 4 semanas.

Su hijo puede tener dolor con los cambios de pañal. Limpie suavemente el pene. El dolor mejorará a medida que el pene sane, en aproximadamente una semana.

Su hijo puede bañarse según las instrucciones de su doctor, en 24 a 48 horas. Los baños frecuentes ayudan a que la piel del pene sane y pueden aliviar a su hijo. Su hijo tendrá puntos de sutura. Los puntos se disolverán por sí solos, generalmente en 2 a 4 semanas, pero puede demorar hasta 90 días.

Actividad

- No debe usar juguetes para montar, jugar brusco o nadar por 2 a 3 semanas.
- Su hijo podrá realizar otras actividades cuando se sienta cómodo.

A Quién Llamar

Por favor, llame a la clínica o al doctor si tiene cualquier problema.

Clínica de Urología Pediátrica
Lunes a viernes, de 8:00 am a 4:30 pm,
(608) 263-6420

Fuera del horario regular de consulta, por la noche y durante el fin de semana, el número de teléfono será contestado por el operador de pagers. Pregunte por el residente de Urología de guardia. Proporcione su nombre y número de teléfono con el código del área. El doctor le devolverá la llamada.

El número gratuito es **1-800-323-8942**

Pediatric Circumcision

Circumcision is a surgical procedure to remove the foreskin, the skin covering the end of the penis. Surgery is done in the operating room under anesthesia or in our Pediatric Sedation Clinic. Circumcision may be done at any age. Your child can go home the same day. This handout will tell you how to care for your child at home after circumcision.

Home Care

The penis will be red, swollen, tender and may ooze a small amount of blood or fluid after surgery. This is normal.

Use acetaminophen (Tylenol®) and ibuprofen (Motrin) for pain. Your doctor may prescribe stronger pain medicine if your child is older.

Your child may have a bandage over the penis. This should be removed at home in 48 hours. After the bandage comes off, apply large amounts of Vaseline or petroleum jelly to the site a few times a day, for 5-7 days and after every bath. For infants, apply it with each diaper change.

Your child may have pain or tenderness with movement or diaper changes. Gently wipe the penis with water and soap. Pain will lessen as the penis heals, usually in about a week.

Your child may bathe as instructed by your doctor, within 24-48 hours. Frequent bathing helps the penile skin to heal and may comfort your child. Recommend baths with warm soapy water for 5-10 min 1-2 times daily to help the area heal.

Your child will have stitches. The stitches will dissolve on their own, usually in 2-4 weeks depending on how often your child is bathing, but may last up to 90 days.

Activity

- No straddling, rough play or swimming for 2-3 weeks.
- Your child may do other activities when he feels comfortable.

When to Call

If you have any problems, please call your clinic or doctor.

Who to Call

Pediatric Urology Clinic
Monday-Friday, 8:00 am to 4:30 pm
608-263-6420

The toll-free number is **1-800-323-8942**.

After hours, nights and weekends, the clinic number will be answered by the paging operator. Ask for the Urology Resident on call. Give your name and phone number with the area code. The doctor will call you back.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 2/2022 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF5745s.