

Cuidados de la Zona Donante

Para todas las zonas donantes

- Observe si tiene signos o síntomas de infección:
 - Aumento del enrojecimiento (más de 1 pulgada de ancho) y la hinchazón alrededor de la zona donante
 - Líquido maloliente que sale de la zona donante
 - Síntomas parecidos a la gripe (fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos, dolores musculares)
 - Aumento del dolor

El cuidado de la zona donante con un vendaje *Mepilex*[®] *Ag*

Mepilex[®] es un vendaje de espuma absorbente con una capa de silicona con plata que se adhiere a piel intacta y no se pega a heridas abiertas.

- Deje colocado el vendaje de la zona donante hasta que regrese a la clínica. Manténgalo limpio y seco.
- Debe llamar al número indicado al final de este folleto y regresar a la clínica para que le revisen el vendaje si se presentan alguno de estos problemas. Es posible que sea necesario cambiar el vendaje:
 - El vendaje externo se satura con demasiado líquido que sale del área donante.
 - Se moja el vendaje externo.
 - El vendaje se ha desprendido, exponiendo la zona donante abierta
 - Observe si tiene signos y síntomas de infección. (Vea arriba)

El cuidado de la zona donante después que se ha removido el vendaje *Mepilex*[®] *Ag*

- Lave el área con agua y un jabón suave a partir de _____
- Trate las áreas abiertas con Bacitracin y Cuticerin.
- Aplique loción hidratante _____ para prevenir que la zona donante recién cicatrizada se seque o se agriete
- Observe si tiene signos y síntomas de infección. (vea arriba). Llame al número que aparece al final de este folleto si nota alguno de estos problemas.

El cuidado de la zona donante cicatrizando por primera intención

- Mantenga la zona cubierta hasta _____ con el primer vendaje.
 - Una vez que se retire el vendaje, deje la zona de la incisión expuesta al aire.
 - Si se usan *steri-strips* (cintas finas de color blanco encima de la incisión), no las quite hasta que se suelten y despeguen por sí solas. Esto demora aproximadamente una semana.
 - Puede ducharse el _____.
- No se bañe en la tina.**
- Observe si tiene signos y síntomas de infección. (vea arriba). Llame al número que aparece al final de este folleto si nota alguno de esos problemas.

El cuidado de la zona donante ya cicatrizada

- Lave el área con agua y un jabón suave.
- Aplique loción _____.
- Aplique compresión _____.

Números de teléfono

Si tiene preguntas de lunes a viernes, de 8:00 am y 5:00 pm, por favor llame a la Clínica de Cirugía General y Quemaduras al **608-263-7502**.

Si tiene preguntas o necesidades urgentes después de las horas regulares de servicio o durante el fin de semana, por favor llame a las Enfermeras de la Unidad de Quemados al **608-263-1490**, o al **608-262-2122** y pida que llamen al residente de quemados.

Si tiene preguntas o necesidades no urgentes después de las horas regulares de servicio o durante el fin de semana, por favor deje un mensaje para la enfermera de evaluaciones telefónicas de Cirugía General llamando al **608-890-9542**.

Si vive fuera de esta área, llame al **1-800-323-8942**.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 8/2019 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#5825s.

Donor Site Care

For All Donor Sites

Watch for signs and symptoms of infection:

- Increased redness (over 1 inch in width) and swelling around the skin graft.
- Foul smelling or blue-green colored drainage from the skin graft.
- Flu-like symptoms (fever, chills, nausea or vomiting, muscle aches).
- Increased pain.

Care of a Donor Site with a Mepilex[®] Ag Dressing

Mepilex[®] is an absorbent foam dressing with a silicone layer with silver that adheres to intact skin and does not stick to open wounds.

Leave the donor site dressing in place until you return to clinic. Keep it clean and dry.

Call us and return to clinic to have your dressing checked if any of these problems occur. Your dressing might need to be changed:

- Outer dressing becomes soaked with too much drainage from the donor site.
- Outer dressing gets wet.
- Dressing comes off, exposing the open donor site.
- Watch for signs and symptoms of infection (see above).

Care of a Donor Site After the Mepilex[®] Ag Dressing Is Removed

- Wash the area with mild soap and water starting on _____.
- Treat open areas with bacitracin and Cuticerin.
- Apply lotion _____ to keep a newly healed donor site from drying out and cracking.
- Watch for signs and symptoms of infection. Call us if you notice any of these problems.

Care of Primary Closure Donor Site

- Keep the site covered with the first dressing until _____.
- Once the dressing is removed, leave the incision site open to the air.
- If Steri-strips are used (thin white tapes across your incision), do not remove them until they loosen and fall off on their own. This takes about one week.
- You may shower starting on _____. **No tub baths or soaking in water.**
- Watch for signs and symptoms of infection. Call us if you have any problems.

Care of a Healed Donor Site

- Wash the area with mild soap and water.
- Apply lotion _____.
- Apply compression _____.

Phone Numbers

For question Monday through Friday 8 am - 5 pm please call the General Surgery and Burn Clinic at **608-264-8040**.

If you have urgent questions or needs after hours or on weekends, call the Burn Unit Nurses at **608-263-1490** or call **608-262-2122** and ask to have the Burn resident paged.

If you have non urgent questions or needs after hours or on weekends, please leave a message for the General Surgery triage nurse at **608-890-9542**.

If you live out of the area, you can call toll free at **1-800-323-8942**.