

Procedimiento de Escisión Electroquirúrgica con Asa (PEEA)

El PEEA (LEEP por sus siglas en inglés) es un procedimiento realizado para extraer tejido anormal del cuello del útero (matriz) que puede realizarse en la consulta del médico o el hospital. Este folleto le informa sobre qué esperar antes, durante y después del procedimiento.

Antes del PEEA

- No se aplique cremas ni geles en la vagina durante al menos 2 días antes del examen.
- No tenga relaciones sexuales ni use una ducha vaginal un día antes del examen.
- Si va a tener su periodo menstrual durante el procedimiento, por favor llame a la clínica para comprobar si necesita reprogramar la cita.
- Por favor, informe al personal de la clínica antes del procedimiento si es posible que esté embarazada.
- No necesita tomar medicamento para el dolor, pero puede tomar 3 pastillas de ibuprofeno (de 200 mg cada una) o 2 pastillas de Aleve® (de 220 mg cada una) una hora antes.
- Consuma una comida ligera o una merienda al menos una hora antes de su visita (no venga en ayunas).

Durante el PEEA

Para realizar el PEEA, usted se desvestirá de la cintura para abajo y se acostará en la misma posición que tendría durante un examen pélvico. El/la doctor/a introducirá un espéculo. Para ayudar a prevenir el dolor, usaremos un medicamento para anestesiarse el cuello uterino. El/la doctor/a entonces usará un asa de alambre para extraer una capa delgada de tejido anormal del cuello uterino.

Usted podría sentir un dolor sordo o calambres.

El PEEA durará aproximadamente 30 minutos y podrá irse a casa cuando termine. Por favor, haga una cita de seguimiento en la clínica en cuatro semanas o cuando se lo hayan indicado.

Cuidados posteriores al PEEA

- Usted podría tener secreción vaginal de color entre café y negro (parecido a los desechos de café). Esto se debe al medicamento que usamos para prevenir el sangrado. También es posible que esta secreción tenga un olor metálico.
- Podría tener secreción vaginal o manchado durante un máximo de 4 semanas.
- No debe usar tampones, duchas vaginales ni tener relaciones sexuales durante 4 semanas.
- No debe nadar en una alberca, jacuzzi o lago durante 2 semanas.
- Puede bañarse o ducharse.
- Puede reanudar su rutina normal conforme pueda tolerarla o siga las indicaciones de su proveedor.
- Es posible que tenga cierto dolor durante unos días. Tome 3 pastillas (600 mg) de ibuprofeno cada 6 horas cuando sea necesario.

Cuándo Debe Llamarnos

- Sangrado vaginal intenso. Esto significa que empapa una toalla sanitaria cada hora durante dos horas o más.
- Dolor severo que no se alivia con un medicamento para el dolor de venta

libre (sin receta) y que dura más de unas horas.

- Fiebre mayor de 100.4 F.
- Signos de infección. Estos incluyen aumento del dolor, fiebre y secreción vaginal con mal olor.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 12/2020 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#5418s.

Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)

LEEP is a procedure that can be done in the doctor's office or hospital to remove abnormal tissue from the cervix. This handout tells you what to expect before, during, and after the procedure.

Before the LEEP

- Do not use creams or gels in the vagina before the exam for at least 2 days.
- Do not have sex or use a douche one day before the exam.
- If you will be on your period at the time of your procedure, please call the clinic to see if you need to reschedule.
- Please tell the clinic before your procedure if you may be pregnant.
- You do not need pain medicine, but you may take 3 ibuprofen tablets (200 mg each) or 2 Aleve[®] tablets (220 mg each) one hour before.
- Eat a light meal or snack at least one hour before your visit (do not arrive fasting).

During the LEEP

During the LEEP you will undress from the waist down and lie in the same position you would for a pelvic exam. The doctor will insert a speculum. We will use medicine to numb the cervix to help prevent pain. The doctor will then use a wire loop to remove a thin layer of abnormal tissue from the cervix. You may feel a dull ache or cramping.

The LEEP will take about 30 minutes and you can go home when it is done. Please schedule a follow-up clinic visit in four weeks or as directed.

After LEEP Care

- You may have brownish-black vaginal discharge (looks like coffee grounds). This is caused by medicine that we use to prevent bleeding. This may also have a metallic scent.
- You may have vaginal discharge or spotting for up to 4 weeks.
- You should not use tampons, douche, or have sex for 4 weeks.
- You should not swim in a pool, hot tub or lake for 2 weeks.
- You may bathe or shower.
- You can return to your normal routine as you feel able or as directed by your provider.
- You may have some pain for a few days. Take ibuprofen (600 mg) 3 pills every 6 hours as needed.

When to Call

- Severe vaginal bleeding. This means soaking through a pad each hour for two or more hours.
- Severe pain, that is not relieved by over-the-counter pain medicine and lasts more than a few hours.
- Fever above 100.4 F.
- Signs of infection. These include increased pain, fever, and vaginal discharge that has a foul odor.