

## Preparación para una Colonoscopia con una Ileostomía

Lea este documento por lo menos 1 semana antes de su examen.

### 1 Semana Antes del Examen

#### Organice su Transporte

Debido al efecto de los medicamentos sedantes, usted debe contar con un adulto responsable que lo lleve a casa. Se recomienda que alguien lo observe después del alta por al menos 6 horas.

#### Cambios en su Salud

Por favor, infórmenos sobre cualquier cambio significativo en su salud, enfermedad o reciente hospitalización ocurridos desde la programación de su examen. Llame al centro en que se realizará el procedimiento si en algún momento presenta síntomas de enfermedad (tos, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, dolores corporales, escalofríos) para cambiar la cita de su examen. Usted no debe someterse a este examen si está enfermo.

#### Anticoagulantes y Medicamentos para la Diabetes

Usted **debe** llamar al doctor que le receta estos medicamentos para ver si debe suspenderlos o ajustarlos antes del examen. Este doctor le dirá cómo hacer esto en forma segura.

El Centro de Salud Digestiva de UW Health sugiere que hable con su doctor usando la siguiente tabla. Ese doctor debe entregarle el consejo final sobre la suspensión de estos medicamentos.

Consulte con su doctor sobre su riesgo de sangrado al someterse a este examen. Si su doctor considera que su riesgo es bajo, probablemente le pediremos que siga el

siguiente esquema para suspender sus medicamentos anticoagulantes. Si su doctor considera que su riesgo de sangrado es alto, es posible que le pidan seguir un esquema diferente.

La siguiente lista contiene medicamentos anticoagulantes comunes. No incluye a **todos** los medicamentos anticoagulantes.

Nombre del Medicamento	Cuándo Suspenderlo
Prasugrel (Effient)	7 días antes
Warfarin (Coumadin)	5 días antes
Clopidogrel (Plavix)	5 días antes
Ticagrelor (Brilinta)	5 días antes
Cilostazol (Pletal)	1 día antes
Dabigatran (Pradaxa)	1 día antes
Rivaroxaban (Xarelto)	1 día antes
Apixaban (Eliquis)	1 día antes
Edoxaban (Savaysa)	1 día antes

Si su doctor le indica que **no** suspenda sus medicamentos, por favor, llame al Centro de Salud Digestiva al **608-890-5010**, ya que esto puede afectar su procedimiento.

#### Hierro, Multivitamínicos con Hierro y Aceite de Pescado

Deje de tomarlos 5 días antes de su examen. (No es necesario que se comunique primero con su doctor).

## El Día del Examen

### Dieta

- **No consuma alimentos sólidos después de medianoche**
- Solo líquidos transparentes (**no** rojos o morados)
- Deje de beber líquidos, incluso agua, **4 horas antes** de llegar.

### Dieta de Líquidos Transparentes

Asegúrese de mantenerse hidratado. Los líquidos transparentes incluyen:

- Agua, bebidas deportivas transparentes como Gatorade (no rojo o morado)®
- Caldo
- Café negro, te, soda
- Jugo de manzana
- Jell-O (no rojo o morado)®
- **No** consuma crema, leche o ningún otro producto lácteo (derivado de la leche)
- **No** consuma alimentos sólidos
- **No** beba líquidos con pulpa

### Medicamentos

Si necesita tomar medicamentos durante las 4 horas previas a su examen, no beba más de media taza de agua (4 onzas). Siga las indicaciones de su proveedor en relación a sus medicamentos para la diabetes y sus anticoagulantes

### Qué debe Traer

- CPAP o BiPAP y cualquier inhalador que use.
- Estuche para anteojos o lentes de contacto, recipiente para prótesis dental.
- Suministros para la ileostomía y bolsa adicional.
- Use ropa cómoda.
- El número telefónico de su conductor

No traiga:

- Joyas
- Dinero
- Otros artículos de valor

### Antes del Examen

- Al llegar, usted puede decidir si su conductor esperará en la sala de espera o en su habitación privada, donde escuchará su información médica privada.
- Es posible que su proveedor solicite que usted reciba 1 a 2 enemas cuando llegue al procedimiento. Esto dependerá de sus antecedentes quirúrgicos y cuánto se desee visualizar (no hay preparación intestinal que beber para este procedimiento).
- El doctor hablará con usted, contestará sus preguntas y le pedirá que firme un formulario de consentimiento.
- Una enfermera revisará sus antecedentes médicos, tomará sus signos vitales y lo conectará a un monitor cardíaco.
- Una enfermera le colocará una vía intravenosa y le dará medicamentos para ayudarlo a relajarse y mantenerlo cómodo.
- Su visita durará entre 2 y 3 horas.

### Después del Examen

- El doctor revisará los resultados y le entregará un informe. Le recomendamos encarecidamente que su conductor esté en la habitación con usted para escuchar los resultados.
- Se sentirá cansado cuando se vaya.
- Pase el resto del día descansando en casa. No puede conducir ni regresar a trabajar. Podrá volver a su rutina normal al día siguiente.

- Puede tomar hasta una semana para que su hábito intestinal regrese a la normalidad.
- Si suspendió sus medicamentos anticoagulantes antes del examen, consulte cuándo puede reiniciarlos.

### **Resultados**

Si se toman biopsias o se extraen pólipos, espere recibir los resultados de laboratorio en 1 a 2 semanas. Los resultados se enviarán a su cuenta de MyChart. Si no tiene una cuenta de MyChart, alguien lo llamará para entregarle los resultados o se los enviarán por correo.

### **Cuándo Llamar**

- Si continua evacuando heces fecales sólidas o si su intestino no ha comenzado a vaciarse para la mañana del examen.
- Tiene cólicos fuertes.
- Se siente mareado o con sensación de desmayo.
- Tiene dolor constante, sangrado rectal y/o fiebre.

### **A Quién Llamar**

#### **Recursos para Pacientes**

(Si necesita ayuda para encontrar transporte hacia y desde el lugar de su examen)

**(608) 821-4144.**

#### **Centro de Salud Digestiva**

**(608) 890-5010.**

#### **Clínica de Procedimientos**

#### **Gastrointestinales del Hospital UW**

**(608) 263-8094**

#### **Meriter/Unity Point**

**(608) 417-6389.**

# Getting Ready for Your Colonoscopy with an Ileostomy

Read this entire document at least 1 week before your test.

## 1 Week Before Test

### Arrange Transportation

Due to the sedation medicines, you must have a responsible adult drive you home. It is recommended that you are observed for at least 6 hours after discharge.

### Health Changes

Please tell us about any major health changes, illnesses, or recent hospital stays you have had since you scheduled your test. If at any time you have symptoms of illness (cough, stuffy nose, sore throat, fever, body aches, chills), please call the procedure center to reschedule your test. You should not have this test while ill.

### Blood Thinners and Diabetes Medicines

You **must** call the doctor who prescribes this medicine to see if you need to stop or adjust your medicine before your test. That doctor will tell you how to safely do this.

The UW Digestive Health Center suggests talking to your doctor using the table shown. That doctor should give you the final advice on stopping these medicines.

Ask your doctor about your bleeding risk with this test. If your doctor feels your bleeding risk is low, they will likely have you follow the schedule below to stop your blood thinning medicines. If your doctor feels your bleeding risk is high, they may have you follow a different timeline.

The list below has common blood thinning medicines. It does not include **all** blood thinning medicines.

Name of Medicine	When to Stop
Prasugrel (Effient)	7 days before
Warfarin (Coumadin)	5 days before
Clopidogrel (Plavix)	5 days before
Ticagrelor (Brilinta)	5 days before
Cilostazol (Pletal)	1 day before
Dabigatran (Pradaxa)	1 day before
Rivaroxaban (Xarelto)	1 day before
Apixaban (Eliquis)	1 day before
Edoxaban (Savaysa)	1 day before

If your doctor tells you **not** to stop your medicine, please call the Digestive Health Center at **608-890-5010**, as this may affect your procedure.

### Iron, Multivitamins with Iron and Fish Oil

Stop taking these 5 days before your test. (You do not need to contact your doctor first).

## Test Day

### Diet

- **No solid food after midnight**
- Clear liquids only (**no** red or purple)
- Stop drinking everything, even water, **4 hours before** you arrive.

### Clear Liquid Diet

Be sure to stay hydrated. Clear liquids include:

- Water, clear sports drinks like Gatorade (no red or purple)®
- Broth
- Black coffee, tea, soda
- Apple juice
- Jell-O (no red or purple)®
- **No** creamers, milks, or other dairy products
- **No** solid food
- **No** liquids with pulp

### Medicines

If you need to take medicine during the 4 hours before your test, drink no more than 1/2 cup of water (4 ounces). Follow your provider's directions for your diabetes or blood thinning medicines.

### What to Bring

- CPAP or BiPAP and any inhalers that you use.
- Eyeglass or contact lens case, denture cup.
- Ileostomy supplies and extra bag.
- Wear comfortable clothing.
- Phone number for your driver

Do **not** bring:

- Jewelry
- Money
- Other valuables

## Before the Test

- When you arrive, you can choose if your driver waits in the waiting room or in your private room where they will hear private health information.
- Your provider may request for you to complete 1-2 enemas after you arrive for your procedure. This will depend on your surgical history and visualization desired (there is no bowel prep to drink for this procedure).
- The doctor will talk with you, answer questions, and ask you to sign a consent form.
- A nurse will review your health history, take your vital signs and attach a heart monitor.
- A nurse will place an IV and give you medicines to help you relax and keep you comfortable.
- Your visit will take about 2-3 hours.

## After the Test

- Your doctor will review the results and give you a report. We strongly suggest that you have your driver in the room with you to hear the results.
- You may feel tired when you leave.
- Spend the day resting at home. You cannot drive or return to work. You can return to your normal routine the next day.
- It may take up to a week for your bowel habits to return to your normal.
- If you stopped blood thinning medicine before your test, ask when it can be restarted.

## Results

If you have biopsies taken or polyps removed, you can expect to get lab results 1-2 weeks later. Your results will be sent to your MyChart account. If you don't have a MyChart account, someone will call you with results or results will be mailed to you.

## When to Call

- If you are still passing solid stools or your bowels have not started to empty by the morning of your test.
- You have severe cramps.
- You feel dizzy or lightheaded.
- You have constant pain, rectal bleeding and/or a fever.

## Who to Call

### Patient Resources

(If you need help finding a ride to and from your test)

**(608) 821-4144**

### Digestive Health Center

**(608) 890-5010**

### UW Hospital GI Procedure Clinic

**(608) 263-8094**

### Meriter/Unity Point

**(608) 417-6389**

Su equipo de atención médica puede haberle dado esta información como parte de su atención. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otro miembro de su equipo de atención médica cuando utilice esta información. Si usted tiene una emergencia, por favor llame al 911. Propiedad Literaria © 12/2023 Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#8332s.