Opalescence™ Endo
Endodontic Whitening System
EN

Product Description
Opalescence™ Endo whitening is a 35% hydrogen peroxide gel administered by a dental professional specially formulated for the medical "walking bleach" technique.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 ml syringe
- Delivery Tip: Black Mini™ Tip

Indications for Use/Intended Purpose
Use Opalescence Endo whitening: to whiten endodontically treated, internal discolored tooth caused by disease or medical treatment.

Contraindications
- Not intended for use in traumatized teeth at risk of cervical resorption, any sign of existing cervical resorption, stop treatment.
- Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
- Do not use on patients with known sensitivities to peroxides or glycols. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient contact their physician.
- Do not place Opalescence Endo whitening on oral tissues. Should contact occur, rinse immediately with water.
- Do not use on patients with compromised gingival health.
- Do not use on teeth with existing inflammatory resorption.
- For patients under 16 years with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient contact their physician.

Warnings and Precautions
- Only use recommended tips.
- Tips are single use only.
- Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow.
- Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields when handling this product.
- Do not place Opalescence Endo whitening on soft tissues. Should contact occur, rinse immediately with water.
- If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.
- Inform patients that sensitivity may occur as well as will not whiten, we recommend whitening dark teeth before restorative placement.
- Wait at least 7–10 days after whitening procedures before placing adhesive restorations.
- Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.
- To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
- Etching internal dentin walls before any whitening procedure is not recommended and does not potentiate the whitening process but instead can increase ingress of reactive oxygen to external surfaces.
- Read and understand all instructions. Administer appropriate treatment regime to maintain optimal patient comfort.
- Monitor patient's whitening progress to prevent whitening beyond the desired level of whitening or degree of translucency.
- If after a few whitening attempts with no color change is perceived, stop treatment.
- Due to the access opening, tooth's integrity is compromised during this treatment. Advise patient accordingly.
- If patient complains about sensitivity around the cervical margin, re-evaluate gingival conditions to determine if you continue with treatment as to avoid contributing to cervical resorption.
- If patient complains about pain or sensitivity, re-evaluate or replace the coronal seal material (i.e., GI or composite).
- On occasion tooth will whiten but will appear more "opaque" than surrounding teeth. Inform patient of this possibility.
- Patients with various health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.

Stepwise Instructions
Preparation
1) Isolate the experiences of the patient. Explain any esthetic limits before proceeding. Recommend before photos.
2) Do an X-ram and treat areas of concern, including but not limited to exposed dentin, decay, etc. prior to treatment.
3) Remove all restorative and root sealing material from the coronal pulp chamber, 2-3mm below healthy gingiva. Place a 2mm thick conventional glass ionomer, resin modified glass ionomer, or bonded flowable composite resin to seal the endodontically treated canal. Verify set of material before proceeding.
4) Attach recommended suction device to evacuate or replace the coronal seal material (i.e., GI or composite).
5) On occasion tooth will whiten but will appear more "opaque" than surrounding teeth. Inform patient of this possibility.
6) Patients with various health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.

Bruxism
1) Tryk Bleegemiddel Opalescence Endo ud i det koronale pulpakammer (endvidere kontakt mit Weichgewebe vermeiden). Füllen Sie die Pulpakammer und lassen Sie dabei einen Freiraum von 3–5 mm für die erforderliche Teile des provisorischen Füllungsmaterials. Bei Bedarf kann ein Unterfüllungsmaterial (z. B. Provisorium oder Ultra Temp™ Hygienic provisorisches Befestigungsmaterial). Eine dünne Baumwollpfoper oder ein kleines Stück Wattepellet kann als Barriere über dem Füllungsmaterial platziert werden, um eine Kontamination durch Zahnstein zu verhindern. Sie können auch das Auffüllungsgut nicht auf die Ränder verschließen, da dies die provisorische Versiegelung beeinträchtigen würde. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn zwischen Pfad die minimale erforderliche Unterbringung vorhanden ist.
2) Überprüfen Sie den okklusalen Abstand. Ein vorsichtiger okklusaler Kontakt kann die provisorische Versiegelung beeinträchtigen und sollte vermieden werden.
3) Wiederholen Sie den Vorgang alle 1–5 Tage, bis die gewünschte Farbveränderung erreicht ist. Oder, wenn nach ein paar Anwendungen keine Veränderung eingetreten ist, Behandlung abbrechen und Patienten informieren.

Säuberung
1) Entfernen Sie das provisorische Restaurationsmaterial und das Auffüllungsmaterial bis zum koronalen Versiegelungsmaterial. Spülen und reinigen Sie die Zugangsöffnung.
2) Verschließen Sie den Zugang mit einem geeigneten Material wie dem Zugangsspirapparation mit einem Wattepellet und lassen Sie eine Mindeststärke von 2–3 mm für provisorisches Restaurationsmaterial wie z.B. Temp Bond™ Temporary Cement oder Cavit™.
3) Warten Sie nach der Auffüllung 7–10 Tage, bevor Sie eine dauerhafte Restauration einsetzen, da Füllungsmaterialien in Kaffeinkonzentrationen aufbrechen können.

Hinweise:
- Wählen Sie für die Wiederherstellung des koronalen Zugangs ein Komposit, dass eine ähnliche optische Opazität/Transluszenz wie die Nachbarzähne aufweist.
- Wenn Sie Produkte zu diesem Produkt suchen, finden Sie weitere Informationen unter https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-endo.

Verarbeitung
Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn keine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze nur mit einem Einwegtuch wischen.

Lagerung und Entsorgung
Bei Raumtemperatur und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern. Entsorgen Sie die Spritze mit Kappe gemäß den örtlichen Vorschriften. Richtlinien Bestimmungen einhalten.

Verschiedene Anmerkungen
- Die Zähne können sich im Laufe der Zeit wieder verfärben, so dass Zahnaufhellungsbehandlungen bei Bedarf nachgeholt werden müssen.

Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Endo
Endodontisches Aufhellungssystem
DE

Produktbeschreibung
Opalescence™ Endo-Bleaching ist ein 35%iges Wasserstoffperoxid-Gel, das von einem Zahnarzt verabreicht wird und speziell für die medizinische „Walking Bleach"-Technik des interne Bleichen entwickelt wurde.
Lesen Sie für alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung sorgfältig alle Anweisungen und SDB-Informationen durch.

Darreichungsform(en)
- 1,2 ml Abgabespritze
- Applikationsspitze: Schwarze Mini™-Applikationspitze

Hinweise für den Gebrauch / Verwendungszweck
Verwenden Sie Opalescence Endo Whitening, um endodontisch behandelte, interne verfärbte Zähne aufzuhellen, bei denen die Verfärbung durch Krankheit oder medizinische Behandlung entstanden ist.

Kontraindikationen
- Nicht geeignet für traumatisierte Zähne, bei denen das Risiko einer zervikalen Resorption besteht. Bei Anzeichen einer bestehenden zervikalen Resorption Behandlung abbrechen.
- Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Aufhellungsprodukte verwenden.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Peroxide oder Glykole anwenden. Der Patient muss seinen Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.
- Opalescence Endo Whitening nicht auf das Zahnfleisch / Gingiva bringen. Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Nicht bei Patienten mit geschädigtem Zahnfleisch anwenden.
- Nicht auf Zähnen mit bestehender entzündlicher Resorption anwenden.
- Für Patienten unter 16 Jahren mit Allergiebedenken siehe Produktallergen-Dokument unter Produktallergene unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und lassen Sie den Patienten einen Arzt aufsuchen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
- Nur empfohlene Applikationsspitze verwenden.
- Applikationsspitzen sind nur zur einmaligen Verwendung.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnaufhellungsprodukts mit dem Zahnfleisch und/oder dem Speichelfluss.
- Patienten und zahnärztliches Personal müssen beim Umgang mit diesem Produkt eine Schutzbrille mit Seitenschildern tragen.
- Opalescence Endo Whitening nicht auf das Zahnfleisch / Gingiva bringen. Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Wenn das Produkt verschluckt wird, große Mengen Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Wenn das Produkt verschluckt wird, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Patienten informieren, dass Restaurationsmaterialien nicht aufhellen. Wir empfehlen, dunkle Zähne vor dem Einsetzen der Restauration aufzuhellen.
- Warten Sie nach dem Bleichen mindestens 7–10 Tage, bevor Sie adhäsive Behandlungen durchführen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Sofort ausspülen, wenn das Produkt mit ihnen in Berührung kommt.
- Gingivale und allgemeine Mundgesundheit vor Beginn der Behandlung beurteilt werden, um einer zusätzlichen Reizung vorzubeugen.
- Das Ätzen der Innenwände vor einem Bleichverfahren wird nicht empfohlen und verstärkt den Bleichprozess nicht, sondern kann die Penetration des reaktiven Sauerstoffs hin zu den Außenflächen erhöhen.
- Sie müssen alle Anweisungen lesen und verstehen. Wenden Sie die entsprechende Behandlung an, um optimalen Patientenkomfort zu gewährleisten.
- Überwachen Sie die Aufhellungsfortschritte des Patienten, um eine Aufhellung über den gewünschten Aufhellungsgrad oder Transluszenzgrad hinaus zu verhindern.
- Wenn nach ein paar Aufhellungsversuchen keine Farbveränderung wahrgenommen wird, brechen Sie die Behandlung ab.
- Aufgrund der Zugangsöffnung wird die Integrität des Zahns während dieser Behandlung beeinträchtigt. Informieren Sie den Patienten entsprechend.
- Wenn der Patient über Sensibilitäten im Bereich des zervikalen Randes klagt, sollten Sie den Zustand der Gingiva neu bewerten, um zu entscheiden, ob Sie die Behandlung fortsetzen, um nicht zur zervikalen Resorption beizutragen.
- Wenn der Patient über Schmerzen im apikalen Bereich klagt, sollte das koronale Versiegelungsmaterial (d. h. GI oder Komposit) neu bewertet oder ersetzt werden.
- Gelegentlich wird der Zahn weiß, erscheint aber „undurchsichtiger" als die umliegenden Zähne. Informieren Sie den Patienten darüber, dass dies möglich ist.
- Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sollten vor der Überprüfen Ihren Hausarzt zu Rate ziehen.

Schrittweise Anweisungen
Vorbereitung
1) Klären Sie die Erwartungen des Patienten. Erläutern Sie alle ästhetischen Einschränkungen, bevor Sie fortfahren. Empfehlen Sie Vorher-Fotos.
2) Führen Sie eine orale Untersuchung durch und behandeln Sie Bereiche, die dies erfordern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf freiliegendes Dentin, Karies usw. vor der Behandlung.
3) Entfernen Sie das gesamte Restaurations- und Wurzelversiegelungsmaterial aus der koronalen Pulpakammer, 2–3 mm unterhalb des gesunden Zahnfleisches. Versiegeln Sie den endodontisch behandelten Kanal mit einem 2 mm dicken konventionellen Glasionomer, einem kunststoffmodifizierten Glasionomer oder einem verklebten fließfähigen Komposit-Füllmaterial. Vor der Anwendung des Bleichmittels Material aushärten lassen.
4) Bringen Sie die empfohlene Applikationsspitze an der Spritze an und überprüfen Sie den Fluss vor der intraoralen Anwendung. Stellen Sie sicher, dass das Bleichmittel das gesamte Zahnvolumen und erneut überprüfen. Wenn der Widerstand anhält, verwenden Sie Sie Applikationsspitze NICHT und wenden Sie sich an den Ultradent-Kundendienst, um Ersatz zu erhalten.

Gebrauch
1) Opalescence Endo Whitening in die koronale Pulpakammer (Kontakt mit Weichgewebe vermeiden). Füllen Sie die Pulpakammer und lassen Sie dabei einen Freiraum von 3–5 mm für die erforderliche Teile des provisorischen Füllungsmaterials. Bei Bedarf kann ein Unterfüllungsmaterial (z. B. Provisorium oder Ultra Temp™ Hygienic provisorisches Befestigungsmaterial). Eine dünne Baumwollpfoper oder ein kleines Stück Wattepellet kann als Barriere über dem Füllungsmaterial platziert werden, um eine Kontamination durch Zahnstein zu verhindern. Sie können auch das Auffüllungsgut nicht auf die Ränder versiegeln, da dies die provisorische Versiegelung beeinträchtigen würde. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn zwischen Pfad die minimale erforderliche Unterbringung vorhanden ist.
2) Überprüfen Sie den okklusalen Abstand. Ein vorsichtiger okklusaler Kontakt kann die provisorische Versiegelung beeinträchtigen und sollte vermieden werden.
3) Wiederholen Sie den Vorgang alle 1–5 Tage, bis die gewünschte Farbveränderung erreicht ist. Oder, wenn nach ein paar Anwendungen keine Veränderung eingetreten ist, Behandlung abbrechen und Patienten informieren.

Säuberung
1) Entfernen Sie das provisorische Restaurationsmaterial und das Auffüllungsmaterial bis zum koronalen Versiegelungsmaterial. Spülen und reinigen Sie die Zugangsöffnung.
2) Verschließen Sie den Zugang mit einem geeigneten Material wie dem Zugangsspirapparation mit einem Wattepellet und lassen Sie eine Mindeststärke von 2–3 mm für provisorisches Restaurationsmaterial wie z.B. Temp Bond™ Temporary Cement oder Cavit™.
3) Warten Sie nach der Auffüllung 7–10 Tage, bevor Sie eine dauerhafte Restauration einsetzen, da Füllungsmaterialien in Kaffeinkonzentrationen aufbrechen können.

Hinweise:
- Wählen Sie für die Wiederherstellung des koronalen Zugangs ein Komposit, dass eine ähnliche optische Opazität/Transluszenz wie die Nachbarzähne aufweist.
- Wenn Sie Produkte zu diesem Produkt suchen, finden Sie weitere Informationen unter https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-endo.

Verarbeitung
Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn keine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze nur mit einem Einwegtuch wischen.

Lagerung und Entsorgung
Bei Raumtemperatur und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung lagern. Entsorgen Sie die Spritze mit Kappe gemäß den örtlichen Vorschriften. Richtlinien Bestimmungen einhalten.

Varianten und Alternativen
Hämmerlein Endo Whitening ist eine alternative Option.

Sekalasia tietoja
- Hampaat voivat värjäytyä uudelleen ajan myötä. Täydennä hampaiden valkaisuhoitoja tarpeen mukaan.

Ilmoita kaikista vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Endo
Endodontisch Whitening Systeem
NL

Productbeschrijving
Opalescence™ Endo-bleekmiddel is een 35% waterstofperoxidegel die wordt toegediend door een tandarts die speciaal is ontwikkeld voor het "walking bleach"-toepassingsprotocol.
Voor alle beschreven producten dient u vóór gebruik zorgvuldig alle instructies en SDS-informatie te lezen en te begrijpen.

Leveringsformulier(en)
- 1,2 ml toedieningsspuit
- Leveringstips: Zwarte Mini™ tip

Indicaties voor gebruik/beoogd doel
Gebruik Opalescence Endo whitening om endodontisch behandelde, inwendige verkleurde tanden, veroorzaakt door ziekte of medische behandeling, weer te maken.

Contra-indicaties
- Niet bedoeld voor gebruik bij getraumatiseerde tanden met risico op cervicale resorptie, elk teken van bestaande cervicale resorptie, stop de behandeling.
- Zwangere of ziende vrouwen mogen geen producten voor het bleken van tanden gebruiken.
- Niet gebruiken bij patiënten met een bekende gevoeligheden voor peroxiden of glycolen. Als zich een allergische reactie, dermatitis of uitslag ontwikkelt, laat de patiënt zijn arts contacteren.
- Breng Opalescence Endo-bleekmiddel niet aan op mondweefsels. Indien contact optreedt, onmiddellijk met water afspoelen.
- Niet gebruiken bij patiënten met een aangetaste gingivale gezondheid.
- Niet toepassen op tanden met bestaande inflammatoire resorptie.
- Raadpleeg voor patiënten of gebruikers met allergieproblemen het productallergeendocument dat beschikbaar is op www.ultradent.com. Bij een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en vraag de patiënt om zijn arts te raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Tips zijn alleen voor eenmalig gebruik.
- Vermijd direct contact van het actieve oppervlak van het tandbleekproduct met het tandvlees en/of de speekselvloed.
- Patiënten en tandheelkundige professionals moeten een veiligheidsbril met zijschermen dragen tijdens het gebruik van dit product.
- Breng Opalescence Endo-bleekmiddel niet aan op mondweefsels. Indien contact optreedt, onmiddellijk met water afspoelen.
- Als het product is ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en neem contact op met een arts. Als het product wordt opgenomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Informeer patiënten dat sensitiviteit kan optreden maar ook dat het bleken niet zal werken. We raden aan om donkere tanden te bleken voordat de restauratieve plaatsing plaatsvindt.
- Wacht ten minste 7–10 dagna de bleekprocedures voordat u zelfklevende restauraties aanbrengt.
- Vermijd contact met de ogen. Onmiddellijk spoelen als het product ermee in contact komt.
- Om extra irritatie te voorkomen, moet de gingivale en algemene mondgezondheid worden gecontroleerd voordat de behandeling wordt gestart.
- Het etsen van interne dentinewanden voorafgaand aan een bleekprocedure wordt niet aanbevolen en versterkt het bleekproces niet, maar kan de doorgang van reactieve zuurstof naar externe oppervlakken vergroten.
- Lees en begrijp alle instructies. Dien een passende behandelingsmethode toe om optimaal comfort voor de patiënt te behouden.
- Houd de vorderingen van het bleken van de patiënt in de gaten om te voorkomen dat het wit de gewenste tint of doorschijnendheid overschrijdt.
- Als na een paar bleekpogingen geen kleurverandering wordt waargenomen, stop dan met de behandeling.
- Door de toegangsopening wordt de integriteit van de tand tijdens deze behandeling aangetast. Adviseer de patiënt dienovereenkomstig.
- Als de patiënt klaagt over gevoeligheid rond de cervicale rand, evalueer dan de toestand van het tandvlees opnieuw om te bepalen of u met de behandeling om te voorkomen dat u bijdraagt aan cervicale resorptie.
- Als de patiënt klaagt over pijn in het apicale gebied, evalueer opnieuw of vervang dan het coronale afdichtingsmateriaal (bijv. GI of composiet).
- Af en toe zal de tand wit worden, maar zal deze meer "ondoorzichtig" lijken dan de omliggende tanden. Informeer de patiënt over deze mogelijkheid.
- Patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun eerstelijnszorgverlener raadplegen voordat ze een behandeling starten.

Instructies stapsgewijs
Voorbereiding
1) Stel de verwachtingen van de patiënt vast. Leg eventuele esthetische limieten uit voordat u verder gaat. Aanbevelen voor Foto's.
2) Effectuar una exploración oral y tratar las zonas problemáticas, incluyendo, entre otras, la dentina expuesta, las caries, etc., antes del tratamiento.
3) Retire todo el material de restauración y sellado radicular de la cámara pulpar coronal, 2-3 mm por debajo de la encía sana. Coloque un ionómero de vidrio convencional de 2 mm de espesor, un ionómero de vidrio modificado con resina o una resina fluida adherida para sellar el canal tratado endodónticamente. Verifique que se endurezca el material antes de continuar.
4) Fijen Fresnel recommendado a la seringa or vitreflor le ajuste avant l'application intra-orale. En cas de résistance, remplacer la canule et/ou l'embout. NE PAS utiliser la seringue et contacter le service client d'Ultradent pour un remplacement.

Utilisation
1) Exprimer le système d'éclaircissementOpalescence Endo dans la chambre pulpaire coronaire (en évitant les tissus mous). Remplir la chambre pulpaire en laissant un espace de 3 à 5 mm pour le matériau provisoire. Un matériau d'obturation temporaire (tel que la résine temporaire J-Temp™ ou le matériau de scellement temporaire UltraTemp™ Hygienic) peut être placé sur le matériau de scellement. Recouvrir le matériau de scellement séparateur entre le gel temporaire et le gel blanchissant. S'assurer de placer délicatement pour ne pas déplacer le matériau de scellement. Ne pas sceller les bords avec le matériau provisoire. Cependant, ce n'est pas une exigence si un espace suffisant est laissé pour permettre la temporisation.
2) Vérifier l'absence de contact occlusal. Un contact occlusal prématuré peut compromettre la restauration provisoire ou entraîner une sensibilité due à une hyperocclusion.
3) Répéter la procédure tous les 1 à 5 jours, jusqu'à ce que le changement de teinte souhaité soit atteint. Sinon, arrêter le traitement si aucun changement de teinte/teinté perceptible après quelques tentatives d'éclaircissement.

Nettoyage
1) Retirer le matériau de restauration provisoire et le matériau d'éclaircissementjusqu'au niveau du matériau de scellement coronaire. Rincer bien les cavités.
2) Sceller l'accès avec la protection souhaitée dans la préparation de l'accès à l'aide d'une boulette de coton et en laissant une épaisseur minimale de 2 à 3 mm pour le matériau de restauration temporaire tel que la résine temporaire J-Temp ou le matériau UltraTemp Regular.
3) Attendre 7 à 10 jours avant de procéder définitivement au placement de la restauration. Les matériaux d'obturation temporaire peuvent être affectés par la caféine.

Remarques :
- Choisir un matériau composite pour restaurer l'accès coronaire qui a une opacité/translucidité optique similaire à celle des dents voisines.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez trouver des informations supplémentaires sur https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-endo

Traitement
Pour éviter la contamination croisée, essuyer la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon protecteur jetable. Si un manchon protecteur n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme une seringue à usage unique.

Stockage et élimination
Éléminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
- Les dents peuvent se recolorer avec le temps ; il convient alors d'ajuster les traitements d'éclaircissementdes dents si nécessaire.

Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Endo
Sistema de blanqueamiento de endodoncia
ES

Descripción del producto
El blanqueador Opalescence™ Endo es un gel de peróxido de hidrógeno de 35% administrado por un profesional dental especialmente formulado para la técnica médica de "blanqueo andante".
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información SDS antes de su uso.

Métodos de administración
- Jeringa de administración de 1,2 ml
- Punta de administración: Punta Mini de Mini™

Indicaciones de uso/Propósito previsto
Utilice el blanqueamiento Opalescence Endo para blanquear dientes tratados endodónticamente, con descoloraciones endodónticas causadas por una enfermedad o tratamiento médico.

Contraindicaciones
- No indicado para uso en dientes traumatizados con riesgo de reabsorción cervical, suspender el tratamiento tras cualquier signo de reabsorción cervical existente.
- Las mujeres embarazadas o lactantes no deben utilizar productos para blanquear los dientes.
- No usar en pacientes con sensibilidades conocidas a los peróxidos o glicoles. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o sarpullido, pida a la paciente que se comunique con su médico.
- No coloque el blanqueamiento Opalescence Endo sobre los tejidos orales. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua.
- No usar en pacientes con salud gingival deficiente.
- No usar en dientes con reabsorción inflamatoria existente.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.

Advertencias y Precauciones
- Use solo las puntas recomendadas.
- Las puntas son de un solo uso.
- Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías y/o el flujo salival.
- Los pacientes y los profesionales dentales deben usar gafas protectoras con protectores laterales al manejar este producto.
- No coloque el blanqueamiento Opalescence Endo sobre los tejidos blandos orales. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua.
- Si se ingiere el producto, beba grandes cantidades de agua y consulte a un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica inmediata.
- Informe a los pacientes que los materiales de restauración no se blanquearán, recomendamos blanquear los dientes oscuros antes de la colocación de la restauración.
- Espere al menos 7–10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.
- Evite el contacto con los ojos. Enjuague inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos.
- Para evitar irritación adicional, a saber bucal e gengival geral deve ser avaliada antes de iniciar o tratamento.
- O condicionamento das paredes internas do dente antes de qualquer procedimento de branqueamento não é recomendado e não potencializa o processo de branqueamento, mas pode aumentar a passagem de oxigênio reativo para superfícies externas.
- Leia e entenda todas as instruções. Administre um regime de tratamento adequado para manter o conforto ideal do paciente.
- Monitorice o progreso do branqueamento do paciente para evitar fazer o branqueamento para além do nível desejado de branqueamento ou grau de translucidez desejado.
- Se após algumas tentativas de branqueamento não for detetada qualquer alteração de cor, interrompa o tratamento.
- Devido à abertura do acesso, a integridade do dente fica comprometida durante este tratamento. Aconselhe a paciente em conformidade.
- Se o paciente se queixar de sensibilidade ao redor da margem cervical, reavalie as condições gengivais para determinar se prossegue o tratamento para evitar contribuir para a reabsorção cervical.
- Se o paciente se queixar de dor na área apical, reavalie ou substitua o material de vedação coronal (ou seja, GI ou compósito).
- Ocasionalmente, o dente será branqueado, mas parecerá mais "opaco" do que os dentes circundantes. Informe o paciente desta possibilidade.
- Pacientes com sérios problemas de saúde devem consultar o seu doctor de cabecera antes del tratamiento.

Instrucciones paso a paso
Preparación
1) Establezca las expectativas del paciente. Explique cualquier límite estético antes de continuar. Recomiende fotos antes del tratamiento.
2) Realice un examen bucal y trate las áreas de interés, incluso, entre otras, la dentina expuesta, las caries, etc. antes del tratamiento.
3) Retire todo el material de restauración y sellado radicular de la cámara pulpar coronal, 2-3 mm debajo de la encía sana. Coloque un ionómero de vidrio convencional de 2 mm de espesor, un ionómero de vidrio modificado con resina o una resina fluida adherida para sellar el canal tratado con endodoncia. Verifique que se endurezca el material antes de continuar.
4) Adjunte la punta recomendada a la jeringa y verifique el flujo antes de aplicar intraoralmente. Si encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Si continúa la resistencia, NO use la jeringa y comuníquese con el Servicio al cliente de Ultradent para reemplazarla.

Uso
1) Aplique el blanqueamiento Opalescence Endo en la cámara pulpar coronal (evitando los tejidos blandos). Llene la cámara pulpar y deje un espacio de 3-5 mm para permitir la profundidad necesaria del material de empaque provisional (cera o material provisional). Se puede colocar un material de base (como Ultra Temp™ Hygienic material provisional de cementación temporal) sobre el material de empaque. Se puede utilizar una membrana fina de algodón o un pequeño trozo de bolita de algodón como separador entre el material de base provisional y el blanqueador. Tenga cuidado de no empujar el algodón en el canal radicular para no presionar una sobre la cámara pulpar. No selle los bordes con material provisional. Sin embargo, esto no es un requisito si se deja espacio suficiente para acomodar la temporización.
2) Verifique que no haya contacto oclusal suficiente. Un contacto oclusal prematuro puede comprometer la restauración provisional o provocar sensibilidad por hiperoclusión.
3) Repita el procedimiento cada 1 a 5 días hasta lograr el cambio de color deseado. O, si después de algunas aplicaciones no hay ningún cambio de color, suspenda el tratamiento.

Limpieza
1) Retire el material de restauración provisional y el material de blanqueamiento hasta el nivel del material de sellado coronal. Enjuague y limpie la abertura de acceso.
2) Selle el acceso con la protección de acceso usando una bolita de algodón y dejando un grosor mínimo de 2–3 mm para la resina temporal J-Temp o el material Regular UltraTemp.
3) Espere 7 a 10 días antes de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar una restauración permanente; ya que los materiales blanqueadores interfieren con los agentes adhesivos.

Notas:
- Seleccione un composite para restaurar el acceso coronal que tenga una opacidad/translucidez óptica parecida a la de los dientes vecinos.
- Si tiene alguna pregunta sobre este producto, puede encontrar información adicional en https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-endo

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre utilizaciones y utilice una manga de barrera desechable. Se nAo for utilizada una manga de barrera, a seringa deve ser tratada como sendo de seringa única.

Almacenamiento y eliminación
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Información misceláneа
- Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo, retoque los tratamientos de blanqueamiento dental, según sea necesario.

Informe cualquier incidencia grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Endo
Endodontní bělicí systém
CS

Popis produktu
Opalescence™ Endo je bělicí gel s obsahem 35% peroxidu vodíku speciálně navržený pro bělení zubů technikou „walking bleach" ve stomatologické ordinaci.
Před použitím všech popsaných produktů si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace uvedené v bezpečnostních listech.

Forma aplikace
- 1,2 ml stříkačka
- Aplikační koncovka: Kanálky Black Mini™

Indikace k použití / Zamýšlený účel
Opalescence Endo použijte k bělení endodonticky ošetřených zubů s vnitřní diskolorací způsobenou nemocí či léky.

Kontraindikace
- Není určeno k použití u traumatizovaných zubů, u nichž hrozí riziko cervikální resorpce, při jakémkoli náznaku stávající cervikální resorpce přerušte léčbu.
- Těhotné i dojčí ne by tebule kontakt prostředek za účelem bělení zubů.
- Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na peroxidy nebo glykoly. Pokud se u pacienta objeví alergická reakce, dermatitida nebo vyrážka, odkažte pacienta na jeho lékaře.
- Nenanášejte Opalescence Endo bělicí gel na orální tkáně. Pokud dojde do kontaktu, odmah ispenite vodom.
- Nepoužívejte u pacientů s oslabenými dásněmi.
- Nepoužívejte na zuby s probíhající zánětlivou resorpcí.
- Pacienti či zákonní zástupci by se měli obrátit na příbalový letáček o složení alergenů, který je k dispozici na webové adrese www.ultradent.com. Dojde-li k alergické reakci, zasažené místo důkladně opláchněte vodou a požádejte pacienta, aby se obrátil na svého lékaře.

Upozornění a bezpečnostní opatření
- Používejte pouze doporučené konečky.
- Konečky jsou určeny pouze k jednomu použití.
- Zabraňte kontaktu aktivního povrchu bělicího přípravku na zuby s dásněmi / slinami.
- Pacient a stomatologické asistentky musí při manipulaci s tímto přípravkem ochranné brýle s bočními krytý.
- Nenášejte Opalescence Endo na měkké části tkáně. V případě kontaktu ústní dutinu okamžitě vypláchněte vodou.
- Pokud se produkt dostane do trávicího ústrojí, vypijte velké množství vody a kontaktujte lékaře. Při vdechnutí produktu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Informujte pacienty o skutečnosti, že výsledné materiály nebo výplně, a doporučujeme proto bělení provést před jejich implantací.
- Po dokončení bělicího procedur před lepením náhrad vyčkejte alespoň 7 až 10 dnů.
- Zamezte kontaktu přípravku s očima. Dostane-li se přípravek do očí, oči okamžitě vypláchněte vodou.
- Aby se předešlo podráždění, je třeba před zahájením léčby nejprve vyhodnotit, zda je kůže ústředním ke zdravotnímu stavu dásní a celé ústní dutiny pacienta vhodná.
- Před bělením zubů se nedoporučuje leptat vnitřní stěny dentinu, ani to proces bělení nepodporuje, ale může zvýšit průchod reaktivního kyslíku na vnější povrchy.
- Přečtěte si všechny pokyny a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Za účelem zajištění optimálního pohodlí pacienta zvolte vhodný režim.
- Během procedury bělení sledujte, abyste předešli přebělení zubů přes požadovanou úroveň bělení či průhlednosti.
- Bude-li po několika pokusu o bělení nepozorován žádný rozdíl v barvě, ukončete léčbu.
- Kvůli přístupu dovnitř se bělení nepříznivě projeví na celistvosti zubu. Pacientovi patřičně informujte.
- Stěžuje-li si pacient na citlivost v oblasti krčku, přehodnoťte stav dásní a rozhodněte se, zda chcete vzhledem k možnému zhoršení ustupování dásní v obnášování léčbě pokračovat.
- Pokud se pacient stěžuje na bolest v apikální oblasti, přehodnoťte nebo vyměňte materiál korunového těsnění (tj. skloionomerní cement nebo kompozit).
- Občasný výskyt případů zdravotnějším problémům trpělo se posazujícími se svým lůžečkům primárně zdravotní zařízení péče lékaře.

Postup krok po kroku
Příprava
1) Určete očekávaný pacienta. Objasněte sva estetická ograničenja pre nastavka. Preporuka prije fotografija.
2) Obavite oralni pregled i tretirajte područja koja su od interesa, uključujući, ali ne ograničavajući se na izloženi dentin, karijes itd. prije tretmana.
3) Uklonite sav restorativni materijal i materijal za brtvljenje korijena iz komore korunarne pulpe, 2-3 mm ispod zdrave gingive. Stavite konvencionalni staklenoionomerni cement debljine 2 mm, staklenoionomer modificiran smolom ili spojeni tekućo kompozitnu smolu za brtvljenje endodontski tretiranog kanala. Prije nastavka provjerite stupanj materijala.
4) Preporučujemo za osvuštanje pljuvu, pri otvaranju ili zamjeni brtvenog materijala (tj. GI ili kompozit).
5) Povremeno će zub poboljšati, ali će izgledati "neprozirnije" od okolnih zuba. Obavijestite pacijenta o ovoj mogućnosti.
6) Pacienta zuluk sa različitim zdravstvenim problemima trebalo bi se posavjetovati sa svojim liječnikom primarne zdravstvene zaštite prije početka.

Uputstvo korak po korak
Priprema
1) Uvrstite očekivanja pacijenta. Objasnite sva estetska ograničenja prije nastavka. Preporuka prije fotografija.
2) Obavite oralni pregled i tretirajte područja koja su od interesa, uključujući, ali ne ograničavajući se na izloženi dentin, karijes itd. prije tretmana.
3) Uklonite sav restorativni materijal i materijal za brtvljenje korijena iz komore koronalne p

Opalescence™ Endo
Endodontológiai fehérítő rendszer

termékleírás

Az Opalescence™ Endo whitening egy 35%-os hidrogén-peroxid gél, amelyet egy fogorvos ad be, kifejezetten az ormoz „utáltál fehérítő" technológia.
Az összes lett termék esetében használat előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az összes utasítást és óvintézkedést.

Szállítási útlap(ok)

- 1,2 ml-es adagolású fecskendő
- Szállítási tipp: Flextip Mini™ tipp

Használati javallatok/rendeltetés

Használja az Opalescence Endo fehérítést az endodontiailag kezelt, betegség vagy orvosi kezelés által okozott fehér elszíneződést fogak fehérítésére.

Ellenjavallatok

- Nem használható olyan traumás fogakban, amelyeknél fennáll a nyaki reszorpció veszélye, fennáll nyaki reszorpció fennáll jelen, hagyja abba a kezelést.
- Terhes vagy szoptatni nők nem használhatják fogfehérítő termékeket.
- Ne használja a peroxidokra vagy glikolokra ismertem érzékeny betegeknél. Ha allergiás reakció, például, dermatitis, vagy tüdőbaj, ne használja ezt a terméket.
- Ne fehérítse az Opalescence Endo fehérítő a szájzöttebetére. Érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.
- Ne használja károsodott fogínyt egészségi állapotú betegeknél.
- Ne használja azoknál, fokozott érzékenység.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénekkel kapcsolatos dokumentumait, amely elérhető a www.ultradent.com webhelyen. Ha allergiás reakciót észlel, alaposan öblítse le vízzel a kitett területet, és kérje meg a betegét, hogy forduljon az orvosához.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Csak az ajánlott tippeket használja.
- A tippek csak egyszer használatosak.
- Kerülje el, hogy a fogfehérítő termék akár feloldat közvetlenül érintkezzen az ínyével és/vagy a szájnyálkával.
- A páciensnek és a fogorvosnak oktatásban előtt ellátott védőszemüveget kell viselnie a termék kezelése során.
- Ne helyezze az Opalescence Endo fehérítő a száj ségyének. Érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.
- Ha a terméket lenyeli, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. Ha a termékhez bőrirritáció, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tájékoztassa a betegeket, hogy a helyreállító anyagok nem fognak fehéredni, javasoljuk a sötét fogak fehérítését a fogpótlás előtt.
- Várjon legalább 7-10 napot a fehérítési eljárások után, mielőtt fehérített a ragasztós pótlásokat. Kerülje a zamatos ételek, például a bor, fogyasztását a fehérítés időszakában.
- A további irritációk elkerülése érdekében a kezelés megkezdése előtt értékelni kell a fogíny és a szájnyálkahártya állapotát.
- A belső zománcfelület mérsékelt bármilyen fehérítési eljárás előtt nem javasolt, és nem fokozza a fehérítés hatékonyságát, de növelheti a reakciót vagy irritációt a fogak belsejében.
- Olvassa el és értse meg az összes utasítást. A páciens optimális hányadma megkezdése érdekében rendelkezésre kell állnia az összes szükséges anyagnak.
- Kövesse nyomon a páciens fehérítési folyamatát, hogy megakadályozza a kívánt fehérítési szintet vagy átrendelkezésre állnak.
- Ha néhány fehérítési kúszást után szimulálnia nélkül észlel, hagyja abba a kezelést.
- A hozzáférés miatt a kezelés során a fogfelület egyre sérül. Emiatt megkezdésére tájékoztassa a páciens!.
- Ha a beteg panaszkodik a nyaki szegély körül érzékenységre, értékelje újra a fogíny állapotát, hogy megállapítsa, fotyatja-e a kezelést, hogy elverjük a fogat.
- Ha a páciens fogfehérítő panaszkodik a szájnyálkahártya irritációjáról, a nyaki szegély és vagy cserélje ki a korrózós pecsét anyagát (pl. GI vagy kompozit).
- Győződjön le a betegről, de „abfrakciós lemezek" tünik, mint a környező fogak. Tájékoztassa a páciens erről a lehetőségről.
- Ha egy reszorpciós problémával kezdődő kúszást tetegének a kezelés előtt konzultálnia kell endodontiai szakemberrel.

Lépésenkénti utasítások

Készítmény

1) Nagy fél-3 pálcera elvárásait. A folytatás előtt magyarázza el az esztétikai korlátokat. Fényképek előtt ajánlom.
2) A kezelés előtt végezzen szóbeli vizsgálatot, és kerülje az aggodalomra okot adó területeket, többek között, de nem kizárólagosan a klinikt dentist, a szuvasodást stb.
3) Távolítson el minden helyreállító és egyéletlenül anyagot a kezelendő fogakról (pulpakamrából) 2-3 mm-nél az egészséges íny alatt. Helyezzen elő 2 mm vastag fogágyrámpás cementpontot, gyantával módosított üvegionomer vagy kompozit anyagot. Ellenőrizze a fogkő eltávolítását, és szükség esetén végezzen el további mélységi tisztítást, ha szükséges. A folytatás előtt ellenőrizze az anyagszilárdulást.
4) Csatlakoztassa a gumigátat a kiválasztott fogakra a fogászati gyakorlatban használt szokásos módszerek alkalmazása előtt. Ha fennáll az ellenállás, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra. Ha az ellenállás továbbra is fennáll, ne használja a fecskendőt, és kérjen használható új fecskendőt az Ultradent Ügyfélszolgálattal a csere érdekében.

Használat

1) Express Opalescence Endo fehérítés a coronalis pulpa kamrába (elkerülve a lágy szöveteket), fölhat és a nyaki szegélyt. Ne használjon fehérítő gélt a fogíny szélén. Ne használjon fehérítő gélt a fogíny szélén. Ne használjon fehérítő gélt a fogíny szélén