## Peak® Universal Bond and Peak® SE

Bonding Adhesive System with Chlorhexidine (0.2%)
Which May Ensure Long Term Bond Strengths* *Data on file

**EN**

**Description:**
Peak Universal Bond is a single syringe delivered resin bond. It can be used with Self-Etch or with Total-Etch. It is 7.5% filled with an ethyl alcohol as the solvent carrier and will cure with most high intensity lights including LEDs. Contains chlorhexidine which may ensure long term bond strengths.
Peak SE Primer is a self-etching dentin bonding resin which is comprised of an etchant and primer in a syringe-in-syringe delivery system.
Ultra-Etch® is a 35% phosphoric acid etch and rinse gel.
Together these products bond and seal the dentin to decrease post-op and cementation sensitivity.
Inclusion of the chlorhexidine additive has not shown to correlate with a reduction in secondary decay in patients. Clinical studies to evaluate the effects of chlorhexidine on oral bacterial or caries have not been performed.
**Indications for Use:**
Use for virtually all etching and bonding needs in restorative dentistry for patients of all ages.
Peak Universal Bond bonds to the following materials:
- Dentin and Enamel
- Porcelain, zirconia
- Metal
- Composite

**Directions for Use:**
NOTE: Initial use of Peak SE requires activation of the two components separated in the JetMix syringe.
1. Peak SE is stable for 120 days after activation.
2. Write current date or the stability expiration date on the flat area of plunger stem before activation.
DO NOT REMOVE LIER LOCK CAP PRIOR TO MIXING.
4. Quickly and forcefully press "dated" plunger into middle barrel.
5. Verify that plunger is flush with middle barrel.
Direct Bonding Technique For Composite
1. Prepare
a. Dentin/ Enamel: Isolate, clean and remove caries ensuring all non-mineral dentin is removed.(Sable Seek is recommended for this). For abrasion/attraction Class V preps, roughen with diamond bur.
2. Etch
a. Self-Etch Technique Option – dentin/enamel, composite and metal.
i. Rinse preparation and leave damp.
ii. OPTIONAL - Apply Composites® (where available) with Black Mini Brush Tip to preparation with a scrubbing motion and lightly dry leaving preparation slightly damp.
iii. Apply Peak SE with Black Mini® Brush Tip - 20 sec. to preparation using continuous scrubbing on dentin. Do not scrub enamel.
iv. Thinly dry 10 seconds using air/water syringe or high volume suction directly over preparation.
b. Total-Etch Technique Option – dentin/enamel, composite and metal.
i. Verify the color and consistency of the product flow before applying by expressing a small amount onto a mixing pad or gauze. Discard any clear liquid that is expressed.
ii. Apply Ultra-Etch with the Blue Micro® Tip to all surfaces of tooth preparation for 15 seconds.
iii. Rinse thoroughly for 5 seconds.
iv. OPTIONAL - Apply Composites® (where available) with Black Mini Brush Tip to preparation with a scrubbing motion and lightly dry leaving preparation slightly damp.
v. OPTIONAL – For additional antimicrobial effect, apply Consepsis® (where available) to preparation using a scrubbing motion and lightly dry leaving preparation slightly damp.
3. Bond
i. Apply a podule coat of Peak Universal Bond with Inspiral® Brush Tip – gently agitate for 10 seconds.
ii. Thinly 10 seconds using ¼ to ½ air pressure.
iii. OPTIONAL - Apply Consepsis® (where available) with Black Mini Brush Tip to preparation with a scrubbing motion and lightly dry leaving preparation slightly damp.
iv. Light cure for 10 seconds (20 seconds for lights with output < 600mW/cm²).
6.Restore with flowable and/or packable composite as per manufacturer's instructions.
Post and Core
1.Prepare
a. Drill post hole using a rubber stop and appropriate size UniCore® Drill.
b. Thoroughly rinse the post space for 10 seconds using the TriWay Adaptor and a 22ga End-Ende® Tip. Dry with TriWay Adaptor and 22ga End-Ende Tip from the bottom of the preparation.
c. Verify post (UniCore Post) fit and cut to desired length using a high speed diamond disc. NOTE: Carbide and operative burs may fray the fibers.
2.Etch. Always place and remove chemicals from the bottom of the preparation to the top.
a. Peak SE Technique
i. Attach a blue 22ga Deliver-Ease® Brush Tip to Peak SE syringe.
ii. Apply to the post space and coronal preparation. Do not exceed 30 seconds using an agitating action.
iii. Blow out excess with TriWay Adaptor and 22ga End-Ende Tip from the bottom.
b. Total-Etch Technique
i. Attach a blue 22ga End-Ende Tip to the Ultra-Etch syringe.
ii. Start apically and fill post space coronally. Apply to coronal preparation. Etch for 15 seconds.
iii. Suction off excess etchant.
iv. Using the TriWay Adaptor and 22ga End-Ende Tip, rinse thoroughly and lightly air dry leaving the post space slightly damp.
3.Bond
i. Attach a 30ga NaviTip® FX® to the Peak Universal Bond syringe.
ii. Place 1-2 drops into the post space and coronal preparation. Gently agitate full length of the canal, including the entire tooth preparation, for 10 seconds.
iii. Thoroughly remove excess Peak® Universal Bond using the TriWay Adaptor and the 22ga End-Ende Tip.
iv. Air dry post space and preparation for 10 seconds using full air pressure to thinly dry with TriWay Adaptor and 22ga End-Ende Tip. Suction excess material from the bottom up.
v. Light cure the post space for 20 seconds (40 seconds for lights with output <600mW/cm²). Use paper point or previously fitted post to verify post space is not blocked.
4.Post Cementation and Core Build-up
a. Remove cap from the PermaFlo® DC syringe.
b. Place a mixing tip onto the dual barrel syringe lining up the two ports. Twist clockwise until locked in place.
c. Attach the Helix® Intraoral Tip to the delivery directly into the canal from the dual barrel syringe.
d. Express a small amount before placing in the post space.
e. Insert the tip into the post space to full depth.
f. Using even pressure deliver PermaFlo® DC starting apically and moving coronally. g. Insert the post (UniCore® Post) slowly, displacing the excess cement.
h. Place curing light directly above the post and light cure 20 seconds; 40 seconds for lights with output <600mW/cm².
i. Continue building layers of PermaFlo® DC around post as needed. NOTE: Light cure for 5 seconds between layers to gel and form core. Do not light cure the last layer of PermaFlo® DC. Do not remove mixing tip until next use. Dispenser and mixing tip.
Precautions and warnings:
1.Caution: Chemical may set in tip after a few hours. To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use. Always verify material flow prior to applying intraoral. If material is set, replace tip and syringe. 2. This does NOT apply to dual-barrel syringes and mixing tips.
3.Carefully read and understand all instructions before use.
3.Verify flow prior to applying intraoral. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended solution.
4.Dispose of tips and empty syringes properly.
5.Re-cap syringes with Luer Lock Caps and dispose of unused material with an intermediate level disinfectant between uses.
6. Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
7.Re-direct operatory light during restorative procedures to avoid premature polymerization.
8.Light activated bonding agents are sensitive to ambient light. Syringe User Lock caps should be replaced following use to prevent unwanted polymerization. Cover syringe tip with gauze if left exposed to ambient light for long periods.
9.Establish adequate isolation.
10.Resins should be refrigerated for long-term storage to maintain shelf life.
11.To avoid cross contamination, do not re-use tips.
12.To optimize bond strength, use oil-free, moisture-free, air.
NOTE: For SDS and additional information about using our products, please go to www.ultradent.com

## Peak® Universal Bond und Peak® SE

Das Bondingsystem mit Chlorhexidin (0,2%)
zur langfristigen Sicherstellung der Bondkraft

**DE**

**Beschreibung:**
Peak Universal Bond ist ein Bonding-Präparat, das in einer einzigen Spritze zur Verfügung steht. Es kann mit selbstätzendem oder als Total-Etch-Adhäsiv verwendet werden. Es enthält 7,5 % Füller, Ethylalkohol als Lösungsmittel und härtet durch die meisten hochintensiven Leuchten einschließlich LED aus. Enthält Chlorhexidin, der langfristigen Sicherstellung der Bondkraft.
Peak SE Primer ist ein selbstätzendes Bonding-Präparat für das Bonding an Dentin, das aus einem Ätzmittel und einem Primer besteht. Es steht in einem Spritze-in-Spritze-Applikationssystem zur Verfügung.
Ultra-Etch® ist ein 35 % iges Phosphorsäure-Ätz- und Reinigungsgel.
Zusammen bereiten diese Produkte sichere Haftkraft und versiegeln das Dentin, um postoperative Sensibilitäten nach einer Restauration oder infolge einer Zementierung zu reduzieren.
Bei Verwendung des Zusatzes Chlorhexidin ist die Korrelation zur Reduzierung von Sekundärkariesen bei Patienten nicht nachgewiesen. Es wurden auch keine klinischen Studien zur Wirkung von Chlorhexidin auf orale Bakterien oder Karies durchgeführt.
**Wiweise zum Gebrauch:**
Zur Anwendungen in den Bereichen der restaurativen Zahnmedizin, bei denen Ätzmittel und Dentaloberflächen bei Patienten jedes Alters verwendet werden.
Peak Universal Bond haftet an den folgenden Materialien:
- Dentin und Enamel
- Keramik, Zirkon
- Metall
- Kompositzement

**Gebrauchsanweisung:**
ANMERKUNG: Vor dem ersten Gebrauch von Peak SE müssen die beiden getrennten Komponenten in der JetMix-Spritze aktiviert werden.
1. Peak SE ist nach der Aktivierung 120 Tage verwendbar.
2.Vor der Aktivierung das aktuelle Datum auf dem flachen Bereich des Stempels notieren.
3.Die Luer-Lock-Kappe NICHT VOR DEM MISCHEN ENTFERNEN.
4.Den mit dem Datum versehenen Stempel schnell und kräftig in den mittleren Zylinder drücken.
5.Prüfen, ob der Stempel mit dem mittleren Zylinder bündig abschließt.
Direkt-Bonding-Technik und Keramik/Zirkon-Restaurierung
1.Vorbereitung
a.Dentin / Zahnschmelz: isolieren, reinigen und Karies entfernen und prüfen, ob das gesamte demineralisierte Dentin entfernt ist (Tiefer wird Sable Seek empfohlen). Bei Abrasions-/Attraktions-Präparationen der Klasse V diese mit einem Diamantbohrer aufrauen.
b.Komposit: Brüchige Bereiche an vorhandenem Komposit entfernen. Oberfläche mit einem Diamantbohrer aufrauen.
c.Metall: Oberfläche durch Mikroabrasion vorbereiten.
d.Zirkon: Oberfläche mit einem Diamantbohrer aufrauen.
e.Keramik: Oberfläche reinigen, brüchige Keramik mit Diamantbohrer entfernen. Bereich mit abgeglaster Keramik etwa 15 Sekunden lang mit 10%iger Flußsäure behandeln. Spülen und trocknen.
2.Ätzen
a.Ätz-Methode – Dentin/Zahnschmelz, Komposit und Metall
i.Präparation spülen und feucht lassen.
ii.Optional - Mit dem Black Mini Brush Tip mit einreibenden Bewegungen Consepsis® (wo verfügbar) auf die Präparation auftragen und mit Luft trocknen.
iii.Mit dem Black Mini® Brush Tip - 20 Sekunden lang Peak SE auf die Präparation aufbringen; auf dem Dentin unter ständigem Einmassieren. Auf Zahnschmelz nur applizieren, nicht einreiben.
iv.3 Sekunden lang mit Luftbläser oder durch Absaugung direkt über der Präparation dünnen.
b.Total-Ätz-Technik
i.Vor der Anwendung Fließ-Konsistenz und Produktfarbe kontrollieren. Einen kleinen Tropfen auf einen Mischblock oder Gazetupfer ausdrücken. Jegliche klare Flüssigkeit verwerfen.
ii.Mit Blue Micro® Tip Ultra-Etch 15 Sekunden lang auf die gesamte Präparationsoberfläche aufbringen.
iii.5 Sekunden lang gründlich spülen.
iv.OPTIONAL - Mit dem Black Mini Brush Tip mit einreibenden Bewegungen Consepsis® (wo verfügbar) auf die Präparation auftragen und mit Luft trocknen.
v.OPTIONAL - Zur zusätzlichen antimikrobiellen Wirksamkeit mit einreibenden Bewegungen Consepsis® (wo verfügbar) auf die Präparation aufbringen und mit Luft trocknen.
3.Bonding
a.Mit dem Insipiral Brush Tip eine satte Schicht Peak Universal Bond auftragen und vorsichtig 10 Sekunden lang bewegen.
b.10 Sekunden lang sehr leichtes Luftbruck verblasen/trocknen.
c.Die Präparation sollte glänzen.
d.10 Sekunden lang (20 Sekunden bei Belichtung mit einer Leistung von unter 600mW/cm²) mit Licht aushärten.
4.Zementieren
a.Gemäß Herstellerangaben von lichthärtendes Befestigungskomposit für nicht-opake Restaurationen (wie qualitätsbestätigtes Befestigungskomposit auf die Präparation auftragen.
ANMERKUNG: Sofortige Dentin-Versiegelung erfordert Anwendung der Schritte 2a und 3 Peak Universal Bond. Glycerin auf das Peak Universal Bond aufbringen und 10 Sekunden lang mit der Leuchte härten. Glycerin abspülen. Definitiven Abdruck anfertigen. Vor Herstellung des Provisoriums Glycerin nochmals als Trennungsmittel auf Präparation aufbringen. Gemäß Spritzen und Provisorium einzementieren.
Murzelstift und Stumpf
1.Vorbereitung
a.Unter Verwendung eines Endo-Stops und eines UniCore®-Bohrers das Loch für den Stift bohren.
b.Die Stift-Präparation mit dem TriWay Adaptor und einem 22 ga Endo-Ende®- Tip 10 Sekunden lang gründlich spülen. Mit dem TriWay Adaptor und dem 22ga Endo-Ende Tip Präparation von unten nach oben mit trocknen.
c.Passung des Stifts (UniCore Post) prüfen und Stift mit Diamantscheibe auf Länge schneiden.
ANMERKUNG: Hartmetall- und chirurgische Bohrer können die Fasern ausfransen.
2.Ätzen – Die Präparate grundsätzlich von unten nach oben in die Präparation eingebracht oder aus der entfernen.
a.Peak SE-Technik
i.Einen blauen 22 ga Deliver-Ease® Brush Tip auf die Peak SE - Spritze aufsetzen.
ii.20 Sekunden lang satte stimmen Bewegungen in die Stift-Präparation sowie auf die koronare Präparation aufbringen.
iii.Überschuss mit einem TriWay Adaptor und 22ga Endo-Ende Tip aufsaugen.
c.Total-Etch-Technik
i.Einen blauen 22 ga Endo-Ende® Tip auf die Ultra-Etch-Spritze aufsetzen.
ii.Beginnen Sie apikal und füllen Sie den Stift-Präparation nach koronal. Auch auf die koronare Präparation aufbringen. Etwa 15 Sekunden lang ätzen.
iii.Überschüssiges Ätzmittel absaugen.
iv.Mit TriWay Adaptor und 22ga Endo-Ende Tip gründlich spülen und Stift-Präparation leicht feucht lassen.
3.Bonding
a.Einen 30ga NaviTip® FX® auf die Peak Universal Bond-Spritze aufsetzen.
b.1-2 Tropfen in die Stift-Präparation und auf die koronare Präparation geben. Danach in die volle Stiftmaßlänge einschließlich der gesamten Zahnpräparation 10 Sekunden lang einwirken.
c.Das gesamte überschüssige Peak Universal Bond mit TriWay-Adaptor und 22ga Endo-Ende aufsaugen.
d.Die Stift-Präparation und die koronale Präparation 10 Sekunden bei vollem Luftdruck mit TriWay Adaptor und 22ga Endo-Ende Tip von unten nach oben ausblasen/trocknen, um das restliche Lösungsmittel zu verdunsten.
e.Mit der Polymerisationslampe 20 Sekunden in den Stiftpfosten und in die koronale Präparation aushärten (40 Sekunden bei Leuchten mit einer Leistung unter 600mW/cm². Mit Papierspitze oder dem vorher angepassten Stift sicherstellen, dass der Stiftbereich nicht blockiert ist.
4.Stiftzementierung und Stumpfaufbau
a.Verschlußkappe der PermaFlo® DC Spritze entfernen.
b.Unter Kopplung der beiden Kammern Mixing Tip auf die Doppelspritze setzen. In Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen.
c.Den Rehelix Intraoral Tip an dem Mixing Tip befestigen, um direkt aus der Doppelspritze einen Kanal zu füllen.
d.Vor Einbringung in den Stiftkanal eine geringe Menge herausdrücken.
e.Tip in die volle Länge des Stiftkanals einführen.
f.Mit gleichmäßigem Druck PermaFlo DC Zementmasse, von apikal nach koronal.
g. Langsam den Stift (UniCore® Post) einführen und überschüssigen Zement ausquetschen lassen.
h.Polymerisationslicht direkt über den Stift halten und 20 Sekunden lang aushärten (40 Sekunden bei Leuchten mit einer Leistung unter 600mW/cm².
i.Je nach Bedarf weitere PermaFlo DC-Schichten um den Stift herum aufbauen.
ANMERKUNG: Zwischen den Schichten zur Verdichtung 5 Sekunden lang aushärten. Die letzte Schicht PermaFlo DC nicht aushärten. Mischdüse und Spritze.
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
1.Vorsichtsmaßnahme: Material kann in den Tips nach ein paar Stunden aushärten. Um Verstopfen zu vermeiden, entfernen Sie den Tip und verschließen Sie die Spritze nach jeder Benutzung mit einer Luer Lock Cap. Prüfen Sie vor der Applikation immer den Materialfluß, bevor Sie intraoral arbeiten. Wenn Sie Widerstand spüren, ersetzen Sie den Tip und entsorgen Sie den Rest einer alten Spritze. Das gilt NICHT für Doppelkammer und Mixing Tips.
2.Vor dem Gebrauch alle Anweisungen gründlich lesen.
3.Vor der Anwendung prüfen, ob ein Material Fluß vorhanden ist. Sollte Widerstand spürbar sein, den Tip ersetzen und erneut prüfen. Ausschließlich empfohlene Lösungen benutzen.
4.Tips und leere Spritze vorschriftsmäßig entsorgen.
5.Spritzen wieder mit der Luer Lock Cap verschließen und zwischen den Anwendungen mit einem Flächen-Desinfektionsmittel desinfizieren.
6.Kunststoffe können Sensibilisierungen hervorrufen. Wiederholten Hautkontakt mit nicht ausgehärtetem Dentalkunststoff vermeiden. Nicht an Patienten verwenden, denen eine bekannte Empfindlichkeit gegen Acrylate bekannt ist. Im Falle einer allergischen Reaktion, Dermatitis oder einen Hautausschlag einen Arzt konsultieren.
7.Lichtleitende Bondingmittel sind empfindlich gegen Umgebungslicht. Die Spritzen-Verschlußkappen abgeblendet werden.
8.Lichthärtende Bonding-Präparate reagieren auf die Raumbeleuchtung. Zur Verhinderung der Polymerisation LUER-Lock-Kappen nach Gebrauch aufsetzen. Ansätze der Spritzen mit Tupfer abdecken, falls sie für längere Zeit der Raumbeleuchtung ausgesetzt sind.
9.Für entsprechende Isolierung sorgen.
10.Zur Verlängerung der Haltbarkeitsdauer Prämissen kühlschrank aufbewahren.
11.Einmalgebrauchsartikel. Den Spritzen nicht Kreuz-Kontamination.
12.Für optimale Bondkraft wird die Verwendung öl- und feuchtigkeitsfreier Luft empfohlen.
HINWEIS: Sicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz unserer Produkte finden Sie auf www.ultradent.com

## Adhésif universel Peak® et Peak® SE

Système d'adhésion de et laison à la Chlorhexidine (0,2%)
qui peut assurer des résistances d'adhésions à long terme.

**FR**

**Description :**
L'adhésif universel Peak® est un agent de liaison pour résine appliqué par seringue unique. Il peut être utilisé avec un auto décapant ou avec un décapant total. Il est rempli à 7,5% avec un entraineur à base d'éthylique et se polymérisera sous la plupart des lampes à haute intensité, y compris les DEL. Contient de la chlorhexidine qui peut assurer des résistances d'adhésions à long terme.
L'appareil Peak SE est un système de liaison à la dentine auto-décapant qui est composé d'un décapant et d'un appareil dans un système d'application de seringue à seringue.
Ultra-Etch® est un gel de rinçage et un décapant à l'acide phosphorique à 35%.
Ensemble ces produits scellent et lient la dentine pour réduire la sensibilité post-opératoire et de scellement.
L'inclusion de l'additif chlorhexidine n'a pas montré avoir une corrélation avec une réduction secondaire des caries chez les patients. Aucune
étude clinique pour l'évaluation des effets de la chlorhexidine sur les bactéries ou les caries orales n'a eté faite.
**Indication d'emploi :**
Utilisez le pour la quasi-totalité de vos besoins de mordançage et de collage en dentisterie restaurative chez les patients de tout âge.
Peak Universal Bond adhère aux matériaux suivants :
- Dentine et émail
- La porcelaine et le zircon
- Métal
- Composite

**Mode d'emploi :**
NOTE : L'utilisation initiale du Peak SE exige l'activation des deux composants séparés dans la seringue JetMix.
1. Peak SE est stable pendant 120 jours après l'activation.
2.Ecrivez la date du jour ou la date d'expiration de stabilité sur la zone plate de la tige du piston avant l'activation.
2.NE RETIREZ PAS LE CAPUCHON LUER LOCK AVANT DE MELANGER.
4.Enfoncez rapidement et avec force le piston « daté » dans le cylindre central.
5.Vérifiez que le piston est à fleur avec le cylindre central.
Technique d'adhésion directe pour composite et céramique/du zircon.
1.Préparez :
a.La dentine/l'émail : Isolez, nettoyez et enlevez les caries en vous assurant que toute la dentine non minérale est enlevée (Sable Seek est recommandé à cet usage). Pour les préparations d'attraction/abrasion de classe V, dépolissez avec une fraise diamantée.
b.Composite : Enlevez les zones affaiblies du ciment dentaire composite existant. Poncez la surface avec une fraise diamantée.
c.Métal : Microporose la surface.
d.Zircon : Dépolissez la surface, enlevez les zones affaiblies en zircon avec une fraise diamant.
e.Porcelaine : Poncez et enlevez la porcelaine minée avec une fraise diamant. Nettoyez la zone de porcelaine dépolie pendant 15 secondes avec Ultra-Etch. Rincez et séchez.
2.Décapage
a.Technique d'autodécapage – sur la dentine/l'émail, le composite et le métal
i.Rincez la zone préparée et laissez-la humide.
ii.OPTIONNEL - Appliquez Consepsis® (où il est disponible) avec un mini embout pinceau noir sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
iii.Appliquez Peak SE avec le mini embout pinceau noir pendant -20 secondes sur la préparation avec un mouvement de récurage continuel sur la dentine. Ne pas brosser l'émail.
iv.Diluez/sèchez pendant 3 secondes en utilisant une seringue air/eau ou un grand volume aspirateur directement sur la préparation.
Allez à l'étape 3.
b.Technique de décapage total :
i.Appliquez l'Ultra-Etch avec l'embout Blue Micro sur toutes les surfaces de la dent préparée pendant 15 secondes.
ii.Rincez soigneusement pendant 5 secondes.
iii.OPTIONNEL - Appliquez Consepsis® (où il est disponible) avec un mini embout pinceau noir sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
iv.OPTIONNEL - Pour un effet antimicrobien supplémentaire, appliquez Consepsis® (où il est disponible) sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
3.Bonding : Peak Universal Bond avec l'embout Insipiral® Brush Tip
a.Placez 1 à 2 gouttes dans l'espace du tronc et sur la préparation, puis agitez sur toute la longueur du canal y compris l'intégralité de la préparation de la dent pendant 10 secondes.
b.Enlevez soigneusement l'excès d'adhésif universel Peak en utilisant l'adaptateur TriWay et l'embout Blue Tip.
c.Séchez à l'air l'espace du tronc et la préparation pendant 10 secondes en utilisant l'air à la pression maximale. Ceci va faire évaporer tout solvant restant depuis le bas vers le haut de la préparation.
d.Polymérisez pendant 20 secondes (40 secondes pour les lampes à faible puissance <600mW/cm²). Utilisez une pointe en papier ou le tenon ajusté précédemment pour vérifier que l'espace du tronc n'est pas obstrué.
4.Scellement du tenon et développement de la moitié.
a.Enlevez le capuchon de la seringue PermaFlo® DC.
b.Placez un unique embout mélangeur sur la seringue à double cylindre, en alignant les deux trous. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à verrouillement.
c.Insérez l'embout flexible Intraoral Tip directement dans le canal à partir de la seringue double. Le canal disposera la seringue à double cylindre.
d.Enfoncez une petite quantité avant de mettre le tenon dans le canal.
e.Insérez l'embout dans l'espace du tronc jusqu'à la profondeur maximale.
f.En utilisant une pression égale, commencez par le bas et remontez vers le haut.
g.Insérez le tenon (UniCore® Post) lentement, en déplaçant l'excès de ciment.
h.Placez une lampe à polymériser directementau-dessus du tenon et polymérisez pendant 20 secondes, 40 secondes pour les lampes à faible puissance inférieure à 600mW/cm².
i.Continuez d'accumuler les couches de PermaFlo DC autour du tenon jusqu'à la hauteur souhaitée. NOTE : Polymérisez pendant 5 à 4 secondes entre chaque couche pour durcir le gel et former la matrice. Faites une polymérisation finale sur le tenon ajusté du tronc.
5. Nettoyez pas l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation. Désinfectez la seringue et l'embout mélangeur.
Précautions et avertissements :
1.Attention : Le produit peut durcir dans la seringue peu! prendre dans l'embout au bout de quelques heures. Pour éviter un bouchon, enlevez l'embout et rebouchez-le avec les capuchons Luer Lock entre chaque utilisation. Vérifiez toujours l'écoulement du matériau avant de l'appliquer en bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et recommencez. Cela ne s'applique PAS aux seringues à double cylindre et aux embouts mélangeurs.
2.Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.
3.Vérifiez l'écoulement avant application intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et re-vérifiez. Nutilisez que les embouts recommandés.
4.Jetez les embouts et les seringues vides.
5.Refermez les seringues avec le capuchon Luer Lock et désinfectez-la avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation.
6.Les résines peuvent sensibiliser. Evitez un contact répété de la peau avec les résines dentaires non polymérisées. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates ou autres résines. Si une réaction allergique, dermatite ou de développement d'un éruptheme consulter un médecin.
7.Redirigez la lumière du fauteuil dans le cadre de procédures de restauration pour éviter une polymérisation prématurée.
8.Les agents de liaison activés par la lumière sont sensibles à la lumière ambiante. Les capuchons Luer lock pour seringue devraient être remis en place après utilisation pour éviter une polymérisation indésirable. Couvrez l'embout de la seringue avec de la gaze si elle doit rester exposée à la lumière ambiante pendant longtemps.
9.Etablissez une isolation adéquate.
10.Les résines devraient être réfrigérées pour maintenir leur durée de conservation lors d'une mise en réserve à long terme.
11.Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.
12.Pour optimiser la résistance d'adhésion, utiliez une air/eau sans huile ni humidité.
NOTE : Pour la FDS et des informations supplémentaires concernant l'utilisation des produits, veuillez visiter www.ultradent.com

## Peak® Universal Bond en Peak® SE

Bondingadhesietsysteem met chlorheximide (0,2%)
dat langdurige hechtsterkten kan garanderen

**NL**

**Beschrijving:**
Peak Universal Bond is een hanschroombidel dat in één enkele spuit wordt geleverd. Het kan met zelfetsend middel of met een total etsmiddel worden gebruikt. Het is 7,5% gevuld met een ethylalcoholdrager en hardt uit met alle hoogwaardige uitharding lampen inclusief LEDs. Bevat chlorheximide dat langdurige hechtsterkten kan garanderen.
Peak SE primer is een zelfetsende dentinehechtlaag bestaande uit een etsmiddel en een primer die in een spuit-in-spuit aanbrengsystem worden geleverd.
Ultra-Etch® is een etsgel van 35% fosforzuur.
Samen hechten en sluiten deze producten het dentine af om postoperatieve en cementeringsgevoeligheid te verlagen.
De toevoeging van chlorheximide heeft geen aantoonbare correlatie met een verlaging van secundaire caries bij patiënten. Er zijn geen klinische onderzoeken verricht naar de gevolgen van chlorheximide op mondbacteriën of caries.
**Indicaties voor gebruik:**
Geschikt voor vrijwel alle ets- en bondingtechnieken in de restaurative tandheelkunde voor alle leeftijden.
Peak Universal Bond hecht zich aan de volgende materialen:
- Dentine en email
- Porcelein, zirconium
- metaal
- Composiet

**Gebruiksaanwijzing:**
NB: Voordat Peak SE kan worden gebruikt, moeten de twee gescheiden componenten in de JetMix-spuit worden geactiveerd.
1. Peak SE is 120 dagen na activering stabiel.
2.Schrijf actie vervaldatum op datum wijzerp de stabiliteit verlopen op het platte gedeelte van de plunjerstel.
3.VERWIJDER DE LUER LOCK DOP NIET VÓÓR HET MENGEN.
4.Duw de "gedateerde" plunjer snel en krachtig in de middelste patroon.
5.Controleer of de plunjer op één lijn ligt met de middelste patroon.
Direct bondingtechniek voor composiet en keramiek/zirkonium
1.Prepareren
a.Dentine/Tandglazuur: Isoleer, reinig en verwijder caries en zorg dat alle niet-minerale dentine is verwijderd (Sable Seek wordt daarvoor aangeraden). Voor abrasie-/ attractie preparaties van klasse V de preparatieranden met een diamantfrees worden opgerauwd.
b.Composiet: Verwijder de verzwakte delen van het bestaande composiet. Ruw het oppervlak op met een diamantfrees.
c.Metaal: Pas microporose toe op het oppervlak.
d.Zirkoniumoxide: Reinig het oppervlak, verwijder het verzwakte zirkoniumoxide met een diamantfrees.
e.Porselein: Ruw het oppervlak op en verwijder het verzwakte porselein met een diamantfrees. Matte porselein gedurende ongeveer 15 seconden met 10%ige Ultra-Etch. Spoel en droog.
2.Décapage
a.Technique d'autodécapage – sur la dentine/l'émail, le composite et le métal
i.Rincez la zone préparée et laissez-la humide.
ii.OPTIONNEL - Appliquez Consepsis® (où il est disponible) avec un mini embout pinceau noir sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
iii.Appliquez Peak SE avec le mini embout pinceau noir pendant -20 secondes sur la préparation avec un mouvement de récurage continuel sur la dentine. Ne pas brosser l'émail.
iv.Diluez/sèchez pendant 3 secondes en utilisant une seringue air/eau ou un grand volume aspirateur directement sur la préparation.
Allez à l'étape 3.
b.Technique de décapage total :
i.Appliquez l'Ultra-Etch avec l'embout Blue Micro sur toutes les surfaces de la dent préparée pendant 15 secondes.
ii.Rincez soigneusement pendant 5 secondes.
iii.OPTIONNEL - Appliquez Consepsis® (où il est disponible) avec un mini embout pinceau noir sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
iv.OPTIONNEL - Pour un effet antimicrobien supplémentaire, appliquez Consepsis® (où il est disponible) sur la préparation avec un mouvement de récurage et laissez sécher à l'air.
3.Bonding : Peak Universal Bond avec l'embout Insipiral® Brush Tip
a.Placez 1 à 2 gouttes dans l'espace du tronc et sur la préparation, puis agitez sur toute la longueur du canal y compris l'intégralité de la préparation de la dent pendant 10 secondes.
b.Enlevez soigneusement l'excès d'adhésif universel Peak en utilisant l'adaptateur TriWay et l'embout Blue Tip.
c.Séchez à l'air l'espace du tronc et la préparation pendant 10 secondes en utilisant l'air à la pression maximale. Ceci va faire évaporer tout solvant restant depuis le bas vers le haut de la préparation.
d.Polymérisez pendant 20 secondes (40 secondes pour les lampes à faible puissance <600mW/cm²). Utilisez une pointe en papier ou le tenon ajusté précédemment pour vérifier que l'espace du tronc n'est pas obstrué.
4.Scellement du tenon et développement de la moitié.
a.Enlevez le capuchon de la seringue PermaFlo® DC.
b.Placez un unique embout mélangeur sur la seringue à double cylindre, en alignant les deux trous. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à verrouillement.
c.Insérez l'embout flexible Intraoral Tip directement dans le canal à partir de la seringue double. Le canal disposera la seringue à double cylindre.
d.Enfoncez une petite quantité avant de mettre le tenon dans le canal.
e.Insérez l'embout dans l'espace du tronc jusqu'à la profondeur maximale.
f.En utilisant une pression égale, commencez par le bas et remontez vers le haut.
g.Insérez le tenon (UniCore® Post) lentement, en déplaçant l'excès de ciment.
h.Placez une lampe à polymériser directementau-dessus du tenon et polymérisez pendant 20 secondes, 40 secondes pour les lampes à faible puissance inférieure à 600mW/cm².
i.Continuez d'accumuler les couches de PermaFlo DC autour du tenon jusqu'à la hauteur souhaitée. NOTE : Polymérisez pendant 5 à 4 secondes entre chaque couche pour durcir le gel et former la matrice. Faites une polymérisation finale sur le tenon ajusté du tronc.
5. Nettoyez pas l'embout mélangeur jusqu'à la prochaine utilisation. Désinfectez la seringue et l'embout mélangeur.
Précautions et avertissements :
1.Attention : Le produit peut durcir dans la seringue peu! prendre dans l'embout au bout de quelques heures. Pour éviter un bouchon, enlevez l'embout et rebouchez-le avec les capuchons Luer Lock entre chaque utilisation. Vérifiez toujours l'écoulement du matériau avant de l'appliquer en bouche. En cas de résistance, remplacez l'embout et recommencez. Cela ne s'applique PAS aux seringues à double cylindre et aux embouts mélangeurs.
2.Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.
3.Vérifiez l'écoulement avant application intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et re-vérifiez. Nutilisez que les embouts recommandés.
4.Jetez les embouts et les seringues vides.
5.Refermez les seringues avec le capuchon Luer Lock et désinfectez-la avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation.
6.Les résines peuvent sensibiliser. Evitez un contact répété de la peau avec les résines dentaires non polymérisées. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates ou autres résines. Si une réaction allergique, dermatite ou développement d'un éruptheme consulter un médecin.
7.Redirigez la lumière du fauteuil dans le cadre de procédures de restauration pour éviter une polymérisation prématurée.
8.Les agents de liaison activés par la lumière sont sensibles à la lumière ambiante. Les capuchons Luer lock pour seringue devraient être remis en place après utilisation pour éviter une polymérisation indésirable. Couvrez l'embout de la seringue avec de la gaze si elle doit rester exposée à la lumière ambiante pendant longtemps.
9.Etablissez une isolation adéquate.
10.Les résines devraient être réfrigérées pour maintenir leur durée de conservation lors d'une mise en réserve à long terme.
11.Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts.
12.Pour optimiser la résistance d'adhésion, utiliez une air/eau sans huile ni humidité.
NOTE : Pour la FDS et des informations supplémentaires concernant l'utilisation des produits, veuillez visiter www.ultradent.com

## Peak® Universal Bond and Peak® SE

Sistema adesivo dentale con Clorexidina (0,2%) che può garantire nel tempo la tenuta del legame

**IT**

**Descrizione:**
Peak Universal Bond è un adesivo dentale fotopolimerizzabile su base resinosa confezionato in siringa. Può essere usato sia con la tecnica autoadesiva (EtchBond) che con la tecnica della mordenzatura totale (EtchRinse). Contiene riempitivi al 7,5% in una soluzione di alcool etilico quale solvente ed è polimerizzabile con la maggior parte delle lampade per la fotopolimerizzazione ad alta intensità compresse le LED. Contiene clorexidina che migliora il legame adesivo a lungo termine.
Peak SE Primer è un adesivo automordenzante confezionato in siringa speciale contenente un mordenzante e un primer.
Ultra-Etch® è un acido mordenzante fosforico al 35% in gel.
Legando dell'additivo alla Clorexidina non ha dimostrato una riduzione delle carie secondaria nei pazienti. Non sono stati eseguiti studi clinici
per valutare gli effetti della Clorexidina sui batteri orali o sulle carie.
**Indicazioni:**
Può essere utilizzato praticamente per tutte le necessità di adesione e mordenzatura in odontoiatria restaurativa, per pazienti di tutte le età.
Peak Universal Bond aderisce ai seguenti materiali:
- dentina e smalto
- porcellana, zirconio
- metallo
- composito

**Istruzioni per l'uso:**
NOTA: Il primo utilizzo di Peak SE richiede l'attivazione dei due componenti separati nella siringa speciale JetMix.
1.Dopo l'attivazione Peak SE è stabile per 120 giorni.
2.Prima dell'attivazione della si

## Peak® Universal Bond ve Peak® SE

Bindingsfestsystem med klorheksidin (0,2 %) som kan skje langtids bindestyrke

**Beskrivelse:**
Peak Universal Bond er en bindingsrensn, levert i en enkelt sprøyte. Det kan brukes med selvetsing eller totaletsing. Det er fylt 7,5 % methacrylatfosfat kiesmeldet og vil herde under de fleste hjørnetannstekniske, inkludert LED-er. Imetholder forbindelser som kan skjerte tands bindestyrke.
Peak SE Primer er et selvetsende bindingssystemherdemiddel, som består av et etsemiddel og en primer i et sprøyte-i-sprøyte leveringssystem.
Ultra-Etch® er en 35 % fosforsyre, etsemyke og sølfgjelen
Sammen binder og forsegler disse produktene dentiner for å redusere post-operativ og sementrelatert sensitivitet.
Inkludering av klorheksidinstestingen har vist seg å ikke å samsvare med en reduksjon i sekundær restpyning i pasienter. Klinisk studier for å evaluere virkningen av klorheksidin på svake bakterier eller karies har ikke vært utført.
**Indikasjoner for bruk:**
Brukt for å lage et lim-lag - og festebrøv i gjenopprettende tannarbeide for pasienter av alle alder.
Peak Universal Bond fester til følgende materialer:
- Dentin og emalje
- Porselen, zirkoniumoksyd
- Metall
- Kompositt

**Retningslinjer for bruk:**
MERK: Følge gamle bruk av Peak SE krever aktivering av de to komponentene, som er separerte i separate sprøyter.
1 Peak® SE er stabil i 120 dager etter aktivering.
2 Skriv ned gjeldende dato eller utløpsdatoen for stabilitet på det flate ortrådet i stempelsammen fer aktivering.
3.MOI FJERN LUERLÅSFESTEN FOR BLANDING.
4.Press den "dateret" stempelet hurtig og kraftig inn i den midterste beholderen.
5.Bekreft at stempelet er i fluke med midterste beholder.
Direkte bindingsprotokolle og porselen/zirkoniumoprensjon:
1.Klargjør
a.Dentin/emalje: Isoler, rengjør og fjern karies under pålyn av at alle mine-ralerodentin fjernes (Sable Seek anbefales for dette). For absorpsjon/adhesjon, klasse V preparasjoner, gjøres overflaten ru med en diamantbor.
b.Kompositmaterialer: Fjern overflate oter av eksisterende kompositmaterialer. Gjør overflaten ru med en diamant.
c. Porselen/zirkoniumoksyd: Rengjør overflaten, fjern svekket zirkonium med diamantbor.
d.Porselen: Gjør overflaten ru og fjern svekket porselen med diamantbor. Rengjør sprukket porselensmonolit i 15 sekunder med Ultra-Etch. Skyll og tørk.
2.Etsing
a.Selvevningsteknikk – dentin/emalje, kompositt og metall
i. Skyll preparatet og la være fuktig
ii. ALTERNATIV1 - Pillar Concepsis® (hvor tilgjengelig) med Black Mini Brush Tip på preparatet med en skurebevegelse og luftrik.
iii. Pillar Peak® Universal Bond Black Mini® Brush Tip - 20 sekunder for kjørgarving, under stadig omsetning. Emaljen må ikke skures.
iv. Tørn utarbeid i 3 sekunder ved bruk av luft-/vannsprøyte eller høyvolumsug direkte over tannpreparatet.
Gå videre til trinn 3
b.Totaletsingsteknikk – dentin/emalje, kompositt og metall
i. Bekreft fargen og konsistensen til produktet/fjern det truk ved å trykke ut en liten mengde på en ikke-dentalflate eller gjaldet. Advered klar vanske som trykkes ut.
ii.Pillar Ultra-Etch med Blue Micro® Tip på alle overflatene til det klargjorte tannpreparat i 15 sekunder.
iii. Skyll grundig i 5 sekunder.
iv.ALTERNATIV1 - Pillar Concepsis® (hvor tilgjengelig) med Black Mini Brush Tip på preparatet med en skurebevegelse og luftrikt.
v. ALTERNATIV2 - Pillar Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 sekunder for kjørgarving, under stadig omsetning. Emaljen må ikke skures.
vi. Tørn utarbeid i 3 sekunder ved bruk av luft-/vannsprøyte eller høyvolumsug direkte over tannpreparatet.
Gå videre til trinn 3
3.Totaletsingsteknikk – dentin/emalje, kompositt og metall
i. Bekreft fargen og konsistensen til produktet/fjern det truk ved å trykke ut en liten mengde på en ikke-dentalflate eller gjaldet. Advered klar vanske som trykkes ut.
ii.Pillar Ultra-Etch med Blue Micro® Tip på alle overflatene til det klargjorte tannpreparat i 15 sekunder.
iii. Skyll grundig i 5 sekunder.
iv.ALTERNATIV1 - Pillar Concepsis® (hvor tilgjengelig) med Black Mini Brush Tip på preparatet med en skurebevegelse og luftrikt.
v. ALTERNATIV2 - Pillar Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 sekunder for kjørgarving, under stadig omsetning. Emaljen må ikke skures.
vi. Tørn utarbeid i 3 sekunder ved bruk av luft-/vannsprøyte eller høyvolumsug direkte over tannpreparatet.
Gå videre til trinn 3
4.Fjerning av overflødig Peak Universal Bond ved bruk av Trilway Adaptor og 22 g Endo-Ease Tip.
5.Kompositmaterialer: Fjern overflate oter av eksisterende kompositmaterialer. Gjør overflaten ru med en diamant.
6.Tørn utarbeid i 3 sekunder ved bruk av luft-/vannsprøyte eller høyvolumsug direkte over tannpreparatet.
7.Gjenta trinn 3 og 4.
8.Fjerning av overflødig Peak Universal Bond ved bruk av Trilway Adaptor og 22 g Endo-Ease Tip.
9.Fotopolymerisering i 10 sekunder ved bruk av Pillar Blue Micro or ekv. for å sikre at det er fullstendig herdet.
10.Fjern matrisebånd og kontroller at det er i overensstemmelse med pasientens bitt.
11.Fortsett å bruke som ved Peak SE-produkt.
Bruk av Peak Universal Bond som en lim-lag og som en kjerne. Foreta en endelig herding av kjernen i 40 sekunder.
5.Ikke fjern bindingen for neste bruk. Desinfiser sprøyten og blandesprisen.
Forholdsregler og advarsler:
1.Forholdsregler: Familiarise vil herdes i spissen etter noen timer. For å unngå tilstopping, fjern spissen og lukk well bruk av lukrefesten mellom hver bruk. Materialet vil alltid bekreftes for ønsket bruk. Utfelte materialer, skal ut spissen og sjekk igjen. Dette gjelder IKKE for dobbeltsemenpræparer og blandespisser.
2.Forsikre deg om at du har nye ledt og forstå alle instruksjonene før bruk.
3.Bekreft fly fat ernst ved bruk. I tillelle mostatest, erstatt spissen og sjekk igjen. Bruk kun anbefalte spisser.
4.Kast spisser ved tomme sprøyter forskriftsmessig.
5.Sett tilbake luerlåsfesten og desinfiser med en mellomnivå desinfeksmer bruk.
6.Reserver kun for brukere fatsomhet. Unngå kontakt med øyne og slimhinner og dentalrensk. Ikke bruk på pasienter med en kjent fatsomhet til alkylester eller andre reisinnredningen i produktet og produktbestandeler. Ikke bruk produktet i nærheten av åpen ild.
7.Vend operasjonsfelt vekk under gjennoppbyggingsprosedyer for å unngå for tidlig polymerisering.
8.Ipakkverte bindemidler er sensitive til lys i omgivelsene. Luerlåsfestene på sprøytene bør settes på plass direkte etter bruk, for å forhindre uønsket polymerisering. Dette sprøytepressen til med et stykke gas, dersom den er utsatt for lys i lenger perioder.
9.Sørg for passende isolasjon.
10.Under langtidslagring skal resiper oppbevares i kjøleskap for å bevare holdbarheten.
11.Unngå i kontakt kryskontaminering, ikke bruk spissene mer enn en gang.
12.For å optimere bindestyrke, bruk olje- og vanntrift luft.
BEMERK: For SDS og ekstra informasjon vedrørende bruken av vare produkter, vennligst gå til www.ultradent.com

## Peak® Universal Bond Peak® SE

Ενιαίο υλικό συγκόλλησης Peak® και Peak® SE

Σύστημα συγκόλλησης με χλωρεξιδίνη (0,2%) που ενδέχεται να εξασφαλίζει μακροχρόνια ισχύ συγκόλλησης

**Περιγραφή:**
Το Ενιαίο υλικό συγκόλλησης Peak είναι ένα συγκολλητικό ρητίνης που παράγεται με μία μόνο σύριγγα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτοαιθαλάνιστικό ή ελεύθερο αιθαλάνιστικό. Είναι πλήρωμένο με φωτός διαλύτικού αιθυλικής αλκοόλης κατά 7,5% και θα πολυμερίζεται με τα περισσότερα φώτα υψηλής ένασης συμπεριλαμβανομένου και των LED. Περιέχει χλωρεξιδίνη που ενδέχεται να εξασφαλίσει μακροχρόνια ισχύ συγκόλλησης.
Το επιπλέον υλικό Peak SE είναι μία ρητίνη συγκόλλησης μονής χρήσεως, αποτελούμενο από αιθανόλη, από ένα αιθανοπτιλίκο και επιπλέον υλικό σε σύριγγα παρόμοιας σύριγγας πολυμερισμού.
Το Ultra-Etch® είναι μία γέλη βραδύτητας αιθανοπτιλίκου με υδρό από 35% φωσφορικό οξύ.
Στον χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα μαζί, συμφιλιώνουν και σφραγίζουν την οδοντίνη για μειώνουν τη μεταγχειρητική ευαισθησία καθώς και την ευαισθησία μετά την τοποθέτηση.
Η περίληψη της χλωρεξιδίνης δεν έχει δείξει να σχετίζεται με μείωση σε δευτερεύουσα παρόμοιας σε ασθενείς, δεν έχουν διεξαχθεί κλινικές μελέτες για την ιδιαίτερη ή τη χρήσιμότητα της χλωρεξιδίνης σε σταματικά βακτηρίδια ή τρύπες.
**Ενδείξεις για χρήση:**
Χρησιμοποιείτε για χρήση όλες σας τις ανάγκες για αφαίρεσης και συγκόλληση στην αποκαθιστικό οδοντιατρικό τμήμα σας μη χρειάζεστε ιδιαίτερα υλικά.
Το Peak Universal Bond συγκόλλησε με τα παρακάτω υλικά:
- Οδοντίνη και Αδαμαντίνη
- Πορσελάνη, ζιρκόνια
- Μέταλλο
- Σύνθετο Ρητίνη

**Οδηγίες χρήσης:**
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση χρόνο του Peak SE απαιτεί ενεργοποίηση των δύο συστατικών που είναι ξεχωριστά στη σύριγγα ψεκασμού.
1.Το Peak SE είναι σταθερό για 120 ημέρες μετά την ενεργοποίηση.
2.Γράψτε την τρέχουσα ημερομηνία ή την ημερομηνία λήξης σταθερότητας στις επίπεδη ταινία του ίδιου χαλάζιου πριν από την ενεργοποίηση.
3.ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΤΡΙΦΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ.
4.Με γρήγορη και δυνατή κίνηση πιέστε το εμβόλιο που φέρει την ημερομηνία μέσα στο μεσαίο φιαλίδιο.
5.Επιβεβαιώστε ότι το εμβόλιο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη μεσαία κάνιν.
Πρωτόκολλα άμεσης συγκόλλησης και πορσελάνη/ζιρκόνιας:
1.Κλαρίζει
α.Δεντίνη/Αδαμάντιο: Ισόβιο, καθαρό και αφαιρέστε τυχόν τερηδόνα, αποβεβαιώνοντας ότι όχι περισσότερο από τις μη ορυκτούχες ίνες (χρησιμοποιείστε το Sable Seek για αυτό). Για απορρόφηση / πρόσφυση δοντιού των προετοιμασιών Κλάσης V, δώστε τη λεία επιφάνεια με ένα διαμάντι.
β.Υλικά σύνθετου: Αφαιρέστε τις οπιδοκαμμένες περιοχές υπάρχοντος σύνθετου. Υγρείνετε την επιφάνεια με ένα διαμάντι.
γ. Πορσελάνη/ζιρκόνιο: Καθαρίστε τις οπιδοκαμμένες ζιρκόνιο με γρέζιο διαμάντι.
δ.Πορσελάνη: Γυρίστε τις φαρμάτες την οπιδοκαμμένη πορσελάνη με γρέζιο διαμάντι. Καθαρίστε τη πορεία σπασμένης πορσελάνης επί 15 δευτερόλεπτα με Ultra-Etch. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2.Ετσίμισης
α.Αυτοκόλλητο – δεντίνη/εμάλιο, κομπόζιτ σε μέταλλο
i. Skyll preparate og la det forblive fugtigt.
ii.ALTERNATIV1 - Pillar Concepsis® (hvor tilgængelig) med Black Mini Brush Tip på preparatet med en skurbevægelse og luftrikt.
iii. Pillar Peak® Universal Bond Black Mini® Brush Tip - 20 sekunder for kjørgarving, under stadig omsetning. Emaljen må ikke skures.
iv. Tørn utarbeid i 3 sekunder ved brug af luft-/vandsprøjte eller høyvolumsug direkte over tannpreparatet.
Gå videre til trinn 3
β.Τοποθετούμενο/αιθάνιστο – οδοντίνη / αδαμαντίνη, σύνθετο και μέταλλο.
i.Επιβεβαιώστε τη χρώματος και τη συνέπεια του υλικού/αφαιρέστε τη τσιμπίδα πριν τη χρήση. Αφαιρέστε τη τσιμπίδα σε μη οδοντικό επίπεδο. Αφαιρεθεί καλά κάθε υλικό.
ii.Pillar Ultra-Etch με Blue Micro® Tip σε όλες τις επιφάνειες του προετοιμασμένου δοντιού για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
iii.Ξεπλύνετε καλά 5 δευτερόλεπτα.
iv.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 1 - Pillar Concepsis® (όπου διατίθεται) με Χαρίο βούρτσας Blue Mini στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος και το στεγνώστε με αέρα.
v.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 2 - Pillar Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 δευτερόλεπτα για κυκλικές κινήσεις βουρτσίσματος στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος. Μη βουρτσίζετε την αδαμαντίνη.
vi.Τεντώστε τα δόντια με ένα Χαρίο Ultra-Etch® Blue Micro or ekv. (εάν διατίθεται) στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος. Μη βουρτσίζετε την αδαμαντίνη.
Πάμε στο βήμα 3
3.Τοποθετούμενο/αιθάνιστο – οδοντίνη / αδαμαντίνη, σύνθετο και μέταλλο.
i.Επιβεβαιώστε τη χρώματος και τη συνέπεια του υλικού/αφαιρέστε τη τσιμπίδα πριν τη χρήση. Αφαιρέστε τη τσιμπίδα σε μη οδοντικό επίπεδο. Αφαιρεθεί καλά κάθε υλικό.
ii.Pillar Ultra-Etch με Blue Micro® Tip σε όλες τις επιφάνειες του προετοιμασμένου δοντιού για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
iii.Ξεπλύνετε καλά 5 δευτερόλεπτα.
iv.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 1 - Pillar Concepsis® (όπου διατίθεται) με Χαρίο βούρτσας Blue Mini στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος και το στεγνώστε με αέρα.
v.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 2 - Pillar Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 δευτερόλεπτα για κυκλικές κινήσεις βουρτσίσματος στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος. Μη βουρτσίζετε την αδαμαντίνη.
vi.Τεντώστε τα δόντια με ένα Χαρίο Ultra-Etch® Blue Micro or ekv. (εάν διατίθεται) στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος.
Πάμε στο βήμα 3
4.Αφαίρεση υπερβάλλοντος Peak Universal Bond με χρήση Trilway Adaptor και 22 g Endo-Ease Tip.
5.Υλικά σύνθετου: Αφαιρέστε τις οπιδοκαμμένες περιοχές υπάρχοντος σύνθετου. Υγρείνετε την επιφάνεια με ένα διαμάντι.
6.Τεντώστε τα δόντια με ένα Χαρίο Ultra-Etch® Blue Micro or ekv. (εάν διατίθεται) στις υπάρχουσες μη κίνηση βουρτσίσματος.
7.Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
8.Αφαίρεση υπερβάλλοντος Peak Universal Bond με χρήση Trilway Adaptor και 22 g Endo-Ease Tip.
9.Φωτοπολυμερίστε τα υπερβάλλοντα περισσεύματα για 10 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας ένα Pillar Blue Micro or ekv. (εάν διατίθεται) για τη μέγιστη ενεργοποίηση.
10.Αφαιρέστε τη ταινία από τη σύριγγα Peak SE.
11.Χρησιμοποιείστε τα υπόλοιπα βήματα σαν Peak SE-προϊόν.
Χρησιμοποιείστε τη μία σύριγγα σαν κόλλα και μία σύριγγα σαν πυρήνα. Κάνετε τελικό πολυμερισμό πυρήνα για 40 δευτερόλεπτα.
5.Μη αφαιρείτε τη σύριγγα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τη σύριγγα και τη τσιμπίδα με ένα ιατρικό απολυμαντικό.
6.Χρησιμοποιείστε μόνο σε ασθενείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αλλεργίες σε οποιαδήποτε εστέρες ή συστατικά αυτής του προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε ανοιχτή φλόγα.
7.Γυρίστε τη χειρουργική περιοχή μακριά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αναστήλωσης για αποφύγετε τη πρόωρη πολυμερίσεις.
8.Τα ιξώδη υλικά συγκόλλησης είναι ευαίσθητα στο φως. Τα μπουκάλια πρέπει αμέσως μετά τη χρήση τους, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη πολυμερίσεις. Κλείστε τη σύριγγα με ένα μικρό κομμάτι αερίου εάν η σύριγγα μένει εκτεθειμένη στο φως για μεγάλο χρόνο.
9.Χρησιμοποιείστε κατάλληλη απομόνωση.
10.Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης τα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγείο για τη διατήρεια της ισχύος.
11.Αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση, μη χρησιμοποιείτε τις μύτες περισσότερες από μία φορά.
12.Για τη βελτιστοποίηση της δύναμης συγκόλλησης, χρησιμοποιείστε λάδι/νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα SDS (δελτία δεδομένων Ασφάλειας) και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ultradent.com

## Peak® Universal Bond Peak® SE

Адгезивный материал для фиксации

Адгезивная система с хлоргексидином (0,2 %) может обеспечивать долговечную адгезивную прочность

**Описание**
Peak Universal Bond — это адгезивная система, поставляемая в шприце, которая может быть использована как в технике самопротравливания, так и в технике тотального травления. Адгезив имеет 7,5 % стеленых наполнителей и содержит вещества в виде дисперсии, с помощью которых можно обеспечить полимеризационные усадки, в том числе диодных. Содержит хлоргексидин, что может обеспечивать долгосрочную прочность сцепления.
Праймер Peak SE — это самотравящий адгезивный материал, который поставляется в шприце, обеспечивающем одновременное нанесение компонентов и собственно праймера, которые поставляются двумя следовательно шприцам.
Ultra-Etch® — это протравливающий гель, на основе 35 % ортофосфорной кислоты.
При совместном использовании эти продукты обеспечивают надежное сцепление с дентином и его герметизацию, что снижает риск появления чувствительности во время и после проведения ортопедического лечения.
Введение в данное исследование не приводит к снижению вторичного кариеса у пациентов. Клинические испытания для оценки
влияния хлоргексидина на бактериальную среду полостей полости или кариеса не проводились.
**Показания к применению**
Материалы используются при проведении всех видов протезирования и фиксации в восстановительной стоматологии для пациентов всех возрастов.
Компонентами данного Peak Universal Bond обеспечивают соединение с указанными ниже материалами:
- Дентин и эмаль
- Керамика, циркониой
- Металл
- Композит

**Рекомендуемые виды:**
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым использованием праймера Peak SE необходимо активировать два компонента, которые находятся в отдельных шприцах.
1.Праймер Peak SE остается стабильным в течение 120 дней после активации.
2.Отметьте на прилагаемом к шприцу Peak SE ортодонтическом бандаже дату или дату окончания срока годности.
3.ИЗВЛЕКАЙТЕ ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО ИЗ ОБЕИХ ШПРИЦЕВ.
4.Быстрым и сильным нажатием вдавите поршень в средний шприц.
5.Убедитесь в том, что поршень расположен в средней шприце.
Техника прямой фиксации и адгезивной фиксации керамическим или циркониевым каркасом:
1.Подготовка
а.Дентин и эмаль. Изолируйте и очистите область, а также удалите кариозные поражения так, чтобы не остались доминирующие минералы. Для контроля рекомендуется использовать Sable Seek. Для абсорбции/адгезии, при препарировании полостей V класса, сделайте шероховатость с помощью алмазного бора.
б.Материалы композитные. Удалите неустойчивые участки композитного материала. Сделайте шероховатость с помощью алмазного бора.
с.Металл. Выполняйте микроабразивную обработку поверхности.
d.Циркониой. Очистите поверхность. При необходимости удалите неустойчивые участки циркониой с помощью алмазного бора.
e.Керамика. Сделайте шероховатость и удалите неустойчивые участки керамики с помощью алмазного бора. Очищайте поверхность в течение 15 секунд с помощью препарата Ultra-Etch. Промойте и высушите область.
2.Протравливание
a.Техника самопротравливания для эмали, композит и металл
i.Промойте и высушите поверхность, оставьте не влажной.
ii.ВАРИАНТ1 - Праймер Concepsis® (при наличии) на подготовленные области и выполняйте щетинистое нанесение.
iii.С помощью насадки Black Mini® Brush Tip постоянным чистящим средствами нанесите праймер Peak SE на подготовленные области. Не нарушайте эмаль.
iv.Нанесите препарат, а затем высушивайте его в течение трех секунд с помощью воздушного пистолета или с помощью аппарата, работая непосредственно над подготовленным образцом.
Перейдите к этапу 3
b.Техника тотального протравливания: дентин или эмаль, композит и металл.
i.Перед использованием проверьте цвет и консистенцию материала, выдавив небольшое количество на бумагу для замешивания или маркер. Если появится прозрачная жидкость, удалите ее.
ii.С помощью насадки Blue Micro® Tip нанесите гель Ultra-Etch на все подготовленные поверхности зубов на 15 секунд.
iii.Тщательно смывайте в течение 5 сек.
iv.ВАРИАНТ1 - Праймер Concepsis® (при наличии) на подготовленные области и выполняйте щетинистое нанесение.
v.ВАРИАНТ2 - Праймер Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 секунд для круговых движений на подготовленные области. Не повреждайте эмаль.
vi.Высушивайте в течение 3 сек. с помощью воздушного пистолета или с помощью аппарата, работая непосредственно над подготовленным образцом.
Перейдите к этапу 3
3.Техника тотального протравливания
i.Перед использованием проверьте цвет и консистенцию материала, выдавив небольшое количество на бумагу для замешивания или маркер. Если появится прозрачная жидкость, удалите ее.
ii.ВЕОБРАТЕЛЬНО. С помощью насадки Black Mini Brush Tip чистящим движением нанесите праймер Concepsis (при наличии) на подготовленные области и выполняйте щетинистое нанесение.
iii.С помощью насадки Blue Micro® Tip нанесите гель Ultra-Etch на все подготовленные поверхности зубов на 15 секунд.
iv.Тщательно смывайте в течение 5 сек.
v.ВАРИАНТ1 - Праймер Concepsis® (при наличии) на подготовленные области и выполняйте щетинистое нанесение.
vi.ВАРИАНТ2 - Праймер Peak® Universal Bond Black Mini Brush Tip - 20 секунд для круговых движений на подготовленные области. Не повреждайте эмаль.
vii.Высушивайте в течение 3 сек. с помощью воздушного пистолета или с помощью аппарата, работая непосредственно над подготовленным образцом.
Перейдите к этапу 3
4.Удаление излишков Peak Universal Bond с помощью аппарата Trilway Adaptor и наконечника 22g Endo-Ease Tip.
5.Композитные материалы: Удалите неустойчивые участки композитного материала. Сделайте шероховатость с помощью алмазного бора.
6.Высушивайте в течение 3 сек. с помощью воздушного пистолета или с помощью аппарата.
7.Повторите шаги 3 и 4.
8.Удаление излишков Peak Universal Bond с помощью аппарата Trilway Adaptor и наконечника 22g Endo-Ease Tip.
9.Фотополимеризуйте в течение 10 секунд с помощью аппарата Pillar Blue Micro or ekv. для полной полимеризации.
10.Снимите ленту с шприца Peak SE.
11.Выполняйте остальные шаги как с продуктом Peak SE.
Используйте один шприц как клей, а другой как сердечник. Выполните окончательную полимеризацию сердечника в течение 40 секунд.
5.Не снимайте самовыжимающий шприц после использования. Продезинфицируйте шприц и смешивающий наконечник.
Меры предосторожности и предупреждения
1.Предосторожности: Материал может полимеризовать в кончике, поэтому для предотвращения закупоривания рекомендуется использовать колпачок после работы на наконечнике материал всегда проверяйте на шприце на время между использованием. Перед применением средства в ротовой полости тщательно промойте шприц, насколько хорошо вы выдавливаете. Если средство не проходит, замените насадку и повторите процедуру. Это НЕ касается двойных шприцев и смешивающих наконечников.
2.Перед использованием средства внимательно ознакомьтесь со всем инструкциями и мер предосторожности.
3.Перед использованием проверьте срок годности. Выдавливайте на сам из шприца. При применении соответствующего замените насадку и повторите процедуру. Используйте только новые наконечники.
4.Правильно утилизируйте насадки и пустые шприцы.
5.После использования шприца обязательно обработайте его дезинфицирующим средством.
6.Не использовать у пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
7.Не допускать контакта с открытым пламенем.
8.Не допускать попадания в глаза и в ротовую полость.
9.Не допускать попадания на кожу.
10.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
11.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
12.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
13.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
14.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
15.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
16.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
17.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
18.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
19.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
20.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
21.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
22.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
23.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
24.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
25.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
26.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
27.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
28.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
29.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
30.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
31.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
32.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
33.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
34.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
35.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
36.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
37.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
38.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
39.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
40.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
41.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
42.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
43.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
44.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
45.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
46.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
47.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
48.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
49.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
50.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
51.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
52.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
53.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
54.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
55.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
56.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
57.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
58.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
59.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
60.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
61.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
62.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
63.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
64.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
65.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
66.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
67.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
68.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
69.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
70.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
71.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
72.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
73.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
74.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
75.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
76.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
77.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
78.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
79.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
80.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
81.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
82.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
83.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
84.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
85.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
86.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
87.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
88.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
89.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
90.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
91.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
92.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
93.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
94.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
95.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
96.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
97.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
98.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
99.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
100.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
101.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
102.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
103.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
104.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
105.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
106.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
107.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
108.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
109.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
110.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
111.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
112.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
113.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
114.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
115.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
116.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
117.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
118.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
119.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
120.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
121.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
122.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
123.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
124.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
125.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
126.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
127.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
128.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
129.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
130.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
131.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
132.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
133.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
134.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
135.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
136.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
137.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
138.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
139.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые компоненты материала.
140.Не допускать попадания на пациентов с известной аллергией на любые