

Opalescence Boost® 40% Tooth Whitening System
Product Description: Opalescence® Boost® 40% hydrogen peroxide whitening gel is for in-office use only. The 2-barrel 100 mL syringe provides strength for both clinical application and precise dosing of the activator. One barrel contains a unique chemical activator, which is combined with a second barrel containing hydrogen peroxide.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s):
• 12 mL Delivery Syringe
• Recommended delivery Tip
• Black Mini™ Tip

Indications for Intended Purpose
Opalescence Boost 40% whitening is for in-office use only. It is applied by the dental professional for whitening one or more teeth. Opalescence Boost in-office whitening is also used on non-vital teeth, including in-office intraorally whitening. Opalescence Boost in-office whitening is an alternative, conservative method (compared to crowns, veneers, etc.) for whitening dark, internally discolored teeth caused by predisposing factors such as disease, traumatic or iatrogenic injury.

Contraindications
• Patients with severe allergic reactions to chemical ingredients can include but are not limited to elevated bilirubin levels, tetracycline and adult minocycline stains, porphyria, erythroblastosis fetalis and high fluoride intake during tooth development.
• Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
• For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with tap water and have the patient consult their physician

Warnings and Precautions

• Use only recommended tips.
• Avoid direct contact of the surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow.
• For patients with known tooth sensitivity, pre-applied tooth treatment with Ultra™ Sensitizing gel, Opalescence® Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief, and/or Enamelast® fluoride varnish is recommended.
• Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. These symptoms persist for a few minutes after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
• If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.
• Inform patients restorative materials will not whiten, and we recommend whitening dark teeth before restorative placement.

• Wait at least 7–10 days after whitening procedures before placing aesthetic restorations.
• Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
• Do not place the product on teeth immediately if product comes into contact with teeth.
• To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
• Etching enamel or prophyl paste polishing before any whitening procedure is not recommended and may increase the whitening process but can cause sensitivity.
• Restorations should be adequately sealed, and all exposed sensitive dentin should be covered. A history of sensitivity exists, treat with appropriate restoration or blocking agent such as dentin bonding or temporarily with dentin sealant agent or fluoride varnish.
• Monitor patients' whitening progress to prevent over-bleaching the desired level of whitening or degree of translucency.

• If additional whitening is desired, re-schedule and repeat the Opalescence Boost 40% in-office procedure about 2 weeks after use. Opalescence® Endo whitening.
• Regression is to be expected. Follow-up whitening treatment every 3–5 years is recommended.
• If you have any questions regarding this product, please find additional information at <http://www.ultradent.com>.
• For more information, visit www.ultradent.com/categories/whitening/in-office/opalescence-boost

Processing
• To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between each use, using a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal

Store according to outer package label.
• Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

• Before disposal, the syringes aspirate water into the syringe and expurge liquid down the drain. Repeat a couple of times before disposing of the syringe. Make sure any gauges used are rinsed with water.
• Press the plunger into the red syringe, pushing all contents into the clear syringe.
• Press the contents of the clear plunger completely back into the red syringe.
• To thoroughly mix activator with whitening gel, push stems back and forth continually and mix 25 times each side.

6. Press all mixed gel into red syringe.

7. Continue the two syringes and securely attach the recommended tip (Black Mini Tip) onto the red syringe.

8. To thoroughly mix activator with whitening gel, push stems back and forth continually and mix 25 times each side.

9. Press all mixed gel into red syringe.

10. Continue the two syringes and securely attach the recommended tip (Black Mini Tip) onto the red syringe.

11. Verify flow, consistency, and that the color is red before applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. If gel is not red, do not use and refer to Step 10.
• Mixing Opalescence Boost In-Office Whitening® section.
NOTE:

• Opalescence Boost in-office whitening should be used within 10 days of mixing. Keep refrigerated between uses.

• Refer to mixing card included.

Isolation – OpalDam® Resin Barrier (Recommended Isolation)

Remove Luer lock cap from OpalDam® resin barrier and securely attach recommended delivery tip. Refer to Warnings and Precautions.

2. Verify flow prior to applying intraorally.
3. Rinse and dry teeth and gums thoroughly.
Place UltraTrend IsoBlock™ bite block and die supporting lip cheekpiece over UltraTrend Umbrella™ retractor to avoid Opalescence Boost whitening gel from contacting any soft tissue.

4. Apply OpalDam resin barrier along the gingival margin, overlapping approximately 2–3 mm into the enamel. Blend and finish one tooth beyond the most distal tooth that is being whitened. Use barrier to isolate tooth/teeth to be treated.

5. Express resin through any open embrasures onto the lingual tissue to completely seal each exposed pulp space.

Use – Applying Opalescence Boost 40% In-Office Whitening

1. Apply 0.5–1.0 mm thick layer of gel to the labial surface of the tooth.
2. Allow gel to remain on the teeth 20 minutes per application, periodically checking on patient comfort and suctioning of saliva

NOTE: Avoid contact with soft tissue or salivary flow. If chemical irritation occurs due to the intraoral soft tissue coming into contact with the peroxide gel, immediately wipe the gel from the tissue using a wet gauze and rinse the area well. Tissue should return to normal within 20–30 minutes. Refer to Warnings and Precautions.

3. Suction gel from teeth using the Luer Vac and SST™ (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel. When no gel is visible, lightly rinse and dry. Use caudal flow to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal.

4. Evaluate shade change after each application and monitor patient for sensitivity and irritation. If persistent sensitivity occurs, discontinue use.

5. Repeat steps under section "Applying Opalescence Boost 40% In-Office Whitening" for no more than 3 applications if desired results are not been achieved. Do not exceed 3 applications per visit.

6. Retreat as necessary using professional judgment.

Clean

• Pour les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préparatoire et post-opératoire avec le gel désensibilisant UltraTm™ le dentifrice blanchissant Opalescence Soutagement de la sensibilité et/ou le vernis fluoro Enamelast™ est recommandé.

• Certains patients peuvent ressentir une gêne transitoire, des irritations des gencives, de la langue, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'irritation grave, contactez votre dentiste.

• En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le patient est assis, consulter immédiatement un médecin.

• Informer les patients sur le fait que les matériaux de restauration réclairciront pas, nous recommandons l'application de la dentifrice blanche avant la mise en place de la restauration.

• Attendre au moins 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer les restaurations adhésives.

• Les patients ayant de graves problèmes de santé ne doivent pas utiliser le produit.

• Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.

• Pour éviter toute irritation supplémentaire, la santé gingivale et bucco-dentaire générale doit être évaluée avant de commencer le traitement.

• Appliquez un produit de protection adhésive à base de pâte prophylactique avant toute procédure d'éclaircissement n'est pas recommandée et ne normalise pas le processus d'éclaircissement.

• Les restaurations doivent être correctement scellées avant d'appliquer le produit.

• Si les symptômes de sensibilité dentaire sont observés, nous recommandons d'utiliser un dentifrice blanc pendant l'application du produit.

• Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne pas utiliser. Il n'y a pas de test rapide.

• En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demander au patient d'utiliser un gel anesthésique topique oral en vente libre ou de l'huile de vitamine E.

• Contenu du fluorure de sodium.

Instructions pas-à-pas

Préparation

1. Effectuer un examen buccal et traiter les lésions préexistantes, y compris, mais sans s'y limiter, la dentine exposée, les caries, etc. avant le traitement.

2. Déterminer et enregistrer la teinte de base.

Utiliser des photographies lorsque cela est indiqué pour la documentation de base.

Utilisation – Mélange du gel d'éclaircissement Opalescence Boost pour utilisation en cabinet

1. Saisurer que les serignes sont bien fixés.

2. Appliquer sur le petit piston transparent dans la petite seringue transparente du milieu pour rompre la membrane interne et combiner le produit d'éclaircissement et l'activateur.

3. Appuyer sur le piston de la seringue rouge, en poussant tout le contenu dans la seringue transparente.

4. Appuyer sur le piston de la seringue rouge, en poussant tout le contenu dans la seringue transparente.

5. Expirer complètement le contenu du piston transparent dans la seringue rouge.

6. Pour bien mélanger l'activateur avec le gel d'éclaircissement, pousser les pistons dans les deux directions simultanément et mélanger 25 fois de chaque côté.

7. Expirer tout le gel mélangé dans la seringue rouge.

8. Tourner pour séparer les deux serignes et éjecter l'embout recommandé (embout Mini noir) sur la seringue rouge.

9. Vérifier le débit, la consistance et que la couleur est claire, thereby becoming more obvious during treatment. Continue whitening treatment on the unaffected tooth surface blends. Re-evaluate two weeks after whitening treatment when tooth color has stabilized.

10. For a small percentage of the population, their teeth will not appreciably whiten.

• Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray, this is normal.

• Teeth can re-stain over time, so do touch up teeth whitening sessions as necessary.

• Refer to mixing card included.

Isolation – OpalDam® Resin Barrier Isolation – Barrière en résine OpalDam® (isolation recommandée)

Remove Luer lock cap from OpalDam® resin barrier and securely attach recommended delivery tip. Refer to Warnings and Precautions.

2. Verify flow prior to applying intraorally.

3. Rinse and dry teeth and gums thoroughly.

Place UltraTrend IsoBlock™ bite block and die supporting lip cheekpiece over UltraTrend Umbrella™ retractor to avoid Opalescence Boost whitening gel from contacting any soft tissue.

4. Apply OpalDam resin barrier along the gingival margin, overlapping approximately 2–3 mm into the enamel. Blend and finish one tooth beyond the most distal tooth that is being whitened. Use barrier to isolate tooth/teeth to be treated.

5. Express resin through any open embrasures onto the lingual tissue to completely seal each exposed pulp space.

Mode(s) d'application

• Seringue d'application de 1,2 mL

• Embout d'application recommandé

• Embout Mini™ noir

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

Indications d'utilisation: Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

systémiques, métaboliques ou pharmacologiques.

Ce-ci peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des niveaux importants de bilirubine, des taches de tétrazyne et de minocycline adulte, la porphyrie, l'érythroblastose fœtale et un apport élevé en fluorure.

Les patients présentant des symptômes de sensibilité dentaire doivent être traités.

Contre-indications

• Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser de produits d'éclaircissement des dents.

• Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, reportez-vous au document de sécurité des données de produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions

• Utiliser uniquement les embouts recommandés.

• Éviter le contact direct de la surface active du gel d'éclaircissement dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire.

• Pour les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préparatoire et post-opératoire avec le gel désensibilisant UltraTm™ le dentifrice blanchissant Opalescence Soutagement de la sensibilité et/ou le vernis fluoro Enamelast™ est recommandé.

• Certains patients peuvent ressentir une gêne transitoire, des irritations des gencives, de la langue, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'irritation grave, contactez votre dentiste.

• En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le patient est assis, consulter immédiatement un médecin.

• Informer les patients sur le fait que les matériaux de restauration réclairciront pas, nous recommandons l'application de la dentifrice blanche avant la mise en place de la restauration.

• Attendre au moins 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer les restaurations adhésives.

• Les patients ayant de graves problèmes de santé ne doivent pas utiliser le produit.

• Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.

• Pour éviter toute irritation supplémentaire, la santé gingivale et bucco-dentaire générale doit être évaluée avant de commencer le traitement.

• Appliquez un produit de protection adhésive à base de pâte prophylactique avant toute procédure d'éclaircissement n'est pas recommandée et ne normalise pas le processus d'éclaircissement.

• Les restaurations doivent être correctement scellées avant d'appliquer le produit.

• Si les symptômes de sensibilité dentaire sont observés, nous recommandons d'utiliser un dentifrice blanc pendant l'application du produit.

• Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne pas utiliser. Il n'y a pas de test rapide.

• En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demander au patient d'utiliser un gel anesthésique topique oral en vente libre ou de l'huile de vitamine E.

• Contenu du fluorure de sodium.

Instructions pas-à-pas

Préparation

1. Effectuer un examen buccal et traiter les lésions préexistantes, y compris, mais sans s'y limiter, la dentine exposée, les caries, etc. avant le traitement.

2. Déterminer et enregistrer la teinte de base.

Utiliser des photographies lorsque cela est indiqué pour la documentation de base.

Utilisation – Mélange du gel d'éclaircissement Opalescence Boost pour utilisation en cabinet

1. Saisurer que les serignes sont bien fixés.

2. Appliquer sur le petit piston transparent dans la petite seringue transparente du milieu pour rompre la membrane interne et combiner le produit d'éclaircissement et l'activateur.

3. Appuyer sur le piston de la seringue rouge, en poussant tout le contenu dans la seringue transparente.

4. Appuyer sur le piston de la seringue rouge, en poussant tout le contenu dans la seringue transparente.

5. Expirer complètement le contenu du piston transparent dans la seringue rouge.

6. Pour bien mélanger l'activateur avec le gel d'éclaircissement, pousser les pistons dans les deux directions simultanément et mélanger 25 fois de chaque côté.

7. Expirer tout le gel mélangé dans la seringue rouge.

8. Tourner pour séparer les deux serignes et éjecter l'embout recommandé (embout Mini noir) sur la seringue rouge.

9. Vérifier le débit, la consistance et que la couleur est claire, thereby becoming more obvious during treatment. Continue whitening treatment on the unaffected tooth surface blends. Re-evaluate two weeks after whitening treatment when tooth color has stabilized.

10. For a small percentage of the population, their teeth will not appreciably whiten.

• Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray, this is normal.

• Teeth can re-stain over time, so do touch up teeth whitening sessions as necessary.

• Refer to mixing card included.

Isolation – OpalDam® Resin Barrier Isolation – Barrière en résine OpalDam® (isolation recommandée)

Remove Luer lock cap from OpalDam® resin barrier and securely attach recommended delivery tip. Refer to Warnings and Precautions.

2. Verify flow prior to applying intraorally.

3. Rinse and dry teeth and gums thoroughly.

Place UltraTrend IsoBlock™ bite block and die supporting lip cheekpiece over UltraTrend Umbrella™ retractor to avoid Opalescence Boost whitening gel from contacting any soft tissue.

4. Apply OpalDam resin barrier along the gingival margin, overlapping approximately 2–3 mm into the enamel. Blend and finish one tooth beyond the most distal tooth that is being whitened. Use barrier to isolate tooth/teeth to be treated.

5. Express resin through any open embrasures onto the lingual tissue to completely seal each exposed pulp space.

Mode(s) d'application

• Seringue d'application de 1,2 mL

• Embout d'application recommandé

• Embout Mini™ noir

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

Indications d'utilisation: Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40% est destiné à être utilisé sur des dents saines.

Le système d'éclairc

