EN

Opalescence™ Boost™ 40%
Tooth Whitening System

Description:
Opalescence Boost 40% is a hydrogen peroxide, medical in-office whitening gel. The 2-barrel jet syringe ensures maximum strength for each application and precise dosing of the activator. One barrel contains 1.1% sodium fluoride and 3% potassium nitrate, along with a unique chemical activator, which is combined with a second barrel containing hydrogen peroxide. The final hydrogen peroxide concentration is 40%.
Indications for Use:
Opalescence Boost 40% whitening is for medical in-office use only. It is indicated by the dental professional for bleaching one or more teeth. Opalescence Boost in-office whitening is also used on non-vital teeth, including in-office intracoronal bleaching.
Opalescence Boost in-office whitening is an alternative, conservative treatment method (compared to crowns, veneers, etc.) for bleaching dark, internally discolored teeth caused by predisposed factors such as disease, traumatic or iatrogenic injury, congenital, systemic, metabolic or pharmacological influences. These can include but are not limited to elevated bilirubin levels, tetracycline and adult minocycline stains, porphyria, erythroblastosis fetalis and high fluoride intake during tooth development.
Preliminary Procedures:
1. Clean and polish teeth approximately two weeks prior to bleaching appointment.
2. Determine and record baseline shade. Use photographs when indicated for baseline documentation.
3. Prior to mixing, bring Opalescence Boost in-office whitening to room temperature.
4. WARNING: Patient, clinician and assistant must wear protective eyewear and gloves when mixing and applying this product.
Directions for Use:
Mixing Opalescence Boost in-office whitening:
1. Check syringe for proper assembly and attached.
2. Depress the small clear plunger into the middle small clear syringe to rupture internal membrane and combine bleach and activator.
3. Press the plunger of the red syringe in, pushing all contents into the clear syringe.
4. Press the plunger forward completely back into the red syringe.
5. Thoroughly mix activator with bleaching gel, push stems back and forth continually with thumbs and mix a minimum of 50 times rapidly (25 times each side).
6. Press all material into the RED syringe.
7. Twist to separate the two syringes and securely attach the applicator tip (Black Mini™ Tip) onto the red syringe. Note: Refer to mixing card included
Isolation - OpalDam™ resin barrier (recommended isolation):
1. Place Ultradent IsoBlock™ bite block and self-supporting lip/cheek retractor.
2. Remove lower lip/cheek cap from OpalDam resin barrier and securely attach a Black Mini™ Tip.
3. Verify flow jet syringe is not applying intraorally.
4. Rinse and dry teeth and gums thoroughly.
5. Express a continuous bead of OpalDam resin barrier along the gingival margin, overlapping approximately 0.5mm onto the enamel. Begin and finish the bead one tooth distant from the tooth to be bleached. Ensure that a bead of OpalDam is formed between all teeth that is being bleached.
6. Continue building the barrier apically until it is 4-6mm high and 1.5-2.0mm thick.
7. Express more dam through open embrasures onto the lingual tissue to completely seal and cover exposed papilla.
8. Using the mouth mirror, look up the long axis of the teeth for gaps or minute openings exposing the underlying tissue and re-apply resin.
9. Light cure 20 seconds per arch using a scanning motion. Carefully check resin cure with an instrument.
Isolation – Rubber Dam:
1. Apply rubber dam placing ligated clamps bi-laterally and one tooth distally to the teeth to be whitened.
2. Before attaching rubber dam to the frame, apply a bead of rubber dam Sealer at the gingival margin beneath the dam.
3. Attach dam to the frame and invert rubber dam at the gingival margin. Check for optimum seal.
Applying Opalescence Boost in-office whitening:
1. On gauze or mixing pad, verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tips and re-check. Use only recommended tips.
NOTE: If resistance continues, DO NOT use that syringe and contact Ultradent Customer Service for replacement.
2. Apply a 0.5-1.0mm thick layer of gel to the clean labial surface of the tooth.
3. Allow gel to remain on the teeth 20 minutes, periodically checking and re-applying areas that have thinned or need replenishing.
4. Suction gel from teeth using the Luer Vac and SST™ (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel. When no gel is visible, lightly rinse and air dry. Use caution not to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal.
5. Evaluate shade change after each application and monitor patient for sensitivity and irritation. If persistent tooth sensitivity occurs, discontinue use.
6. Avoid contact with soft tissue or salivary flow. If chemical irritation occurs due to the intraoral use of soft tissue contact in contact with the hydrogen peroxide gel, immediately wipe the gel from the tissue using a wet gauze and rinse the area well. Tissue should return to normal within 20-30 minutes.
7. Repeat steps 2-5 up to two additional times if desired results have not been achieved. Do not exceed 3 applications per jaw.
8. If additional in-office whitening is desired and no significant sensitivity is noted, re-schedule and retreat patient as desired. If sensitivity was experienced, repeat treatment when the sensitivity has subsided.
Clean Up:
1. Suction gel from teeth using the Luer Vac and SST™ (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip, then thoroughly rinse teeth with an antiseptic gel and the high volume suction.
2. Using a dental instrument, gently probe the interproximal OpalDam resin barrier and lift off. Check and remove any interproximal remnants.
3. If using a rubber dam, Clean-up™ Step 1, remove clamps, dam, and frame.
4. Remove rubber dam sealer with spatula, soft toothbrush, floss, suction and water spray.
NOTES:
- Whitening is used to return shade of natural teeth to the shade of the remaining non-discolored teeth or previously matching restoration.
- Whitening effect may continue for 24-48 hours following bleaching, hence a slight increase in whitening may be realized during this period.
- A single, or a few teeth can be bleached using this same instruction and applying the bleach only to those specific areas of discoloration.
- For post-op sensitivity, use potassium nitrate products such as UltraEZ® desensitizing gel immediately after treatment and for 15 minutes to 1 hour or until sensitivity subsides.
- Avoid use of prophy paste polishing before any bleaching procedure is not recommended and does not potentiate the bleaching process, but can cause sensitivity.
Contraindications/Patient Treatment Needs:
- Non-vital teeth can be bleached from both the inside out and the outside in to accelerate whitening speed/effectiveness.
1. Completely remove all the restorative and root sealing material from the pulp chamber and cervical area 2-3mm below healthy gingiva. Place a 2mm thick conventional glass ionomer or a resin modified glass ionomer, such as Ultracem™, to seal the endodontically treated root.
2. Follow the "Mixing" instructions 1-6 above.
3. Place the Black mini tip. Verify flow prior to applying intraorally.
4. Follow "Isolation" instructions above isolating both the labial and lingual sides of the tooth.
5. Express into Access opening, the labial, and if desired, the lingual surface.
6. Allow gel to remain in the tooth 20 minutes.
7. Suction gel from access opening and from the lingual using the Luer Vac and SST™ (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel.
8. When no gel is visible, lightly rinse and air dry. Use caution not to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal.
9. Evaluate shade change.
10. Repeat steps 7-11 as needed.
11. Follow "Clean-up" instructions to remove gingival barrier.
12. Seal access with a non-eugenol and non-resin provisional restorative such as UltraTemp® Regular.
NOTES:
- If additional whitening is desired, re-schedule and repeat the Opalescence Boost in-office whitening procedure above or use Opalescence Endo whitening.
- Whitening effect may continue for 24-48 hours following bleaching, hence a slight increase in whitening may be realized during this period.
- Over years, regression is to be expected and re-bleaching on an average of 3-5 years is recommended.
Precautions and Warnings:
1. Conjunival and oral health Should be confirmed before using this product.
2. Clinician, assistant, and patient must wear protective eyewear with side shields when mixing and applying Opalescence Boost in-office whitening.
3. Restorative materials will not whiten and therefore it is recommended that teeth are whitened prior to placing esthetic restorations.
4. Wait 7-10 days after bleaching procedures before placing adhesive restorations, as whitening materials interfere with bonding agents.
5. Carefully read SDS and all instructions before using.
6. Bring syringes to room temperature before mixing.
7. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. If resistance continues, DO NOT use that syringe and contact Ultradent Customer Service for replacement.
8. Use only recommended tips. Do not reuse tips to avoid cross-contamination.
9. To avoid cross-contamination, use a disposable syringe cover, re-cap, and wipe syringe with an intermediate disinfectant between uses. If these measures are not taken, the syringes should be considered single-use.
10. Keep out of reach of children.
11. Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not whiten. Consult their primary care provider prior to treatment.
12. Wear protective gloves when handling this product.
13. Before disposing of syringes aspirate water into the syringe and express liquid down the drain. Repeat a couple of times before disposing of the syringe. Make sure any gauzes used are rinsed with water.
14. Do not use on patients with a known sensitivity to peroxides, glycols, acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
15. When protecting a full arch, light cure the resin barrier on standard mode using a scanning motion for 20 seconds and keeping the tips approximately 1-1.5 mm from the barrier and tissue. When protecting tissue adjacent to fewer teeth, scan the barrier for approximately 3-5 seconds per tooth. With a dental instrument, carefully check resin for a full cure.
16. If bubbles occur along the margin of the OpalDam resin barrier after the application of Opalescence Boost in-office whitening gel, suction off gel, rinse and check for leakage. Dry area and re-apply OpalDam resin barrier to the site.
17. Cover any sensitive areas of exposed dentin.
18. For patients with known tooth sensitivity, pre-op and post-op treatment with UltraEZ desensitizing gel, Opalescence® Endo® relief toothpaste, and/or Emalaat® fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available.
19. Areas of hypocalcification, though not clinically visible, may exist and will react differently than surrounding enamel. As patient continues to whiten, the areas will begin to blend.
20. All Ultradent prior-to-delivered dental materials should never be injected.
21. Keep out of direct heat and/or sunlight.
22. Opalescence Boost in-office whitening should be used within 10 days of mixing. Keep refrigerated between uses.
23. Dispose of tips and syringe as described in above instruction and according to local regulations.
24. If the product is inadvertently ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.

Opalescence™ Boost™ 40%
Zahnaufhellungssystem

Beschreibung:
Opalescence Boost 40 % ist ein Zahnaufhellungsgel für die Zahnarztpraxis Praxis mit 40 % Wasserstoffperoxid. Die Doppelspritze mit Jet-Spritze gewährleistet über den Auslöser bei jeder Anwendung maximale Stärke und die präzise Dosierung. Ein Zylinder enthält 1,1 % Natriumfluorid und 3 % Kaliumnitrat, Er wird mit einem einzigartigen chemischen Aktivator kombiniert, der sich in einem zweiten Zylinder befindet und das Wasserstoffperoxid enthält. Der abschließende Wasserstoffperoxid Gehalt beträgt 40 %.
Gebrauchshinweise:
Opalescence Boost 40 % Zahnaufhellung ist nur für den Gebrauch in der zahnmedizinischen Praxis vorgesehen. Es wird vom Zahnarzt zur Aufhellung von einem oder mehreren Zähnen verwendet. Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis wird auch verwendet bei devitalisierten Zähnen, einschließlich intracoronaler Zahnaufhellung in der Praxis.
Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis ist eine alternative, konservative Behandlungsmethode (im Vergleich zu Kronen, Verblendungen, usw.) zur Zahnaufhellung von dunklen, internen Verfärbungen, die durch die folgenden prädisponierenden Faktoren wie z. B. durch Krankheit, traumatische oder iatrogenische Verletzung, kongenitale, systemische, metabolische oder pharmakologische Einflüsse hervorgerufen werden. Tritt eine chemische Reizung aufgrund dessen auf, dass die intraoralen Weichteile in Kontakt mit dem Wasserstoffperoxid-Gel in Berührung kommen, um Kieferschäden zu vermeiden Sondern Gewebe abwischen und die Stelle gut spülen. Das Gewebe sollte sich innerhalb von 20-30 Minuten erholen. Wiederholen.
Die Schritte 2-5 bis zu zweimal zusätzlich wiederholen, falls die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht wurden. 3 Anwendungen pro Besuch nicht überschreiten.
Nach Wunsch den Termin des Patienten nochmals einbeschreiben, nochmals behandeln, falls eine weitere Zahnaufhellung in der Praxis erwünscht ist und keine erhebliche Sensibilisierung festgestellt wird. Die Behandlung bei einer festgestellten Sensibilisierung wiederholen, wenn die Sensibilisierung nachgelassen hat.
Reinigung
1. Gel von den Zähnen mittels Luer Vac und SST™ (Surgical Suction Tip) oder einer chirurgischen Absaugspitze absaugen. Zähne mit einem antiseptischen Gel (Wasser-Spray) und großem Saugen abspülen.
2. Die Spitze eines zahnmedizinischen Instruments sanft unter die OpalDam-Kunststoff schieben und abheben. Auf verbliebene Reste in den Zahnzwischenräumen Gel entfernen.
3. Bei Verwendung eines Kofferdams Schritt 1 der Reinigungsanleitung befolgen, und Kofferdamklammern, Kofferdam und Rahmen entfernen.
4. Kofferdamdichtungsstoff mittels einer Spatel, einer weichen Zahnbürste, Zahnseide, Absaugung und einem kräftigen Luft- / Wasserspray entfernen.
HINWEISE:
- Eine Zahnaufhellung wird eingesetzt, um die Farbe von natürlichen Zähnen auf die Farbe der restlichen, nicht verfärbten Zähne oder passend zu einer frühereN Restauration anzugleichen.
- Die Wirkung der Zahnaufhellung kann nach der der Ende der Behandlung noch 24-48 Stunden anhalten, dadurch kann in diesem Zeitraum eine Verstärkung der Aufhellung erfolgen.
- Gemäß dieser Anweisung können ein einzelner Zahn oder mehrere Zähne, oder nur ein Bereich eines Zahns aufgehellt werden. In einem Fall wird die Aufhellungsgel nur auf die entsprechenden verfärbten Bereiche aufgetragen.
- Falls eine postoperative Sensibilisierung auftritt, sofort nach der Behandlung sowie danach für 15 Minuten bis 1 Stunde pro Tag Kaliumnitrat-Produkte wie z. B. UltraEZ® Desensibilisierungsgel verwenden, bis die Sensibilisierung verschwindet.
- Es wird nicht empfohlen, den Zahnschmelz zu ätzen oder Prophylaxe-Politursaste vor dem Zahnaufhellungsverfahren zu verwenden. Dadurch wird der Aufhellungsvorgang nicht potenziert, dies kann aber eine Sensibilisierung verursachen.
Endodontisch behandelte Zähne:
- Devitale Zähne können sowohl von innen nach außen oder von außen nach innen aufgehellt werden, um Geschwindigkeit/Wirkung des Zahnaufhellungsvorgangs zu beschleunigen.
1. Alle restaurativen Materialien und Material zur Zahnwurzelversiegelung vollständig aus der koronalen Pulpenkammer und bis zu 2-3 mm unterhalb der gesunden Gingiva entfernen. Einen 2 mm dicken konventionellen Glasionomer oder einen mit Kunstharz modifizierten Glasionomer einsetzen, um die wurzelkanalbehandelten endodontisch behandelten Kanal abzudichten.
2. Die Anweisungen 1-6 in „Mischung" oben befolgen.
3. Die Black mini Spitze anbringen. Vor dem Einsatz vor der intraoralen Anwendung überprüfen.
4. Die Anleitung „Isolation" oben befolgen, um sowohl die labiale als auch die lingualen Seiten des Zahns zu isolieren.
5. In die Zugangsöffnung, appliceren und auf die Innenseite des Labials und bei Bedarf die lingualen Flächen auftragen.
6. Das Gel 20 Minuten lang im Zahn verbleiben lassen.
7. Absaugung des Gels aus der Zugangsöffnung und dem Zahn unter Verwendung der Luer Lamp Vac und SST™ (Surgical Suction Tip) oder eine chirurgische Absaugspitze. Verwenden Sie kein Wasser, um Gelspritzer während des Absaugens zu vermeiden.
8. Wenn kein Gel mehr sichtbar ist, leicht spülen und luftdrucktrocknen. Vorsicht seien lassen, um die isolierende Barriere oder den Kofferdamdichtung nicht zu lösen.
9. Zahnaufhellungsergebnis bewerten.
10. Bei Bedarf Schritte 7-11 wiederholen.
11. Anleitung „Reinigung" zum Entfernen der gingivalen Barriere befolgen.
12. Zugang mit einem eugenolfreien und harzfreien provisorischen Restaurativ abdichten, wie z. B. mit UltraTemp® Regular.
HINWEISE:
- Falls eine weitere Zahnaufhellung gewünscht wird, das Zahnaufhellungsverfahren Opalescence Boost für die Praxis und wiederholen oder Opalescence Boost Endo Zahnaufhellung verwenden.
- Die Wirkung der Zahnaufhellung kann nach der Zahnaufhellung noch 24-48 Stunden andauern, dadurch kann in diesem Zeitraum eine leichte Zunahme der Aufhellung verwirklicht werden.
- Im Laufe der Jahre wird eine Rückbildung erwartet und es wird alle 3 bis 5 Jahre im Durchschnitt eine erneute Zahnaufhellung empfohlen.
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
1. Die gingivale und orale Gesundheit muss bestätigt werden, bevor das Produkt verwendet wird.
2. Behandler, Assistent und Patient müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz während des Mischvorgangs und dem Einsetzen von Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis tragen.
3. Restaurative Materialien lassen sich nicht aufhellen. Deshalb wird empfohlen, dass die Zähne vor dem Einsatz ästhetischer Restaurationen aufgehellt werden.
4. Nach dem Zahnaufhellungsverfahren 7-10 Tage warten, bis Restaurationen mit Adhäsivtechnik angebracht werden, da Zahnaufhellungsmaterialien die Haftmittel beeinflussen können.
5. Die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig lesen.
6. Spritze vor dem Mischen auf Raumtemperatur bringen.
7. Den Durchfluss aller Spritze vor der intraoralen Anwendung überprüfen. Falls Widerstand auftritt, Spitze wechseln und nochmals überprüfen. Diese Spritze NICHT verwenden, wenn weiterhin Widerstand verspürt wird. Wegen eines Ersatzes an Ultradent Kundendienst wenden.
8. Nur empfohlene Spitzen verwenden. Spitzen nicht wiederverwenden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
9. Zur Vermeidung einer Kreuzkontamination einen Einweg-Hygienebeschutz für Spritze verwenden, Deckel wieder aufschrauben, und Spritze mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel zwischen den Verwendungen abwischen. Wenn diese Maßnahmen nicht ergriffen werden, müssen die Spritzen als Spritzen für den einmaligen Gebrauch betrachtet werden.
10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
11. Schwangere oder stillende Frauen oder Patienten mit schwerwiegenden Gesundheitsbedenken sollten nicht bleichen. Vor der Behandlung den Hausarzt befragen.
12. Beim Umgang mit diesem Produkt Schutzhandschuhe tragen.
13. Vor dem Entsorgen der Spritzen Wasser in die Spritzen ansaugen und die Flüssigkeit in den Abfluss heraus drücken. Einige Male wiederholen. Gebrauchte Spritze und Spritzenkopf wird. Verbandsmull muss auf jeden Fall mit Wasser gespült werden.
14. Nicht bei Patienten verwenden, bei denen eine Sensibilisierung gegen Peroxide, Glykole, Acrylate oder andere Kunstharze bekannt ist. Bei allergischer Reaktion, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten, ein Arzt.
15. Beim Schutz eines vollständigen Zahnbogens die Kunststoffbarriere mit einer Scanbewegung für 20 Sekunden lichthärten. Die Spitzen 1-1,5 mm von der Barriere und Gewebe entfernt halten. Zum Schutz des Gewebes bei weniger Zähnen die Barriere circa 3-5 Sekunden pro Zahn. Zum Schutz der Zahnfleisch die Harz mit einem medizinischen Instrument sorgfältig auf vollständige Aushärtung überprüfen.
16. Ist absaugen, spülen und auf Leckage überprüfen, falls entlang des Rands der Opalescence Boost Zahnaufhellungsgel Blasen auftreten. Stelle trocknen und Opalescence Boost im Anschluss erneut anbringen.
17. Alle empfindlichen und exponierten Dentinbereiche abdecken.
18. Bei Patienten mit bekannten Empfindlichkeiten, prä- und postoperative mit UltraEZ Desensibilisierungsgel behandeln und/oder anschließend Opalescence® Endo® Zahnpasta und/oder Emalaat® Fluoridlack empfehlen. Je nach Schweregrad der Sensibilisierung sind andere Behandlungsmöglichkeiten verfügbar.
19. Es können klinisch unsichtbare Bereiche fehl Hypomineralisationen vorhanden sein, die schneller als der umgebende Zahnschmelz aufhellen. Während der Patient das Aufhellen fortsetzt, gleichen sich diese Bereiche an.
20. Alle vor der Lieferung an den Zahnarzt gelieferten Materialien von Ultradent dürfen niemals injiziert werden.
21. Vor direkter Sonneneinstrahlung und/oder Hitze schützen.
22. Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis muss innerhalb von 10 Tagen nach der Mischung aufgebraucht werden. Zwischen den Anwendungen gekühlt lagern.
23. Entsorgen der Kanülen und Spritze wie in der Anweisung oben beschrieben und gemäß örtlichen Bestimmungen.
24. Wenn das Produkt versehlucht wird, trinken Sie große Mengen Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn das Produkt aspiriert wird, sofort einen Arzt auf.

Opalescence™ Boost™ 40%
Système de blanchiment dentaire

Description :
Opalescence Boost 40 % est un gel de blanchiment médical contenant 40 % de peroxyde d'hydrogène. La seringue mélangeuse à 2 cylindres assure une robustesse optimale diffusaire lors de chaque application ainsi qu'un dosage précis de l'activateur. Un cylindre contient 1,1 % de fluorure de sodium et 3 % de nitrate de potassium ainsi qu'un activateur chimique unique combiné au peroxyde d'hydrogène qui dans le second cylindre. La dernière méthode permet d'obtenir une concentration finale de peroxyde d'hydrogène de 40 %.
Indications d'emploi :
Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost 40 % est exclusivement réservé à un usage médical en cabinet. Il est appliqué par le professionnel dentaire afin de blanchir une ou plusieurs dents. Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost peut également être appliqué sur les dents non vitales, y compris pour un blanchiment intracoronal de dents en cabinet.
Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost constitue une méthode alternative conservatrice (par rapport aux couronnes, aux facettes, etc.) permettant de blanchir les dents foncées et décolorées de l'intérieur en raison de facteurs de prédisposition tels que des maladies, les blessures traumatiques ou iatrogènes ainsi que les influences congénitales, systémiques, métaboliques ou pharmacologiques. Ces influences peuvent, sans toutefois se limiter à, des niveaux élevés de bilirubine, des taches de tétracycline et de minocycline chez l'adulte, une porphyrie, une érythroblastose fœtale et un apport élevé en fluor au cours du développement des dents.
Procédures préliminaires :
1. Nettoyer et polir les dents environ deux semaines avant la date de blanchiment prévue.
2. Déterminer et noter la teinte de base. Le cas échéant, prendre des photographies pour constituer la documentation initiale.
3. Avant de mélanger les composants, amener le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost à température ambiante.
4. AVERTISSEMENT : Le patient, le clinicien et l'assistant doivent porter des lunettes et des gants de protection lors du mélange et de l'application de ce produit.
Mode d'emploi :
Mélange du produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost :
1. Vérifier que les seringues ont été soigneusement vissées.
2. Appuyer sur le petit piston transparent pour l'insérer dans la petite seringue transparente du milieu pour rompre la membrane interne et mélanger le gel de blanchiment et l'activateur.
3. Appuyer sur le piston de la seringue rouge pour transférer tout son contenu dans la seringue transparente.
4. Appuyer sur le piston transparent jusqu'en butée dans la seringue rouge.
5. Pour bien mélanger l'activateur et le gel de blanchiment, remuer continuellement les tiges d'avant en arrière avec les pouces en effectuant un minimum 50 allers-retours rapides (25 de chaque côté).
6. Transférer l'ensemble du gel mélangé dans la seringue ROUGE.
7. Dévisser les deux seringues pour les séparer et fixer solidement l'embout recommandé (Black Mini™) sur la seringue rouge.
Remarque : Se référer à la notice jointe au mélangeur pour plus d'informations.
Isolation : digue en résine OpalDam™ (isolation recommandée) :
1. Placer le bloc d'occlusion Ultradent IsoBlock™ et les écarteurs autoportants pour lèvres et joues.
2. Retirer le bouchon pour lèvre inférieure de la résine OpalDam et y fixer solidement un embout Black Mini™.
3. Contrôler que le jet seringue n'applique pas.
4. Rincer et sécher soigneusement les dents et les gencives.
5. Appliquer un cordon continu de digue en résine OpalDam le long de la limite gingivale, en le faisant chevaucher d'environ 0,5 mm sur l'émail. Commencer et terminer le cordon une dent après la dent à traiter du bleu.
6. Continuer à construire la digue apicalement jusqu'à qu'elle atteigne de 4 à 6 mm de hauteur et 1,5 à 2,0 mm d'épaisseur.
7. Appliquer la résine dans les embrasures ouvertes et sur le tissu lingual pour sceller et recouvrir entièrement les papilles exposées.
8. À l'aide du miroir buccal, inspecter l'axe des dents pour détecter les espaces ou les minuscules ouvertures susceptibles d'exposer le tissu sous-jacent et réappliquer de la résine.
9. Photopolymériser pendant 20 secondes en effectuant un mouvement de balayage. Vérifier soigneusement le durcissement de la résine à l'aide d'un instrument.
Isolation : digue en caoutchouc
1. Appliquer la digue en caoutchouc en plaçant des crampons bilatéralement et sur la dent distale à la dernière dent à blanchir.
2. Avant de fixer la digue en caoutchouc au cadre, appliquer un cordon de Sealer OpalDam le long du bord gingival situé sous la digue.
3. Fixer la digue au cadre et inverser la digue en caoutchouc sur le rebord gingival. Vérifier l'étanchéité.
Application du produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost
1. Contrôler le débit de toutes les seringues sur une gaze ou un bloc de mélange avant l'application intraorale. Une fois la résistance atteinte, remplacer l'embout et procéder à une nouvelle vérification. Utiliser exclusivement les embouts recommandés.
REMARQUE : Si la résistance persiste, NE PAS utiliser cette seringue et contacter le service client Ultradent pour obtenir un remplacement.
2. Appliquer une couche de gel de 0,5 à 1,0 mm d'épaisseur sur la surface vestibulaire propre de la dent.
3. Laisser le gel sur les dents pendant 20 minutes en effectuant des contrôles périodiques et en le réappliquant sur les zones minces ou ayant besoin d'être complétées.
4. Aspirer le gel des dents à l'aide du Luer Vac et SST™ (Surgical Suction Tip) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau durant l'aspiration du gel. Une fois le gel devenu invisible, rincer légèrement et sécher à l'air. Veiller à ne pas déloger la digue d'isolation ou le cordon en caoutchouc de la digue.
5. Évaluer l'évolution de la teinte suite à chaque application et surveiller la sensibilité et l'irritation du patient. En cas de sensibilité dentaire persistante, cesser d'utiliser le produit.
6. Éviter le contact du produit avec les tissus mous ou le flux salivaire. En cas d'irritation chimique due au contact des tissus mous intrabuccaux avec le gel de peroxyde d'hydrogène, essuyer immédiatement le gel sur les tissus à l'aide d'une compresse humide puis rincer abondamment la zone concernée. Les tissus doivent revenir à un état normal en 20 à 30 minutes.
7. Répéter les étapes 2 à 5 à deux reprises supplémentaires au maximum si les résultats souhaités n'ont pas été obtenus. Ne pas dépasser 3 applications par mâchoire.
8. Si un blanchiment supplémentaire en cabinet est nécessaire et qu'aucune sensibilité significative n'a été observée, reprogrammer le patient à la convenance du praticien. En cas de nouveau traitement. S'il présente une sensibilité, répéter le traitement une fois que celle-ci a diminué.
Nettoyage
1. Aspirer le gel des dents à l'aide du Luer Vac et SST™ (Surgical Suction Tip) ou d'un embout d'aspiration chirurgical puis rincer les dents avec une pulvérisation d'air/eau en utilisant un gel antiseptique et le jet haut volume.
2. À l'aide d'un instrument dentaire, glisser soigneusement l'extrémité sous la digue en résine avec une pulvérisation d'air/eau en utilisant un gel antiseptique et le jet haut volume.
3. Si une digue en caoutchouc est utilisée, suivre l'étape de nettoyage 1. Puis retirer les crampons, la digue et le cadre.
4. Retirer la colle OpalDam Sealer à l'aide d'un instrument pointu, d'une brosse à dents souple, d'un fil dentaire ou d'un dispositif d'aspiration combiné à un jet d'air/eau ferme.
REMARQUES :
- Le blanchiment est utilisé pour assortir la teinte des dents naturelles à la teinte des autres dents non décolorées ou d'une restauration précédemment assortie.
- L'effet de blanchiment peut se poursuivre pendant 24 à 48 heures suivant le blanchiment. C'est pourquoi une légère augmentation du blanchiment peut survenir durant cette période.
- Une ou plusieurs dents peuvent être blanchies en suivant ces instructions et en appliquant l'agent de blanchiment exclusivement sur les zones décolorées.
- En cas de sensibilité postopératoire, utiliser des produits à base de nitrate de potassium tels que le gel désensibilisant UltraEZ® immédiatement après le traitement et pendant 15 minutes à 1 heure ou jusqu'à ce que la sensibilité se dissipe.
- Il est déconseillé de appliquer l'émail ou de polir à la pâte à prophylaxie avant une procédure de blanchiment car ces opérations peuvent gêner une sensibilité, sans toutefois nuire à la production du blanchiment.
Dents traitées endodontiquement :
- Les dents non vitales peuvent être blanchies de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur de manière à optimiser la vitesse et l'efficacité du blanchiment.
1. Enlever complètement tout matériau de restauration et de scellement des racines de la chambre pulpaire coronale et 2-3 mm sous la gencive saine. Placer un ciment au verre ionomère conventionnel ou un ciment au verre ionomère modifié par addition de résine de 2 mm d'épaisseur pour sceller le canal traité par endodontie.
2. Suivre les instructions 1 à 6 de la section "Mélange" ci-dessus.
3. Fixer l'embout Black mini et contrôler le débit avant l'application intraorale.
4. Suivre les instructions de la section "Isolement" ci-dessus pour isoler les faces vestibulaires et linguales de la dent.
5. Appliquer le contenu de la seringue dans la cavité d'accès, sur la face vestibulaire et si besoin sur la surface linguale.
6. Laisser le gel sur la dent pendant 20 minutes.
7. Aspirer le gel de l'ouverture d'accès à l'aide du Luer Vac et SST™ (Surgical Suction Tip) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau durant l'aspiration du gel. Une fois le gel devenu invisible, rincer légèrement et sécher à l'air. Veiller à ne pas déloger la digue d'isolation ou le cordon en caoutchouc de la digue.
8. Évaluer l'évolution de la teinte.
9. Répéter les étapes 7 à 11 si besoin.
10. Suivre les instructions de la section "Nettoyage" ci-dessus pour retirer les digues gingivales.
11. Sceller l'accès avec un produit de restauration provisoire sans oxyde de zinc-eugénol ou sans résine, tel que UltraTemp®.
REMARQUES :
- Si un blanchiment supplémentaire est nécessaire, reprogrammer et répéter la procédure de blanchiment Opalescence Boost en cabinet ci-dessus ou employer le blanchiment Opalescence Endo.
- L'effet de blanchiment peut se poursuivre pendant 24 à 48 heures suivant le blanchiment. C'est pourquoi une légère augmentation du blanchiment peut survenir durant cette période.

Opalescence™ Boost™ 40%
Sistema di sbiancamento dentale

Descrizione:
Opalescence Boost 40% è un gel di sbiancamento, medico, ambulatoriale, a base di perossido di idrogeno 40%. La siringa di miscelazione a getto a doppia camera assicura la massima quantità per ogni applicazione e un dosaggio preciso dell'attivatore. Una camera contiene 1,1% di fluoruro di sodio e il 3% di nitrato di potassio, insieme a un attivatore chimico unico che si combina con il perossido di idrogeno contenuto nella seconda camera. La concentrazione finale di perossido di idrogeno è del 40%.
Indicazioni per l'uso:
Opalescence Boost 40% è destinato esclusivamente all'uso medico ambulatoriale. Viene applicato dal professionista dentale sbiancare uno o più denti. Lo sbiancamento Opalescence Boost ambulatoriale è usato anche su denti devitalizzati, inclusa lo sbiancamento intracoronale ambulatoriale. Lo sbiancamento ambulatoriale Opalescence Boost ambulatoriale rappresenta, rispetto a trattamenti con corone, faccette ecc., un'alternativa conservativa per sbiancare i denti scuri, discromici internamente, a causa di fattori di predisposizione come patologie, traumi o iatrogenesi congenite, sistemiche, metaboliche o farmacologiche. Queste possono includere, a titolo esemplificativo ed non esaustivo, livelli elevati di bilirubina, tetracicline e macchie di minocicline in adulti, porfiria, eritroblastosi fetale e assunzione di quantità eccessive di fluoro durante lo sviluppo dei denti.
Procedure preliminari:
1. Pulire e lucidare i denti due settimane circa prima dell'appuntamento per lo sbiancamento.
2. Determinare e registrare la tonalità di base. Quando indicato, per la documentazione di base, effettuare delle foto.
3. Prima della miscelazione, portare lo sbiancante Opalescence Boost ambulatoriale a temperatura ambiente.
4. AVERTENZA: Il paziente, il clinico e l'assistente devono indossare i guanti e delle protezioni per gli occhi durante la miscelazione e l'applicazione di questo prodotto.
Istruzioni di uso:
Miscelazione dello sbiancante Opalescence Boost ambulatoriale
1. Controllare che le 2 siringhe siano avvitate tra di loro correttamente.
2. Premere il pistollo stantuffo chiaro nella piccola siringa chiara centrale per rompere la membrana interna e combinare lo sbiancante con l'attivatore.
3. Premere lo stantuffo della siringa rossa, premendo tutto il contenuto nella siringa chiara.
4. Reinserire completamente lo stantuffo chiaro nella siringa rossa.
5. Per l'inoculazione uniformemente l'attivatore con il gel sbiancante, premere gli stantuffi avanti a indietro continuamente con le dita. Mescolare rapidamente almeno 50 volte (25 volte per lato).
6. Spingere tutto il gel miscelato nella siringa ROSSA.
7. Ruotare le siringhe per separarle e fissare in modo sicuro l'una dall'altra e avvitare il modo completo il puntale (Black Mini™) alla siringa ROSSA.
Nota: Consultare la scheda di miscelazione inclusa
Isolamento - Barriera di resina OpalDam™ (isolamento raccomandato):
1. Posizionare il blocco occlusale Ultradent IsoBlock™ e i retrattori di autosupporto per labbra/guance.
2. Rimuovere il tappo del labbro inferiore dalla barriera OpalDam e avvitare in modo completo un puntale Black Mini™.
3. Verificare il flusso prima di applicare all'interno della bocca.
4. Sciacquare e asciugare scrupolosamente i denti e le gengive.
5. Applicare un cordone continuo di barriera di resina OpalDam lungo il margine gengivale, sovrapponendo circa 0.5mm sullo smalto. Iniziare e terminare il cordone un dente oltre al dente più distale che viene sbiancato.
6. Continuare a costruire la barriera apicale fino a quando non raggiunga un'altezza di 4-6mm e uno spessore di 1.5-2.0mm.
7. Applicare la resina in eccesso attraverso qualsiasi fessura aperta sul tessuto linguale per sigillare completamente e coprire le papille esposte.
8. Usando lo specchietto per la bocca, osservare l'asse lungo del dente per le eventuali fessure o aperture minuscole che possono esporre il tessuto sottostante e riapplicare la resina.
9. Polimerizzare con la lampada fotopolimerizzatrice per 20 secondi per arco, usando un movimento di scansione. Controllare attentamente la polimerizzazione della resina con uno strumento.
Isolamento - diga di gomma
1. Applicare la diga di gomma posizionando bilateralmente dei ganci legati e un dente oltre al dente distale da sbiancare.
2. Prima di agganciare la diga di gomma al telaio, applicare un cordone di sigillante per diga di gomma in corrispondenza del margine gengivale più distale all'estremità del dente.
3. Agganciare la diga al telaio e rimboccare la diga di gomma sul margine gengivale. Controllare che la tenuta ottimale.
Veiller à n'ôter les gaines à Raka.
14. Ne pas utiliser le produit chez les patients présentant une sensibilité connue aux peroxydes, glycols, acrylates ou autres résines. En cas de réaction allergique, de dermatite ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
15. Lors de la protection d'

hampaan valkaisemiseksi. Opalescence Boost vastaanotolla tehtävää valkaisua käytetään myös ei-elinvoimaisin hampain, mukaan lukien kruunuristiinnen valkaisu. Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisu on valitsetoitteinen, konservatiivinen menetelmä (verattuna kruunuihin, päällysteisiin, jne.) tummien, altisteisen tekijöiden (kuten sairauden, traumaattisen tai iatrogeenisen varhian, syrinyminäisen, syteemisen, metabolisen tai farmakologisen valkuhuksen) aiheuttamien hampaiden sisäisten värjäytymien valkaisuun. Nämä voivat sisältää, mutta eivät rajoitu, kohonneet bilirubiinitasot, tetrasykliini- ja alkuisten minosyklinohtarhat, porfyrian, erytroblastoosin fetalis ja korkean fluoridiensaannin hampaan kehityksen aikana.

Alustavat toimenpiteet:
1. Puhdista ja kiillota hampaat non kaksi viikkoa ennen valkaisuaikaa.
2. Määritä ja kirjaa perussävy. Käytä valokuvia perussävy-dokumentaatiosta.
3. Tuo Opalescence Boost huoneenlämpöön ennen sekoittamista.
4. VAROITUS: Protilaan, kiinikön ja avustajan pitää käyttää suojalasja ja -kaisinta tuotetta sekoitettessa ja annostelipussa.

Käyttöohjeet:
Opalescence Boost vastaanotolla tehtävän valkaisun sekoittaminen
1. Tarkista että ruiskot on kiinnitetty tukevasti.
2. Paina pieni, kirkas mäntä pienen, kirkkaan ruiskun keskelle puhdistaakseksi sisäkkaivo ja yhdistämisen valkaisuaine ja aktivaattori.
3. Paina punainen ruiskun mäntä sisään työntäen sen koko sisälö kirkkaaseen ruiskuun.
4. Paina kirkas mäntä kokonaan takaisin punaiseen ruiskuun.
5. Paina kartsa hampaasi edestakaisin peukalosormellasi 50 kertaa (25 kertaa kullekin puolelle) sekoittaaksesi aktivaattori huolellisesti valkaisuaineen.
6. Paina kaikki sekoitettu geeli PUNAISEEN ruiskuun.
7. Käännä erottaakseesi ruiskut ja kiinnittäaksesi tukevasti suosittelu pää Black Mini™ -jaki pimeyteen ruiskuun. Huomaa: Käytä mukana toimitettua sekoituskortti.

Eristys - OpalDam™ hartsiseste (suositeltu eristys):
1. Aseta ultraviolet SolBlock™ -jaki pimeyteen ruiskut huoli poski sisäänerkjati.
2. Poista Luer-lukon korkki OpalDam-hartsiesteestä ja kiinnitä Black Mini™ -pää tukevasti.
3. Varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
4. Huritrele ja kuivaa hampaat ja kiinnitä huolellisesti.
5. Annostele kaltaemaarton kerros OpalDam-hartsiesteittä ikenen reunaan, limittäen mieli ikenen ja hampaan sähkä. Aloita ja lopeta kerroksesi yksi hammas yli distaalisimmasta, valkaistavasta hampaasta.
6. Jatka esteen annostelemista apikaalisesti kunnes se on 3-6mm korkea ja 1.5-2.0mm paksu.
7. Paina hartsia kaikkien avoimien hammasvälien kielikuoleksin sivustaista ja peitäksesi palpaisuneet nystyt.
8. Etsi hampaan pitkällä sivulla aukkoja tai pienä alla olevan kuitenkaan valkaisu hampaat ja kiinnitä hartsiesteittä annostele hartsi uudestaan.
9. Kovetaa valolla 20 sekunnin ajan kaarta kohden pyyhkäisemällä lakeilla hartsia SolBlock hartsin kovettumisen huolellisesti instrumentilla.

Eristys - Kumidamme (Dam)
1. Annostele kumisulku asetaen sidokut puristimet bilateraalisesti ja distaalisesti yksi hammas valkaistavasta hampaasta.
2. Annostele kerros kumisulkuluistettä ikenen reunaan sulun alle ennen kumisulun kiinnittämistä kehykseen.
3. Kiinnitä sulku kehykseen ja kiinnitä kumisulku ikenen rajaan. Tarkista optimaalinen tiivistys.

Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisu
1. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus harsolla tai sekoituksuitsalla ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan. Käytä vain suosituttuja pääta.

HUOMAUTUS: Mikäli vastustus jatkuu, ALÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
2. Annostele 0.5-1.0mm paksu kerros geelitä hampaan puhtaalle, kuivaalle pinnalle.
3. Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi, ja tarkista ja uudelleen annostele säännöllisesti aluelle jotka ovat ohentuneet tai tarvitsevat täydennystä.
4. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta. Ala käytä pyyhkeitä imettäessä valtäisäksesi geelirioiskeita. Huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmalla kun näkyvä geeli ei ole. Noudata varovaisuutta ettei ristä eristyksestä ja kuivaa liikaa.
5. Arvioi sävy muutos joukosen annostelun jälkeen ja seuraa potilasta ylihenkilyyden ja arvyksen varalta. Lopeta käyttö mikäli jatkuvaa hammasyliherkkyyttä havataan.
6. Valtä kontaktia pehmytkuoleksi tai yläpuolisen kanssa. Pyhi geeli välittömästi kuoleksesi ensiä alla harsolla ja huuhtele alue hyvin mikäli kemiallista ärsytystä syntyy vieperjoksedigeelin päästeesi kosketuksen sisäisäisen pehmytkuoleksen. Kuoleksen tulisi palautua normaaliksi 20-30:n minuutin kuluessa.
7. Toista vaiheet 2-5 ensiksi kaksi kertaa mikäli huritujua tulokisia ei ole saavutettu. Ala yötä 3:a annostelua kyhäytektaa kohden.
8. Varaa uusi alka mikäli vastaanotolla tehtävä valkaisu haluaan toistaa esiä merkittävä yliherkkyytä havaittu. Toista käsittely kun yliherkkyys on laantunut mikäli yliherkkyytä havaittiin.

Puhdistus
1. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta, ja huuhtele sitten huolellisesti ilmalla /vesisuihkulla ja korkeatehoisella imulla.
2. Liu'uta pää heikkaroen OpalDam-hartsiesteen alle ja nosta pois käytetyn dentaali-esteen hartsia. Tarkista ja poista kaikki interproksimaaliset jäännökset.
3. Nuudata puhdistuspuisen vaihtelta 1 mikki kaylä kumisilaa, jaa puisto puristimen, sulku ja kehys.
4. Poista kumisulun tiivisteitä, pehmeällä hammasharjalla, hammaspasta, imulla ja vakaalla ilma /vesisuihkulla.

HUOMAUTUKSIA:
- Valkaisua käytetään palautumaan hampaan luonnollinen väry vastaamaan varjäytymättömien hampaiden sävyä tai edellistä vastaavaa koriyasta.
- Valkaisuaikoja voi jaksa 24-48 tuntia valkaisun jälkeen, otten tänä aikana saattaa tapahtua pieni lisäys valkaisuun.
- Yöstänen ja ei suositella ylipitkiä valkaisuaikoja. Kaksi on ohjeiden mukaan ja annostelemalla valkaisuainetta vain kerran ja ylipitkiä valkaisuaikoja.
- Käytä kaltaisuitteistettuja kuten UltraZ™ -siedätysgeeliä operaatioon jälkeeseen yliherkkyyteen välittömästi käsittelyn jälkeen ja 15-60 minuutin ajan päivässä kunnes yliherkkyys laantuu.
- Hammaskiillehen etsaaminen tai kiillottaminen prophy-tahtoilla ennen mitään valkaisuhenpidettä ei ole suositeltavaa eikä esiätä valkaisuprosessia, mutta voi aiheutua yliherkkyyttä.

Juurihoidetut hampaat:
- Ei-elinvoimaiset hampaat voidaan valkaista sekä sisäitä ulos että ulkoa sisälle valkaisunopeuden/tehokkuuden kihdyttämiseksi.
- Poista pakka ja juurikanavan täytteinen kokonaisuudessaan kruunu ehjäänsä tai sekä 2-3 mm terveen ienrajan alapuolella. Tayä juurihoidettu kanava 2 mm palkoseksi tavallisella lätä-rinnoitetulla tai resiinillä vahvistettuilla lasi-ionomeerillä, kuten esimerkiksi UltraCem™-tuotteella.
- Valkaise kuten ei-elinvoimaisilla 1-6 yllä.
- Liitä tai muista (Black) mäkipä ja varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
- Seuraa eristysohjeita yllä ja eristä hampaan labiaalinen ja linguaalinen puoli.
- Paina aukkoon labiaalinen ja halutessa linguaalinen pinta.
- Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi.
- Ime geeli aukosta ja hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta. Ala käytä vettä geelä imettäessä valttääksesi geelirioiskeita.
- Poista Luer-lukon korkki OpalDam-hartsiesteestä ja kiinnitä Black Mini™ -pää tukevasti.
- Varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
- Huritrele ja kuivaa hampaat ja kiinnitä huolellisesti.
- Annostele kaltaemaarton kerros OpalDam-hartsiesteittä ikenen reunaan, limittäen mieli ikenen ja hampaan sähkä. Aloita ja lopeta kerroksesi yksi hammas yli distaalisimmasta, valkaistavasta hampaasta.
- Jatka esteen annostelemista apikaalisesti kunnes se on 3-6mm korkea ja 1.5-2.0mm paksu.
- Paina hartsia kaikkien avoimien hammasvälien kielikuoleksin sivustaista ja peitäksesi palpaisuneet nystyt.
- Etsi hampaan pitkällä sivulla aukkoja tai pienä alla olevan kuitenkaan valkaisu hampaat ja kiinnitä hartsiesteittä annostele hartsi uudestaan.
- Kovetaa valolla 20 sekunnin ajan kaarta kohden pyyhkäisemällä lakeilla hartsia SolBlock hartsin kovettumisen huolellisesti instrumentilla.

Eristys - Kumisulku (Dam)
1. Annostele kumisulku asetaen sidokut puristimet bilateraalisesti ja distaalisesti yksi hammas valkaistavasta hampaasta.
2. Annostele kerros kumisulkuluistettä ikenen reunaan sulun alle ennen kumisulun kiinnittämistä kehykseen.
3. Kiinnitä sulku kehykseen ja kiinnitä kumisulku ikenen rajaan. Tarkista optimaalinen tiivistys.

Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisu
1. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus harsolla tai sekoituksuitsalla ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan. Käytä vain suosituttuja pääta.

HUOMAUTUS: Mikäli vastustus jatkuu, ALÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
2. Annostele 0.5-1.0mm paksu kerros geelitä hampaan puhtaalle, kuivaalle pinnalle.
3. Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi, ja tarkista ja uudelleen annostele säännöllisesti aluelle jotka ovat ohentuneet tai tarvitsevat täydennystä.
4. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta. Ala käytä pyyhkeitä imettäessä valtäisäksesi geelirioiskeita. Huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmalla kun näkyvä geeli ei ole. Noudata varovaisuutta ettei ristä eristyksestä ja kuivaa liikaa.
5. Arvioi sävy muutos joukosen annostelun jälkeen ja seuraa potilasta ylihenkilyyden ja arvyksen varalta. Lopeta käyttö mikäli jatkuvaa hammasyliherkkyyttä havataan.
6. Valtä kontaktia pehmytkuoleksi tai yläpuolisen kanssa. Pyhi geeli välittömästi kuoleksesi ensiä alla harsolla ja huuhtele alue hyvin mikäli kemiallista ärsytystä syntyy vieperjoksedigeelin päästeesi kosketuksen sisäisäisen pehmytkuoleksen. Kuoleksen tulisi palautua normaaliksi 20-30:n minuutin kuluessa.
7. Toista vaiheet 2-5 ensiksi kaksi kertaa mikäli huritujua tulokisia ei ole saavutettu. Ala yötä 3:a annostelua kyhäytektaa kohden.
8. Varaa uusi alka mikäli vastaanotolla tehtävä valkaisu haluaan toistaa esiä merkittävä yliherkkyytä havaittu. Toista käsittely kun yliherkkyys on laantunut mikäli yliherkkyytä havaittiin.

Puhdistus
1. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta, ja huuhtele sitten huolellisesti ilmalla /vesisuihkulla ja korkeatehoisella imulla.
2. Liu'uta pää heikkaroen OpalDam-hartsiesteen alle ja nosta pois käytetyn dentaali-esteen hartsia. Tarkista ja poista kaikki interproksimaaliset jäännökset.
3. Nuudata puhdistuspuisen vaihtelta 1 mikki kaylä kumisilaa, jaa puisto puristimen, sulku ja kehys.
4. Poista kumisulun tiivisteitä, pehmeällä hammasharjalla, hammaspasta, imulla ja vakaalla ilma /vesisuihkulla.

HUOMAUTUKSIA:
- Valkaisua käytetään palautumaan hampaan luonnollinen väry vastaamaan varjäytymättömien hampaiden sävyä tai edellistä vastaavaa koriyasta.
- Valkaisuaikoja voi jaksa 24-48 tuntia valkaisun jälkeen, otten tänä aikana saattaa tapahtua pieni lisäys valkaisuun.
- Yöstänen ja ei suositella ylipitkiä valkaisuaikoja. Kaksi on ohjeiden mukaan ja annostelemalla valkaisuainetta vain kerran ja ylipitkiä valkaisuaikoja ei suositella.
- Käytä kaltaisuitteistettuja kuten UltraZ™ -siedätysgeeliä operaatioon jälkeeseen yliherkkyyteen välittömästi käsittelyn jälkeen ja 15-60 minuutin ajan päivässä kunnes yliherkkyys laantuu.
- Hammaskiillehen etsaaminen tai kiillottaminen prophy-tahtoilla ennen mitään valkaisuhenpidettä ei ole suositeltavaa eikä esiätä valkaisuprosessia, mutta voi aiheutua yliherkkyyttä.

Juurihoidetut hampaat:
- Ei-elinvoimaiset hampaat voidaan valkaista sekä sisäitä ulos että ulkoa sisälle valkaisunopeuden/tehokkuuden kihdyttämiseksi.
- Poista pakka ja juurikanavan täytteinen kokonaisuudessaan kruunu ehjäänsä tai sekä 2-3 mm terveen ienrajan alapuolella. Tayä juurihoidettu kanava 2 mm palkoseksi tavallisella lätä-rinnoitetulla tai resiinillä vahvistettuilla lasi-ionomeerillä, kuten esimerkiksi UltraCem™-tuotteella.
- Valkaise kuten ei-elinvoimaisilla 1-6 yllä.
- Liitä tai muista (Black) mäkipä ja varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
- Seuraa eristysohjeita yllä ja eristä hampaan labiaalinen ja linguaalinen puoli.
- Paina aukkoon labiaalinen ja halutessa linguaalinen pinta.
- Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi.
- Ime geeli aukosta ja hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgistä imupääta. Ala käytä vettä geelä imettäessä valttääksesi geelirioiskeita.
- Poista Luer-lukon korkki OpalDam-hartsiesteestä ja kiinnitä Black Mini™ -pää tukevasti.
- Varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
- Huritrele ja kuivaa hampaat ja kiinnitä huolellisesti.
- Annostele kaltaemaarton kerros OpalDam-hartsiesteittä ikenen reunaan, limittäen mieli ikenen ja hampaan sähkä. Aloita ja lopeta kerroksesi yksi hammas yli distaalisimmasta, valkaistavasta hampaasta.
- Jatka esteen annostelemista apikaalisesti kunnes se on 3-6mm korkea ja 1.5-2.0mm paksu.
- Paina hartsia kaikkien avoimien hammasvälien kielikuoleksin sivustaista ja peitäksesi palpaisuneet nystyt.
- Etsi hampaan pitkällä sivulla aukkoja tai pienä alla olevan kuitenkaan valkaisu hampaat ja kiinnitä hartsiesteittä annostele hartsi uudestaan.
- Kovetaa valolla 20 sekunnin ajan kaarta kohden pyyhkäisemällä lakeilla hartsia SolBlock hartsin kovettumisen huolellisesti instrumentilla.

Varotoimenpiteet ja varoitukset
1. Ienten ja suun terveys tulisi varmistaa ennen tämän tuotteen käyttämistä.
2. Kliinikon, avustajan ja potilaan on käytettävä sivusuojallisia suojalasja Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisua sekoittamassa ja annostelemassa.
3. Korjaavat materiaalit eivät valkaistu ja täten on suositeltavaa valkaista hampaat enen estettittä korjaavien käyttöä.
4. Odota 7-10 päivää valkaisutoimenpiteiden jälkeen ennen adheesiivisä korjaaksia, koska valkaisumateriaali vaikuttaa kiinnitemateriaalien toimintaan.
5. Lue SDS ja käikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
6. Ilu ruiskut huoneenlämpöön ennen sekoittamista.
7. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havataan. Käytä vain suosituttuja pääta.

HUOMAUTUS: Mikäli vastustus jatkuu, ALÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
8. Ruiskaana olevien tai mennyttenen naisten, tai potilaiden joilla on valoavista tervesyongelmia, hampaita ei tulisi valkaista. Keskustele hrestdin ensisijaisen hoidon tarpeja kansa kanssa ennen toimenpidettä.
9. Valtä kontaktia pehmytkuoleksi tai yläpuolisen kanssa. Pyhi geeli välittömästi kuoleksesi ensiä alla harsolla ja huuhtele alue hyvin mikäli kemiallista ärsytystä syntyy vieperjoksedigeelin päästeesi kosketuksen sisäisäisen pehmytkuoleksen. Kuoleksen tulisi palautua normaaliksi 20-30:n minuutin kuluessa.
10. Toista vaiheet 2-5 ensiksi kaksi kertaa mikäli huritujua tulokisia ei ole saavutettu. Ala yötä 3:a annostelua kyhäytektaa kohden.
11. Varaa uusi alka mikäli vastaanotolla tehtävä valkaisu haluaan toistaa esiä merkittävä yliherkkyytä havaittu. Toista käsittely kun yliherkkyys on laantunut mikäli yliherkkyytä havaittiin.
12. Ylitä suositellut ajat.
13. Ylitä suositellut annostelumäärät.
14. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
15. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
16. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
17. Pitä dentiinin herkät, paljastuneet osat.
18. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
19. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
20. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
21. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
22. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
23. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
24. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
25. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
26. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
27. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
28. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
29. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
30. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
31. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
32. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
33. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
34. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
35. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
36. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
37. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
38. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
39. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
40. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
41. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
42. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
43. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
44. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
45. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
46. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
47. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
48. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
49. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
50. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
51. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
52. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
53. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
54. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
55. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
56. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
57. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
58. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
59. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
60. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
61. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
62. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
63. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
64. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
65. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
66. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
67. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
68. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
69. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
70. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
71. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
72. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
73. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
74. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
75. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
76. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
77. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
78. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
79. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
80. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
81. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
82. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
83. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
84. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
85. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
86. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
87. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
88. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
89. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
90. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
91. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
92. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
93. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
94. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
95. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
96. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
97. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
98. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
99. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
100. Ylitä suositellut annostelutiheydet.

Varoitukset
1. Ienten ja suun terveys tulisi varmistaa ennen tämän tuotteen käyttämistä.
2. Kliinikon, avustajan ja potilaan on käytettävä sivusuojallisia suojalasja Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisua sekoittamassa ja annostelemassa.
3. Korjaavat materiaalit eivät valkaistu ja täten on suositeltavaa valkaista hampaat enen estettittä korjaavien käyttöä.
4. Odota 7-10 päivää valkaisutoimenpiteiden jälkeen ennen adheesiivisä korjaaksia, koska valkaismateriaali vaikuttaa kiinnitemateriaalien toimintaan.
5. Lue SDS ja käikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
6. Ilu ruiskut huoneenlämpöön ennen sekoittamista.
7. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havataan. Käytä vain suosituttuja pääta.

HUOMAUTUS: Mikäli vastustus jatkuu, ALÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
8. Ruiskaana oleviin tai mennyttenen naisten, tai potilaiden joilla on valoavista tervesyongelmia, hampaita ei tulisi valkaista. Keskustele hrestdin ensisijaisen hoidon tarpeja kansa kanssa ennen toimenpidettä.
9. Valtä kontaktia pehmytkuoleksi tai yläpuolisen kanssa. Pyhi geeli välittömästi kuoleksesi ensiä alla harsolla ja huuhtele alue hyvin mikäli kemiallista ärsytystä syntyy vieperjoksedigeelin päästeesi kosketuksen sisäisäisen pehmytkuoleksen. Kuoleksen tulisi palautua normaaliksi 20-30:n minuutin kuluessa.
10. Toista vaiheet 2-5 ensiksi kaksi kertaa mikäli huritujua tulokisia ei ole saavutettu. Ala yötä 3:a annostelua kyhäytektaa kohden.
11. Varaa uusi alka mikäli vastaanotolla tehtävä valkaisu haluaan toistaa esiä merkittävä yliherkkyytä havaittu. Toista käsittely kun yliherkkyys on laantunut mikäli yliherkkyytä havaittiin.
12. Ylitä suositellut ajat.
13. Ylitä suositellut annostelumäärät.
14. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
15. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
16. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
17. Pitä dentiinin herkät, paljastuneet osat.
18. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
19. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
20. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
21. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
22. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
23. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
24. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
25. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
26. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
27. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
28. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
29. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
30. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
31. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
32. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
33. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
34. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
35. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
36. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
37. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
38. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
39. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
40. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
41. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
42. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
43. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
44. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
45. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
46. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
47. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
48. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
49. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
50. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
51. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
52. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
53. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
54. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
55. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
56. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
57. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
58. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
59. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
60. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
61. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
62. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
63. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
64. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
65. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
66. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
67. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
68. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
69. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
70. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
71. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
72. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
73. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
74. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
75. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
76. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
77. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
78. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
79. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
80. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
81. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
82. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
83. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
84. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
85. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
86. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
87. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
88. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
89. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
90. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
91. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
92. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
93. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
94. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
95. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
96. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
97. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
98. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
99. Ylitä suositellut annostelutiheydet.
100. Ylitä suositellut annostelutiheydet.

Säilytys
1. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa valosuojattuna. Ei saa jäätyä.
2. Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Hävittäminen
1. Hävittäkä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Tanim:
Opalescence Boost %40 hidrojen peroksit içerikli, ofis tipi bibb beyazlatıcı jel. Hazneli jel karıştırma şırıngası her uygulamada maksimum güç ve aktivatör dozunun hassas biçimde ayarlanmasını sağlar. Haznenin birinde benzersiz bir kimyasal aktivatör, %1,1 sodyum florür ve %3 potasyum nitrat bulunur. Bu içerik, ikinci haznede bulunan ve jel ile karıştırılan, Opalescence Boost Ofis Beyazlatıcı Jel'in sağlıklı dişlere ve dokulara yönelik olmayan etkisini artırmak amacıyla diğer hidrojen peroksit ile karıştırılır. Son hidrojen peroksit konsantrasyonu %40'tır.

Bulunan Endikasyonları:
Opalescence Boost %40 beyazlatıcı, sadece ofis tipi bibb kullanımı içindir. Bir veya birden fazla dişin beyazlatılması amacıyla diş hekimi tarafından uygulanır. Opalescence Boost, ofis tipi intrakoronal beyazlatma da dâhil olmak üzere nonvital dişlerde de kullanılır.

Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcı, hastalık, travma veya iyatrojenden kaynaklanan varyasyonlar gibi, metabolik veya farmakolojik etkiler gibi yatkınlık yaratan faktörlere bağlı olarak iç kaynaklı renk değişimi görülen, koyu dişlerin (kronik, ilaçlanmalara ve neyzilik) ve potasyum yönelik alternatif, konservatif bir yöntemdir. Bu faktörler arasında yüksekmiş bilirubin seviyeleri, tetrasiklin ve erişkin minozikin kökeni, porfiri, eritroblastosis fetalis ve gelişimi sürecinde yüksek florür alımı sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ön İşlemler:
1. Beyazlatma randevusundan yaklaşık iki hafta önce dişleri temizleyip cilalayın.
2. Başlangıç rengini belirleyip kaydedin. Başlangıcın belgelenmesi için endişe ile fotoğraf çekin.
3. Karıştırmadan önce Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcıyı oda sıcaklığına getirin.
4. UYARI: Bu beyazlatıcıyı karıştırırken ve uygularken hasta, klinisyen ve asistan koruyucu gözlük ve eldiven takmalıdır.

Kullanım Talimatları:
Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma
1. Karıştırma şırıngalarının sağlam olduğundan emin olun.
2. Küçük şaffaf pistonu, ortadaki küçük şaffaf şırınganın bastırarak iç yarı yırtılır ve beyazlatıcı ile aktivatörü birleştirin.
3. Kırmızı şırınganın pistonunu bastırarak tüm içeriği şaffaf şırınganın içine itin.
4. Şaffaf şırınganın pistonunu kırmızı şırınganın sonuna kadar geri itin.
5. Şırınga pistonlarını baş parmağınızla sürekli olarak ileri geri İterek aktivatör ile beyazlatıcı jeli iyice karıştırın. En az 50 defa hızlı bir şekilde karıştırın (her tarafı 25 defa).
6. Karıştırılan jeli, kırmızı şırınganın KİMİ UÇ ucunuza bağlayın. Çevirerek iki şırınganı çıkarın ve önerileri ücu (veya Black Mini™) uçlarınızın ucuna takarak takın. Not: Dahil olan karıştırma kartına bakın

İzolasyon - OpalDam™ rezin bariyer (önerilen izolasyon)
1. Ultradent SolBlock™ Işınla Bloğunu ve kendinden destekli dişlerdaki/yumuşak dokudaki yerleştirin.
2. OpalDam rezin bariyerden Luer kilit kapağı çıkarıp sıkıca bir veya Black Mini™ uç uç takın.
3. Ağız içi uygulamadan önce akışı doğrulayın.
4. Diğeri ve diş etrafını ıyice ıslayıp kurutun.
5. Gingival marjın boyunca, mineyi yaklaşık 0,5 mm kaplayacak şekilde, ucu yağlı halinde bulunan bir OpalDam rezin bariyer tabakası uygulayın. Beyazlatılan diğer en dişal dişlerin sonraki dişte çizgisi başlayıp bitirin.
6. Bariyer 4–6 mm uzunluğunda, 1.5–2.0 mm kalınlığında olana kadar uygulamaya devam edin.
7. Lingual kısımda ayrı bir kalınlıkta bariyer rezin uygulayarak açık papillayı tamamen örtüp kapatın.
8. Ağız ayna veya kullanılan diğer aletlerle ekseninde alt ölçüyü açıkta bırakan boşluk veya küçük açıklıklar olup olmadığını kontrol edin, varsa rezin yeniden uygulayın. Tamamlanmadan önce en az 20 saniye ışınla polimerize edin. Alet kullanarak rezin polimerizasyonunu dikkatle kontrol edin.

İzolasyon – İzolasyon Lastiği
1. Lastik yerleştirilmeden bilateral olarak, beyazlatılacak dişin bir diş distaline yerleştirerek izolasyon lastiği uygulayın.
2. İzolasyon lastiğini çerçeveye takmadan önce lastiğin altındaki gingival marjine izolasyon lastiği örtücüyü çizgi şeklinde uygulayın.
3. Lastiği çerçeveye takın ve izolasyon lastiğini gingival sınırda ters çevirin. Optimum izolasyon sağlandığından kontrol edin.

Opalescence Boost ofis tipi beyazlatmanın uygulanması
1. Ağız içi uygulamadan önce tüm şırıngaların akıtılıp akıtılmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa, ucu kesin veya karışılaşmanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin. Sadece önerilen uçları kullanın.
2. Uçlar takılı ve SST™ (Surgical Suction Tip) veya bir cerrahi aspirasyon ucu kullanarak jeli dişten aspire edin. Jelin sıçramasını önlemek için jeli aspire ederken sıvı kullanmayın.
3. Gözünün ağzı ve dişleri kurutmak yıkayıp hava ile kurutun. İzolasyon bariyerinin veya izolasyon lastiğinin yerinden oynamamasına dikkat edin.
4. Renk değişimini değerlendirin.
10. Gerekirse 7–11 arasındaki adımları tekrar edin.
11. Original Beyazlatma Rehberi ile "Temizleme" talimatlarını takip edin.
12. Erişim açıklığını TirAnyag™ Normal gibi işlenolsu ve rezinsiz bir geçici restoratif ile örtün.

NOTLAR:
- Ek beyazlatma gerekirse yeniden randevu vererek yukarıdaki Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma talimatlarını izleyerek ek be