



البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال في آيسلندا اعتبارًا من يناير 2025

العمر: التطعيم ضد:

أثناء الحمل	السعال الديكي (بوستريكس، يُعطى للأم في الأسبوع الثامن والعشرين تقريبًا من الحمل)
6 أسابيع	فيروس الروتا (قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك)
3 أشهر	فيروس الروتا (قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك)، DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنثافاك) وPCV (فاكسنيوفانس)
5 أشهر	فيروس الروتا (قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك)، DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنثافاك) وPCV (فاكسنيوفانس)
12 شهرًا	DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنثافاك)، وPCV (فاكسنيوفانس) وmenACWY (منكوادفي)
18 شهرًا	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ولقاح جدري الماء النطاقي (VZV) (بروكواد)
2,5 سنة	فيروس جدري الماء النطاقي (فاريلريكس)
4 سنين	ديتاب (DTaP) (بوستريكس)
12 سنة	لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (M-M-RVAXPRO) فيروس الورم الحليمي البشري (جارداسيل 9؛ جميع الأنواع)
14 سنة	ديتاب-بوليو (ريفاكس)

59-6 شهرًا:
تطعيم الأنفلونزا
الموسمية في الخريف

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لمديرية الصحة
(<https://island.is/en/bolusetningar-barna>) وفي مراكز الرعاية الصحية.