



MAY HINALA KA BANG IMPEKSYON SA IHI SA RESIDENTE NG NURSING HOME?



ITIGIL

Kausapin ang residente at ang kanilang mga tagapag-alaga at alamin ang tungkol sa mga sintomas, senyales, at pagbabago sa mga gawi sa pag-ihi

May mga **pangkalahatan/hindi tiyak** na sintomas lang



May mga **tiyak** na sintomas

MGA PANGKALAHATANG SINTOMAS NA HINDI NAGKUKUMPIRMA O TUMATANGGI SA DIAGNOSIS:



Delirium
Pagkapagod
Pagbagsak
May mabahong amoy ang ihi
Nagbago ang kulay ng ihi

MGA TIYAK NA SINTOMAS NA NAGPAPALAKAS NG HINALA NG ISANG IMPEKSYON SA IHI

- Pagsimula ng napapasong pakiramdam o pananakit habang umihi
- **O dalawa o higit pa sa mga sumusunod:**
 - Mataas na lagnat
 - Pananakit/panlalambot sa tagiliran o ibabang bahagi ng tiyan
 - Mas madalas na pag-ihi
 - Paglala ng o bagong paninimula ng kawalan ng pagpigil sa ihi o pagpapanatili ng ihi
 - Nakikitang dugo sa ihi



PAGSUBAYBAY AT MGA PAGSUKAT

Mga vital sign ng hindi bababa sa 1x sa isang araw
Hikayatin na uminom ng marami
Makipag-usap sa doktor kung sakaling mahulog o magka-delirium

PANGKALAHATANG SINTOMAS NG IMPEKSIYON?*



OO

MAKIPAG-USAP SA DOKTOR



HINDI



Ang pagsasagawa ng **stix/urine dipstick test** kapag ang mga sintomas ay pangkalahatan lang at walang mga tiyak na senyales ng impeksyon ay **HINDI** magandang kasanayan at maaaring magbigay ng nakakalinlang na impormasyon.

Urine dipstick test na kinuha sa maling pagpapalagay:

- 1) Maaaring makagambala sa ugat na sanhi at maging sanhi ng pagkaantala sa diagnostic
- 2) Maaaring humantong sa hindi kinakailangan o hindi tumpak na paggamot

*Mataas na lagnat (>38°C o 1.5°C sa taas ng karaniwang temperatura ng tao), mabilis na pulso, bumibilis na paghinga, pangingingig, pagpapawis