



Narodowy Program Szczepień Dziecięcych w Islandii od października 2025 r.

Wiek:

Szczepienie przeciwko:

W trakcie ciąży		Krztusiec (Boostrix, podawane matce w ok. 28. tygodniu ciąży)
0–6 miesięcy: Szczepionka RSV (nirsevimab) po urodzeniu od października do marca lub jesienią	6 tygodni	Rotawirusy (krople doustne; <i>RotaTeq</i>)
	3 miesiące	Rotawirusy (krople doustne; <i>RotaTeq</i>), DTaP-Hib-Polio (<i>Pentavac</i>) oraz PCV (<i>Vaxneuvance</i>)
	5 miesięcy	Rotawirusy (krople doustne; <i>RotaTeq</i>), DTaP-Hib-Polio (<i>Pentavac</i>) oraz PCV (<i>Vaxneuvance</i>)
12 miesięcy		DTaP-Hib-Polio (<i>Pentavac</i>), PCV (<i>Vaxneuvance</i>) oraz menACWY (<i>MenQuadfi</i>)
18 miesięcy		MMR i VZV (<i>ProQuad</i>)
2,5 roku		VZV (<i>Varilrix</i>)
4 lata		DTaP (<i>Boostrix</i>)
12 lat		MMR (<i>M-M-RVAXPRO</i>) HPV (<i>Gardasil 9</i> ; bez względu na płeć)
14 lat		DTaP-Polio (<i>Repevax</i>)

6–59 miesięcy:
Szczepienie przeciwko grypie
sezonowej jesienią