

# Szczepienia przeciw COVID-19 w różnych sytuacjach od 1.05.2023 r.



Directorate of Health  
Chief Epidemiologist for Iceland

Grupa wiekowa	Szczepionka rekomendowana do szczepień podstawowych	Liczba dawek szczepienia podstawowego	Odstęp od szczepienia podstawowego do pierwszej dawki przypominającej	Zalecana szczepionka przypominająca	Szczepionka rekomendowana do dodatkowych dawek przypominających*	Termin podawania dawek przypominających dla grup ryzyka*	Termin szczepienia po zakażeniu COVID-19 zgodnie z poniższym schematem
Osoby w wieku 60 lat i starsze	Pfizer dwuwalentna / Moderna dwuwalentna	2	4 miesiące	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie	<b>Corocznie w okresie jesiennym</b> lub z zalecenia lekarza do dwóch razy w roku	Nie mniej niż 4 tygodnie od początku choroby
Od 40 do 59 lat	Pfizer dwuwalentna / Moderna dwuwalentna <sup>‡</sup>	2	4 miesiące <sup>‡</sup>	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie <sup>‡</sup>	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie – <b>wyłącznie</b> dla grup ryzyka i priorytetowych**	<b>Corocznie w okresie jesiennym</b> lub z zalecenia lekarza do dwóch razy w roku	Nie mniej niż 4 tygodnie od początku choroby
Od 18 do 39 lat	Pfizer dwuwalentna <sup>‡</sup>	2	4 miesiące <sup>‡</sup>	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie <sup>‡</sup>	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie – <b>wyłącznie</b> dla grup ryzyka i priorytetowych**	<b>Corocznie w okresie jesiennym</b> lub z zalecenia lekarza do dwóch razy w roku	Nie mniej niż 4 tygodnie od początku choroby
Od 12 do 17 lat	Pfizer dwuwalentna <sup>‡</sup>	2	4 miesiące <sup>‡</sup>	Pfizer, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie <sup>‡</sup>	Pfizer, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie – <b>wyłącznie</b> dla grup ryzyka	<b>Corocznie w okresie jesiennym</b> lub z zalecenia lekarza do dwóch razy w roku	Nie mniej niż 4 tygodnie od początku choroby
Od 5 do 11 lat	Pfizer dwuwalentna 10 µg/dawka <sup>‡</sup>	2	4 miesiące <sup>‡</sup>	Pfizer 10 µg/dawka, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie <sup>‡</sup>	Pfizer 10 µg/dawka, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania w dowolnym momencie – <b>wyłącznie</b> dla grup ryzyka	<b>Corocznie w okresie jesiennym</b> lub z zalecenia lekarza do dwóch razy w roku	Nie mniej niż 4 tygodnie od początku choroby
Od 0 do 4 lat	Brak [szczepionka niedostępna w Islandii]	--	--			--	--

\* Dodatkowe dawki przypominające zalecane są tylko dla osób, u których istnieje podwyższone ryzyko indywidualne wystąpienia ciężkiej choroby (grupy ryzyka: wszyscy powyżej 60. roku życia, młodzi z przewlekłymi schorzeniami).

\*\* Grupy priorytetowe (pracownicy ochrony zdrowia, członkowie rodzin osób z grup ryzyka itp.): Zaleca się podanie co najmniej jednej dawki szczepionki dwuwalentnej, nawet jeśli wcześniej podano zalecaną liczbę dawek szczepionki monowalentnej.

<sup>‡</sup> Szczepienie grup ryzyka w ramach danej grupy wiekowej jest najważniejsze, ale szczepionka jest dostępna dla innych.