



Öndunarfærásýkingar


Vika 10

4. – 10. mars 2024

Embætti landlæknis
Sóttvarnalæknir

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Áfram greinast fá tilfelli af COVID-19 í viku hverri. Í viku 10 greindust sex einstaklingar með COVID-19 (með PCR-prófi eða klínískri greiningu). Hlutfall jákvæðra PCR-prófa af heildarfjölda prófa var rúmlega 1% (mynd 1).




Mynd 1. Vikulegur fjöldi einstaklinga sem greindist með COVID-19, annaðhvort með PCR-prófi eða klínískri greiningu (vinstri ás), og hlutfall jákvæðra COVID-19 PCR-prófa af heildarfjölda prófa (hægri ás) veturninn 2023–2024 (frá viku 35 2023, um mánaðamótin ágúst–september).


Inflúensa

Inflúensa er enn í dreifingu. Greiningum á **staðfestri inflúensu** (greining með PCR-prófi) fækkaði í upphafi árs 2024 en fór svo fjölgandi á ný. Vikulegur fjöldi hefur verið svipaður undanfarnar fimm vikur. Í viku 10 greindust 36 einstaklingar með staðfesta inflúensu (mynd 2). Af þeim var 31 einstaklingur með inflúensustofn A(H1)pdm09, fjórir með inflúensustofn A(H3) og einn með inflúensustofn B.

Fjöldi **klínískra greininga** á inflúensu eða „flensu“ (greiningar læknis án rannsóknar með PCR-prófi) hefur sveiflast frá upphafi árs eftir að hafa farið vaxandi frá haustinu 2023. Í viku 10 greindist 41 einstaklingur með inflúensulík einkenni (mynd 3).




Mynd 2. Fjöldi einstaklinga með staðfesta inflúensu eftir vikum veturinn 2023–2024 og síðastliðin tvö flensutímabil samanborið við meðaltal síðustu fimm flensutímabila þar á undan (2015–2020). Athugið að veturinn 2020–2021 greindist ekkert tilfelli af inflúensu.



Mynd 3. Vikulegur fjöldi klínískra greininga á inflúensulíkum einkennum veturinn 2023–2024.

RSV og aðrar öndunarfærasýkingar

Greiningum á **RS veirusýkingu (RSV)** hefur fækkað frá áramótum. Í viku 10 greindust sjö einstaklingar með RSV (mynd 4), þar af eitt barn undir eins árs aldri. Fjöldi greindra öndunarfæraveira, annarra en SARS-CoV-2, influensu og RSV, hefur verið svipaður undanfarnar vikur en í viku 10 greindust flestir með parainflúensu. Frekari upplýsingar um greiningar á öndunarfæraveirum má finna á [vef sýkla- og veirufræðideilda Landspítala](#) (undir veirugreiningar).



Mynd 4. Vikulegur fjöldi greindra RS veirusýkinga veturni 2023–2024.

Mislingar og hettusótt

Í viku 5 2024 (byrjun febrúar) **greindist eitt tilfelli af mislingum**, það fyrsta hér á landi síðan árið 2019. Einstaklingurinn var erlendur ferðamaður og ekki var unnt að staðfesta hvort hann var bólusettur. Annað tilfelli hefur ekki greinst þegar þetta er birt.

Í sömu viku **greindist einnig tilfelli af hettusótt**, það fyrsta hérlendis síðan árið 2020 og var sá einstaklingur óbólusettur. Í viku 7 **greindust þrjú tilfelli hettusóttar til viðbótar**, þar á meðal einn óbólusettur fullorðinn eisntaklingur og tvö bólusett ungmenni. Í viku 8 og 9 greindust fimmta og sjötta tilfellið og það sjöunda í viku 10. Allt fullorðnir einstaklingar og einn var óbólusettur. Tengsl eru á milli allra tilfella.

Mislingar og hettusótt eru bráðar og mjög smitandi veirusýkingar. Þau sem eru óbólusett fyrir þessum sjúkdómum, og hafa ekki fengið þá áður, eru í áhættu fyrir smiti en þeim geta fylgt alvarleg veikindi og fylgikvillar. Bólusettir geta smitast en það er sjaldgæfara og þá eru veikindi oftar væg. Einstaklingar sem fá sjúkdómana fá þá hins vegar aðeins einu sinni á ævinni. Sjá frekari upplýsingar um **mislinga** og **hettusótt** á vef embættis landlæknis.

Bólusetning er besta vörnin gegn mislingum og hettusótt. Bóluefnið er MMR bóluefni (gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum) sem veitir langtímovörn gegn sjúkdómunum og er öruggt bóluefni.

Þau sem hyggja á ferðalög erlendis á næstunni er ráðlagt að huga að bólusetningarstöðu sinni og barna sinna vegna *mislinga*. Sjá [frétt á vef embættis landlæknis um fjölgun mislingatilfella í Evrópu](#).


Hægt er að fá frekari upplýsingar varðandi bólusetningar hjá heilsugæslu, á [netspjalli Heilsuveru](#) eða í síma 1700.

EKKI er mælt með MMR bólusetningu fyrir þá sem eru fæddir fyrir 1970 en almennar frábendingar eru:

- Börn yngri en 6 mánaða gömul.
- Barnshafandi einstaklingar.
- Ónæmisbældir einstaklingar – ef vafi þá þarf að ráðfæra sig við sinn lækni.
- Gelatínofnæmi.
- Þau sem eru þegar bólusett með 2 skömmum af mislingabóluefni og starfa ekki í bráðaheilbrigðisþjónustu.

Innlagnir á sjúkrahús

Einstaklingum inniliggjandi á Landspítala með öndunarfaraveirusýkingar hefur fækkað frá áramótum. Í viku 10 voru 30 einstaklingar inniliggjandi með eina af sex algengustu öndunarfaraveirusýkingunum. Af þeim voru 16 manns með inflúensu, þar af níu einstaklingar 65 ára eða eldri. Tvö lágu inni með RSV, þar af eitt barn undir eins árs aldri. Enginn lá inni með COVID-19 í viku 9 og 10 (mynd 5).



Mynd 5. Fjöldi inniliggjandi einstaklinga með öndunarfarasýkingar veturinn 2023–2024. Gögn frá Landspítala.

Samantekt

Greiningum á COVID-19 og RSV hefur farið stöðugt fækkandi frá áramótum en inflúensa er enn í nokkuð stöðugri dreifingu. Langflest greind tilfelli af inflúensu þennan veturinn hafa verið af inflúensustofni A. Einstaklingum inniliggjandi á Landspítala með öndunarfæraveirusýkingar hefur fækkað frá áramótum. Enginn lá á Landspítala með COVID-19 síðustu tvær vikur. Bæði mislingar og hettusótt hafa borist til landsins nýverið. Hingað til hafa sjö hettusóttartilfelli verið greind á þessu ári og eitt tilfelli mislinga. Bólusetningarátak er yfirstandandi hjá heilsugæslunni til að draga úr áhrifum beggja atvika, fyrst og fremst á höfuðborgarsvæðinu.

Staðan í Evrópu

Inflúensa er enn í talsverðri dreifingu í Evrópu en merki eru um að dregið hafi úr fjölda tilfella. Áfram greinist mest af inflúensustofni A(H1)pdm09 og minna af inflúensustofni B. RSV greiningar eru heilt yfir á niðurleið. Í vetur hefur borið á **aukningu á greindum öndunarfærasýkingum af völdum bakteríunnar *Mycoplasma pneumoniae***.

Greiningar á mislingum **jukust margfalt í Evrópu á árinu 2023** eftir fækkun tilfella á tímum COVID-19 faraldursins. Flest tilfelli voru meðal barna yngri en 5 ára. Stórar hópsýkingar hafa brotist út, m.a. í Bretlandi, Austurríki, Rúmeníu og Frakklandi en í flestum þessum löndum er bólusetningaráttaka undir 95% markmiðinu. Meirihluti smitaðra var óbólusettur (75%) en hins vegar var bólusetningaráttá margra fullorðinna óþekkt. Í flestum löndum eru börn yngri en 12 mánaða ekki bólusett við mislingum. Sjá einnig frekari upplýsingar um stöðuna í Evrópu á **vef Sóttvarnastofnunar Evrópusambandsins (ECDC)**. **Alþjóðaheilbrigðismálstofnunin (WHO)** hefur einnig vakið athygli á aukningu mislinga í heiminum. Búist er við áframhaldandi dreifingu mislinga í heiminum árið 2024 en mislingar eru líklegastir til að vera í dreifingu síðla veturs og á vorin í okkar heimshluta.

Sóttvarnir

Full ástæða er til að sinna persónulegum sóttvörnum til að draga úr líkum á að smitast og á að smita aðra.

Við minnum öll á að:

- Fylgja tilmælum um bólusetningar.
- Halda sig til hlés í veikindum.
- Forðast umgengni við ung börn og aðra viðkvæma ef með einkenni.



- Hylja nef og munn við hósta og hnerra.
- Sinna reglulegum handþvotti.
- Nota grímu við ákveðnar aðstæður eins og á heilbrigðisstofnunum þ.m.t. biðstofum.
- Lofta út.

