



Национальная программа вакцинации детей начинается в Исландии с октября 2025 г.

Возраст:

Вакцинация против:

0–6 месяцев: вакцинация против РСВ (Нирсевимаб) при рождении проводится с октября по май или осенью	Во время беременности	Коклюш (Бустрикс, вводится матери примерно на 28 неделе беременности)
	6 недель	Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек)
	3 месяца	Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек) Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак) и Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюованс)
	5 месяцев	Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек) Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак) и Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюованс)
	12 месяцев	Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак), Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюованс) Менингококковая вакцина ACWY (МенКвадфи)
	18 месяцев	Вакцина против кори, паротита, краснухи (MMR) и ветряной оспы (VZV) (ПроКвад)
	2,5 года	Вирус ветряной оспы (VZV) (Варилрикс)
	4 года	АКДС-вакцина (Бустрикс)
	12 лет	Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) (М-М-РВАКСПРО) ВПЧ (вирус папилломы человека) (Гардасил 9; независим)
	14 лет	Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита (DTaP-Polio) (Репевакс)

6–59 месяцев:
Сезонный прип
Осеннняя вакцинация