

Skiepijimas nuo COVID-19 įvairiomis aplinkybėmis nuo 2023-05-01



Directorate of Health
Chief Epidemiologist for Iceland

Amžiaus grupė	Rekomenduojama vakcina pirminei vakcinacijai	Pirminės vakcinacijos dozių skaičius	Laikotarpis nuo pirminės vakcinacijos iki revakcinacijos	Rekomenduojama vakcina pirminei vakcinacijai	Rekomenduojama vakcina kitoms stiprinamosioms dozėms*	Stiprinamųjų dozių skiepijimo laikas rizikos grupėms	Skiepijimo laikas pagal šią schemą po užsikrėtimo COVID-19 infekcija
60 metų ir vyresni	„Pfizer“ divalentė vakcina / „Moderna“ divalentė vakcina	2	4 mėnesiai	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada	Kasmet rudenį arba gydytojo nurodymu iki dviejų kartų per metus	Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms nuo ligos pradžios
40–59 metų	„Pfizer“ divalentė vakcina / „Moderna“ divalentė vakcina [‡]	2	4 mėnesiai [‡]	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada [‡]	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada – skirta tik rizikos ir prioritetinėms grupėms**	Kasmet rudenį arba gydytojo nurodymu iki dviejų kartų per metus	Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms nuo ligos pradžios
18–39 metų	„Pfizer“ divalentė vakcina [‡]	2	4 mėnesiai [‡]	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada [‡]	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada – skirta tik rizikos ir prioritetinėms grupėms**	Kasmet rudenį arba gydytojo nurodymu iki dviejų kartų per metus	Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms nuo ligos pradžios
12–17 metų	„Pfizer“ divalentė vakcina [‡]	2	4 mėnesiai [‡]	„Pfizer“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada [‡]	„Pfizer“, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada – skirta tik rizikos grupėms	Kasmet rudenį arba gydytojo nurodymu iki dviejų kartų per metus	Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms nuo ligos pradžios
5–11 metų	„Pfizer“ divalentės vakcinos 10 µg dozė [‡]	2	4 mėnesiai [‡]	„Pfizer“ 10 µg dozė, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada [‡]	„Pfizer“ 10 µg dozė, naujausią / plataus veikimo spektro versiją galima gauti bet kada – skirta tik rizikos grupėms	Kasmet rudenį arba gydytojo nurodymu iki dviejų kartų per metus	Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms nuo ligos pradžios
0–4 metų	Nėra (Islandijoje vakcina neskiepijama)	--	--			--	--

* Papildomas stiprinamąsias dozes rekomenduojama skirti tik asmenims, kuriems yra didesnė asmeninė rizika susirgti sunkia ligos forma (įskaitant vyresnius nei 60 metų amžiaus asmenis ir jaunesnius asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis).

** Prioritetinės grupės (sveikatos priežiūros darbuotojai, asmenų, priklausančių rizikos grupei, šeimos nariai ir kt.): net jei asmeniui buvo suleistas rekomenduojamas vienvalentės vakcinos dozių skaičius, jam vis tiek rekomenduojama gauti bent vieną divalentės vakcinos dozę.

Svarbiausia skiepyti į rizikos grupę patenkančias amžiaus grupes, tačiau vakcina prieinama ir kitiems.