

Tilvísun í TMS

Nafn sjúklings:

Kennitala:

Tilvísandi geðlæknir:

Tölvupóstur tilvísanda:

Ábending fyrir TMS: meðferðarþrátt miðlungs- til alvarlegt unipolar þunglyndi.

Greining:

- ☐ F32.1 Miðlung geðlægðarlota
- ☐ F32.2 Alvarleg geðlægðarlota án geðrofseinkenna
- ☐ F33.1 Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota meðaldjúp
- ☐ F33.2 Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota alvarleg án geðrofseinkenna

Stutt sjúkrasaga:

Kvarðar: Núverandi staða þunglyndis. Niðurstöður mega ekki vera en eldri en tveggja vikna frá dags. beiðnar.

PHQ-9: **Dags.** **BDI-II:** **Dags.**

Núverandi og fullreynd þunglyndislyf:

Skjólstæðingur þarf að hafa hlotið meðferð með að minnsta kosti tveimur þunglyndislyfjum í mismunandi lyfjaflokkum í a.m.k. 6 vikur í viðurkenndum skömmtum, án nægilegs árangurs. Tilgreinið tímabil og skammtastærð.

Núverandi lyf:

Fyrri fullreynd þunglyndislyf, a.m.k. tvö:

- 1.
- 2.
- 3.

Annað

Er frábending fyrir MRI- Myndatöku?

Já ☐ Nei ☐

Hafa aðrar líkamlegar orsakir þunglyndis verið metnar?

Já ☐ Nei ☐

Liggur fyrir innan við árs gömul blóðrannsókn sem útilokar aðra sjúkdóma?

Já ☐ Nei ☐

Hefur skjólstæðingur áður fengið TMS eða ECT?

Já ☐ Nei ☐

Hver var árangurinn? _____

- Er sjúklingur með ígræddan málmhlut í efri hluta líkama? Já ☐ Nei ☐
- Er sjúklingur með kuðungsígræðslu (Cochlear implant)? Já ☐ Nei ☐
- Er sjúklingur með þekkta flogaveiki? Já ☐ Nei ☐
- Er sjúklingur með sögu um yfirlið? Já ☐ Nei ☐
- Er sjúklingur með þekktan tinitus? Já ☐ Nei ☐

- ☐ Ég hef kynnt skjólstæðingi mínum TMS-meðferðina og mögulegar aukaverkanir
- ☐ Ég hef kynnt mér algerar og mögulegar frábendingar fyrir TMS-meðferð

Upplýsingar um TMS-meðferð má finna á:
heilsugaeslan.is/gedheilsa/heilaorvunarmidstod/

Að lokinni TMS meðferð er sjúklingi vísað aftur til tilvísandi læknis til eftirfylgdar.