

Bólusetning gegn COVID-19 við ýmsar aðstæður frá 1. maí 2023



Embætti landlæknis
Sóttvarnalæknir

Aldurshópur	Bóluefni sem mælt er með við grunnbólusetningu	Fjöldi skammta grunnbólusetning	Tími frá grunnbólusetningu að fyrstu örvun	Bóluefni sem mælt er með við fyrstu örvun	Bóluefni sem mælt er með við frekari örvun*	Tímasetning frekari örvunarskammta fyrir áhættuhópa*	Tímasetning bólusetningar skv. þessu skema í kjölfar COVID-19 smits
60 ára og eldri	Pfizer tvígilt /Moderna tvígilt	2	4 mán	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni	Árlega að hausti eða skv. læknisráði allt að tvisvar á ári	Að lágmarki 4 vikum eftir upphaf veikinda
40-59 ára	Pfizer tvígilt /Moderna tvígilt [‡]	2	4 mán [‡]	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni [‡]	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni – eingöngu áhættu- og forgangshópar**	Árlega að hausti eða skv. læknisráði allt að tvisvar á ári	Að lágmarki 4 vikum eftir upphaf veikinda
18-39 ára	Pfizer tvígilt [‡]	2	4 mán [‡]	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni [‡]	Pfizer/Moderna, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni – eingöngu áhættu- og forgangshópar**	Árlega að hausti eða skv. læknisráði allt að tvisvar á ári	Að lágmarki 4 vikum eftir upphaf veikinda
12-17 ára	Pfizer tvígilt [‡]	2	4 mán [‡]	Pfizer nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni [‡]	Pfizer, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni – eingöngu áhættuhópar	Árlega að hausti eða skv. læknisráði allt að tvisvar á ári	Að lágmarki 4 vikum eftir upphaf veikinda
5-11 ára	Pfizer tvígilt 10 mcg/skammt [‡]	2	4 mán [‡]	Pfizer 10 mcg/skammt, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni [‡]	Pfizer 10 mcg/skammt, nýjasta/breiðvirkasta útgáfa hverju sinni – eingöngu áhættuhópar	Árlega að hausti eða skv. læknisráði allt að tvisvar á ári	Að lágmarki 4 vikum eftir upphaf veikinda
0-4 ára	Engin [bóluefni ekki fáanlegt á Íslandi]	--	--			--	--

* Eingöngu mælt með frekari örvun fyrir einstaklinga í aukinni hættu á alvarlegum veikindum (áhættuhópa: 60 ára og eldri, langvinnir sjúkdómar hjá yngri).

** Forgangshópar (heilbrigðisstarfsmenn, aðstandendur áhættuhópa): Mælt er með a.m.k. einum skammti af tvígildu bóluefni þótt hafi áður fengið þann fjölda skammta sem er mælt með af eingildu bóluefni

[‡] Bólusetning áhættuhópa innan aldurshóps mikilvægust en bólusetning aðgengileg öðrum.