



Lyfjaskrá fyrir lyfjakistu

D

## Efnisyfirlit

Flokkar og undirflokkar	Lyf	Bls.
<b>1 Blóðrás</b>		
B Hjartaöng	1.1.3 Nitroglycerín	3
<b>2 Meltingarfæri</b>		
B Lyf við ógleði	1.2.4 Meclozin	4
	1.2.5 Scopolamin (Scopoderm)	5
C Hægðalyf	1.2.8 Loperamide	6
<b>3 Verkir og krampar</b>		
A Verkjalyf, hitalækkandi lyf, bólgeyðandi lyf	1.3.1 Parasetamól	7
	1.3.2 Ibuprofen	8
<b>8 Vökva- og salttap</b>		
Salt og sykur	1.8.4 Resorb	9
<b>9 Húð, augu, eyru og munnur</b>		
A Húð	1.9.1 Fucidin	10
	1.9.6 Brunagel	11
	1.9.8 Sótthreinsivökvi	12

## Flokkur 1.1 BLÓÐRÁS

Undirflokkur B	Hjartaöng	Hjartaverkur
Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.1.3	NITROGLYCERÍN	C 01 D A 02

### Lyfjaform: Tungurótartöflur

Hver tungurótartafla inniheldur: Glyceryli nitras NFN 0,5 mg

Acute attack of angina pectoris, tablets. Each tablet contains:  
Glyceryl trinitrate 0.5 mg.

### Ábendingar:

Hjartverkur (hjartaöng).

### Frábendingar:

Lágur blóðþrýstingur, blóðskortur, æðakölkun í heila.

### Aukaverkanir:

Roði  
Blóðþrýstingsfall  
Höfuðverkur  
Svimi

### Skammtar:

1 tafla (0,5 mg) látin bráðna undir tungu við hjartaöng.  
Lyfjagjöf má endurtaka á 5 míni fresti þar til verkur hverfur en mest 3 töflur á 15 míni.  
Hafa ber samband við lækni

### Varúð:

Varúðar skal gæta við gjöf lyfsins hjá sjúklingum með  
óssæðarþrengsli, gláku eða brátt hjartadrep.  
Lyfið er rokgjarnt efni. Lokið glasinu vel eftir hverja opnun.  
Geymið töflurnar í upprunalega glasinu; ekki setja þær í önnur ílát.

### Samheitalyf:

Nitroclycerin DAK.

## Flokkur 1.2 MELTINGARFÆRI

Ógleði

Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.2.4	MECLOZIN	R 06 A E 05

### Lyfjaform: Töflur

Hver tafla inniheldur: Meclozinum INN, klóríð, 25 mg.

Against seasickness, tablets. Each tablet contains: Meclozinum INN, hydrochloride, 25 mg.

### Ábendingar:

Sjóveiki  
Ógleði og uppköst.

### Frábendingar:

Gláka  
Þvagtregða

### Aukaverkanir:

Syfja.  
Munnþurrkur

### Skammtar:

#### Við sjóveiki:

Fullorðnir: 1 tafla 1-2 klst. fyrir sjóferð og síðan 1 tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur.  
Börn 1-5 ára: 1/2 tafla 1-2 klst. fyrir sjóferð og síðan 1/2 tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur.  
Börn 6-12 ára: 1/2-1 tafla 1-2 klst fyrir sjóferð og síðan 1/2-1 tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur.

#### Við ógleði:

1 tafla 2svar á dag fyrir fullorðna

### Varúð:

Lyfið getur verið sljóvgandi og valdið syfju og þess vegna valdið seinkun á viðbragði.

### Samheitalyf:

POSTAFEN

## Flokkur 1.2 MELTINGARFÆRI

Ógleði

Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.2.5	SCOPOLAMIN (SCOPODERM)	A 04 A D 01

### Lyfjaform: Plástur

Forðaplástur sem inniheldur Scopolamín 1 mg/72 klst.

Against seasickness, patches that contain Scopolamin 1 mg/72 hours.

### Ábendingar:

Sjóveiki  
Ferðaveiki

### Frábendingar:

Gláka  
Ofnæmi fyrir lyfinu

### Aukaverkanir:

Syfja og þreyta  
Munnþurrkur  
Þokusýn

### Skammtar:

Plástur settur á húð bakvið eyrað 5-6 klst áður en ferð á að hefjast og má nota á 72 klst fresti en fjarlægist eftir ferð ef ekki er þörf á lengri meðferð.

### Varúð:

Lyfið getur verið sljóvgandi og valdið syfju og þess vegna valdið seinkun á viðbragði.

### Samheitalyf:

SCOPODERM

## Flokkur 1.2 MELTINGARFÆRI

Undirflokkur C	Hægðalyf	Niðurgangur
Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.2.8	LOPERAMIDE	A 07 D A 03

**Lyfjaform: Töflur**

Hver tafla, inniheldur Loperamidum INN klórid, 2mg.

Antidiurrhoicam tablets. Each tablet contains Loperamidum INN Chlorid, 2 mg

**Ábendingar:**

Bráður niðurgangur.

**Frábendingar:**

Meðganga og brjósttagjöf.  
Alvarleg colitis ulcerosa köst.

**Aukaverkanir:**

Höfuðverkur, þreyta og ógleði  
Magaverkir, uppþemba og munnpurrkur  
Ofnæmi (húðútbrot)

**Skammtar:**

2 töflur fyrst, síðan 1 tafla eftir hvern niðurgang, þó ekki þéttar en á 2-3 klst fresti  
Sólárhringsskammtur á ekki að fara yfir 8 töflur (16 mg)

**Athugið:**

Fáið upplýsingar um niðurgangsfæði

**Varúð:**

Má aðeins nota í samráði við lækni.  
Sjáist ekki bati innan 48 klst á að hætta inntöku lyfsins

**Samheitalyf:**

IMODIUM

## Flokkur 1.3 VERKIR OG KRAMPAR

Undirflokkur A	Verkjalyf, hitalækkandi lyf, bólgueyðandi lyf	Verkir
Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.3.1	PARASSETAMÓL	N 02 B E 01

**Lyfjaform: Töflur**

Hver tafla inniheldur: Paracetamolum INN 500 mg.

Analgesic and antipyretic, tablets. Each tablet contains: Paracetamolum INN 500 mg.

**Ábendingar:**

Verkjastillandi lyf við höfuðverk, tannverk eða tíðaverk.  
Hitalækkandi.

**Frábendingar:**

Ofnæmi fyrir lyfinu.  
Lifrarsjúkdómar.

**Aukaverkanir:**

Ofnæmi, húðútbrot.

**Skammtar:**

1-2 töflur í senn, mest 3-4 sinnum á dag.

**Varúð:**

Lyfið getur valdið lifrabólgu ef það er tekið í stærri skömmum en að ofan greinir.  
Langvarandi notkun getur valdið nýrnaskemmdum.

**Samheitalyf:**

PANODIL  
PARATABS  
PARACETAMOL SANDOS  
PARACETAMOL-RATIOPHARM  
DOLORIN  
TYLENOL  
ALVEDON  
ACETAMINOPHEN

## Flokkur 1.3 VERKIR OG KRAMPAR

Nr.	Nafn	Verkir	ATC-Flokkur
1.3.2	IBUPROFEN		M 01 A E 01

### Lyfjaform: Töflur

Hver tafla inniheldur: Ibuprofenum INN 400 mg

Antiinflammatory and antirheumatic, tablets. Each tablet contains: Ibuprofenum INN 400 mg

### Ábendingar:

Bólgeyðandi og verkjastillandi lyf, við bakverkjum, vöðvaverkjum, liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum og tannpínu.

### Frábendingar:

Magabólgygur og magasár  
Þungun.  
Skert lifrarstarfsemi.  
Astmi.

### Aukaverkanir:

Ofnæmi (útbrot).  
Meltingaróþægindi (niðurgangur, ógleði).  
Astmi getur versnað.

### Skammtar:

1-2 töflur 3-4 sinnum á dag, mest 6 töflur á sólarhring.  
Takist með mat.

### Varúð:

Sjúklingar, sem hafa fengið astma, slæmt nefrennsli eða ofskláða eftir töku Magnyls eða skyldra lyfja, skulu ekki nota lyfið.

### Samheitalyf:

BRUFEN  
IBUXIN  
IBUPROFEN BIL

## Flokkur 1.8 VÖKVA- OG SALTTAP

Vökvatap

Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.8.4	RESORB (SALT OG SYKUR)	A 12

**Lyfjaform: Freyðitöflur**

1 tafla inniheldur 0,19g sölt, 3,1g sykur,

**Ábendingar:**

Til að bæta fyrir vökvatap, t.d. í miklum hita, niðurgang eða uppköstum

**Frábendingar:**

Engar

**Aukaverkanir:**

Engar

**Skammtar:**

1 tafla leyst upp í 120ml vatni,  
1 tafla mest 4 sinnum á dag

**Varúð:****Samheitalyf:**

Resorb

## Flokkur 1.9 HÚÐ, AUGU, EYRU OG MUNNUR

Undirflokkur A	Húð	Sýkingar
Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.9.1	FUCIDIN	D 06 A X 01

**Lyfjaform: Smyrsli**

1 g inniheldur Natriumfusidat  
Pakkning 15 g túpa

Topical antibiotic, ointment. Each g contains: Natriumfusidat

**Ábendingar:**

Sýkingar í húð.  
Grunn sár.  
Brunasár

**Frábendingar:**

Ofnæmi fyrir lyfinu.

**Aukaverkanir:**

Útbrot.

**Skammtar:**

Berist á sýkt sár í þunnu lagi, 1-2svar á dag,

**Varúð:**

Lyfið skal aðeins notað í skamman tíma í senn vegna hættu á exemi.  
Lyfið getur frásogast úr stórum sárum, t.d. brunasárum, og getur þá valdið nýrnaskemmdum, heyrnamissi og jafnvægistrulunum.  
Geymist á köldum stað.

**Samheitalyf:**

Fusidin

## Flokkur 1.9 HÚÐ, AUGU, EYRU OG MUNNUR

Bruni

Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.9.6	BRUNAGEL	

**Lyfjaform: Gel**

**Ábendingar:**

Kælir brunasár, svíður ekki og hindrar óhreinindi að sárinu. Notað til þess að kæla minni háttar húðbruna af völdum hita, bruna frá heitum vökva/gufu eða sólbruna. Virkar sem tímabundin kæling, róar húð og slær á sársauka.

**Frábendingar:**

**Aukaverkanir:**

**Skammtar:**

Borið beint á húðina eins fljótt og hægt er eftir bruna og best að bera á nokkrum sinnum.

**Varúð:**

**Samheitalyf:**

BURN FREE GEL198 Sótthreinsivökvi

## Flokkur 1.9 HÚÐ, AUGU, EYRU OG MUNNUR

Sótthreinsandi

Nr.	Nafn	ATC-Flokkur
1.9.8	SÓTTHREINSIVÖKVI (T.D. KLÓRHEXIDÍN)	D 08 A X

**Lyfjaform: Vökvi**

Klórhexidín inniheldur 2mg/ml af klórhexidíni ásamt glúkonati og vatni. Aðrir sótthreinsivökvar með annarri innihaldslýsingu koma til greina.

**Ábendingar:**

Notað við sótthreinsun á húð á viðkvæmum svæðum. Einnig má nota lausnina við sótthreinsun á sárum og áhöldum.

**Frábendingar:**

Ofnæmi.

**Aukaverkanir:**

Sviði.

**Skammtar:**

Eftir þörfum.

**Varúð:****Samheitalyf:**