

# Posologie de l'acétaminophène chez les enfants

Acétaminophène	Si possible, établir la dose en fonction du poids de l'enfant, sinon en fonction de son âge. Dose unitaire orale†								
	Moins de 12 lb Moins de 4 mois	12 à 17 lb 4 à 11 mois	18 à 23 lb 12 à 23 mois	24 à 35 lb 2 à 3 ans	36 à 47 lb 4 à 5 ans	48 à 59 lb 6 à 8 ans	60 à 71 lb 9 à 10 ans	72 à 95 lb 11 ans	
<b>Poids et âge de l'enfant</b>									
<b>Gouttes concentrées d'acétaminophène pour nourrissons</b> <i>par exemple</i> <b>Gouttes TYLENOL® Nourrissons 80 mg/1 ml</b>	<i>Consulter un médecin</i>	 <b>1 ml</b>	 <b>1,5 ml</b>	—	—	—	—	—	
<b>Suspension orale d'acétaminophène pour enfants</b> <i>par exemple</i> <b>Suspension orale TYLENOL® Enfants 160 mg/5 ml</b>	<i>Utiliser les gouttes concentrées TYLENOL® Nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>			 <b>5 ml (1 c. à thé)</b>	 <b>7,5 ml (1,5 c. à thé)</b>	 <b>10 ml (2 c. à thé)</b>	 <b>12,5 ml (2,5 c. à thé)</b>	 <b>15 ml (3 c. à thé)</b>	
<b>Comprimés d'acétaminophène pour enfants</b> <i>par exemple</i> <b>Comprimés à croquer TYLENOL® Enfants, 160 mg</b>	<i>Utiliser les gouttes concentrées TYLENOL® Nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>			 <b>1 comprimé</b>	 <b>1,5 comprimé</b>	 <b>2 comprimés</b>	 <b>2,5 comprimés</b>	 <b>3 comprimés</b>	
<b>Poudre d'acétaminophène pour enfants</b> <i>par exemple</i> <b>TYLENOL® Dissolution facile Enfants, 160 mg</b>	<i>Utiliser les gouttes concentrées TYLENOL® Nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>			<b>Utiliser la suspension orale ou les comprimés à croquer TYLENOL® Enfants selon le mode d'emploi sur l'étiquette</b>			 <b>2 sachets</b>	 <b>2 sachets</b>	 <b>3 sachets</b>

## Instructions importantes

La dose unitaire peut être répétée toutes les 4 à 6 heures, au besoin.

Ne PAS administrer plus de 5 doses par jour.

Ne PAS utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'acétaminophène.

ml = millilitre

lb = livres

mg = milligramme

c. à thé = cuillère à thé

## Ce que vous pouvez faire



- **Toujours lire l'étiquette du médicament et en suivre le mode d'emploi.**
- **Établir la dose selon le poids *actuel* de votre enfant.** Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.
- **Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament** (seringue ou gobelet gradué).
- **Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose.** Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.

Posologie de l'ibuprofène ►

Conseils, quiz et vidéos sur [MedicationSensee.ca](https://www.MedicationSensee.ca)

Médication sensée

# Posologie de l'ibuprofène chez les enfants

Ibuprofène	Si possible, établir la dose en fonction du poids de l'enfant, sinon en fonction de son âge. Dose unitaire orale <sup>s</sup>							
	Moins de 12 lb Moins de 4 mois	12 à 17 lb 4 à 11 mois	18-23 lbs 12 à 23 mois	24 à 35 lb 2 à 3 ans	36 à 47 lb 4 à 5 ans	48 à 59 lb 6 à 8 ans	60 à 71 lb 9 à 10 ans	72 à 95 lb 11 ans
<b>Gouttes concentrées d'ibuprofène pour nourrissons</b> <i>par exemple</i> <b>Gouttes concentrées MOTRIN® Nourrissons</b> 40 mg/1 ml	Consulter un médecin	 1,25 ml	 1,875 ml	—	—	—	—	—
<b>Suspension orale d'ibuprofène pour enfants</b> <i>par exemple</i> <b>Suspension orale MOTRIN® Enfants</b> 100 mg/5 ml	Utiliser les gouttes concentrées MOTRIN® Nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)			 5 ml (1 c. à thé)	 7,5 ml (1,5 c. à thé)	 10 ml (2 c. à thé)	 12,5 ml (2,5 c. à thé)	 15 ml (3 c. à thé)
<b>Comprimés d'ibuprofène à croquer pour enfants</b> <i>par exemple</i> <b>Comprimés à croquer Advil® Junior, 100 mg</b>	Consulter un médecin			 1 comprimé	 1,5 comprimé	 2 comprimés	 2,5 comprimés	 3 comprimés

## Instructions importantes

La dose unitaire peut être répétée toutes les 6 à 8 heures, au besoin.

Ne PAS administrer plus de 4 doses par jour.

Ne PAS utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'ibuprofène.

ml = millilitre

lb = livres

mg = milligramme

c. à thé = cuillère à thé

## Ce que vous pouvez faire

- **Toujours lire l'étiquette du médicament et en suivre le mode d'emploi.**
- **Consulter l'étiquette des produits ou le site Web des compagnies respectives pour tout renseignement sur les produits non fabriqués par Johnson & Johnson** Advil® (GSK/Haleon), Aleve®/Aspirin® (Bayer)), y compris les informations les plus récentes sur la posologie.
- **Établir la dose selon le poids *actuel* de l'enfant.** Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.
- **Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament** (seringue ou gobelet gradué).
- **Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose.** Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.

\*anti-inflammatoire non stéroïdien

Posologie de l'acétaminophène ►

Conseils, quiz et vidéos sur [MedicationSensee.ca](https://www.MedicationSensee.ca)

Médication sensée