

Posologie des antiallergiques en vente libre pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus

Chlorhydrate de cétirizine	QUANTITÉ [Ingrédient(s) actif(s)]	DOSE et FRÉQUENCE (Adultes seulement : 12 ans et plus)	LIMITE QUOTIDIENNE
Chlorhydrate de cétirizine teneur extra forte <i>par exemple</i> REACTINE® Régulier	Chlorhydrate de cétirizine : 5 mg par comprimé	1 ou 2 comprimés toutes les 24 heures Adultes de 65 ans et plus : 1 comprimé toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 2 comprimés par période de 24 heures Adultes de 65 ans et plus : 1 comprimé toutes les 24 heures
Chlorhydrate de cétirizine teneur extra forte <i>par exemple</i> REACTINE® Extra fort ou REACTINE® Extra fort Dissolution rapide	Chlorhydrate de cétirizine : 10 mg par comprimé (ou comprimé à dissolution rapide)	1 comprimé (ou comprimé à dissolution rapide) toutes les 24 heures Adultes de 65 ans et plus : Utiliser les comprimés REACTINE® Régulier à 5 mg	NE PAS prendre plus d'un comprimé (ou comprimé à dissolution rapide) par période de 24 heures Adultes de 65 ans et plus : Utiliser les comprimés REACTINE® Régulier à 5 mg
Chlorhydrate de cétirizine et chlorhydrate de pseudoéphédrine** <i>par exemple</i> REACTINE® Complet Sinus et allergies	Chlorhydrate de cétirizine : 5 mg par comprimé PLUS Chlorhydrate de pseudoéphédrine** : 120 mg par comprimé	1 comprimé toutes les 12 heures Adultes de 65 ans et plus : 1 comprimé toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 2 comprimés par période de 24 heures Adultes de 65 ans et plus : NE PAS prendre plus de 1 comprimé par période de 24 heures
Solution orale de chlorhydrate de cétirizine <i>par exemple</i> Sirop REACTINE®	Chlorhydrate de cétirizine : Solution orale à 5 mg/5 ml	5 ml ou 10 ml toutes les 24 heures Adultes de 65 ans et plus : 5 ml toutes les 24 heures	NE PAS 10 ml par période de 24 heures Adultes de 65 ans et plus : NE PAS prendre plus de 5 ml par période de 24 heures

Ce que vous pouvez faire

- Lorsqu'un dispositif d'administration est fourni avec le médicament, servez-vous uniquement de ce dispositif.
- Prenez **1 SEUL** médicament contenant un ingrédient médicinal donné à la fois.

Pourquoi?

Le fait de prendre plus d'1 médicament contenant le même ingrédient médicinal à la fois peut accroître votre risque d'être affecté par des effets indésirables néfastes.

Il est important de toujours lire l'étiquette et de suivre le mode d'emploi. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour déterminer le produit qui convient le mieux à votre enfant, consultez un professionnel de la santé.



Conseils, quiz et vidéos sur [medicationsensee.ca](https://www.medicationsensee.ca)

REACTINE® et BENADRYL® sont des marques commercialisées par Soins-santé grand public McNeil.
© Johnson & Johnson Inc, 2021

Posologie des antiallergiques en vente libre pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus

Chlorhydrate de diphéhydramine	QUANTITÉ [Ingrédient(s) actif(s)]	DOSE et FRÉQUENCE (Adultes seulement : 12 ans et plus)	LIMITE QUOTIDIENNE
Chlorhydrate de diphéhydramine teneur régulière <i>par exemple</i> BENADRYL® Allergies	Chlorhydrate de diphéhydramine : 25 mg par caplet	1 ou 2 caplets toutes les 4 à 6 heures	NE PAS prendre plus de 8 caplets par période de 24 heures NE PAS utiliser avec d'autres produits contenant de la diphéhydramine, même ceux que l'on applique sur la peau
Chlorhydrate de diphéhydramine teneur extra-puissante <i>par exemple</i> BENADRYL® Extra-puissant Allergies	Chlorhydrate de diphéhydramine : 50 mg par caplet	1 caplet toutes les 4 à 6 heures	NE PAS prendre plus de 4 caplets par période de 24 heures NE PAS utiliser avec d'autres produits contenant de la diphéhydramine, même ceux que l'on applique sur la peau
Chlorhydrate de diphéhydramine with Acétaminophen™ et Pseudoéphédrine hydrochloride™ <i>par exemple</i> BENADRYL® Allergy, Sinus & Pain Total	Chlorhydrate de diphéhydramine : 25 mg par caplet PLUS Acétaminophène (extra fort)*** : 500 mg par caplet PLUS Chlorhydrate de pseudoéphédrine** : 30 mg par caplet	2 caplets toutes les 6 heures	NE PAS prendre plus de 8 caplets par période de 24 heures NE PAS prendre en même temps que d'autres produits contenant de l'acétaminophène, ou d'autres médicaments contre la toux/le rhume ou la douleur/la fièvre. NE PAS utiliser avec d'autres produits contenant de la diphéhydramine, même ceux que l'on applique sur la peau
Chlorhydrate de diphéhydramine sous forme d'élixir <i>par exemple</i> Élixir BENADRYL®	Chlorhydrate de diphéhydramine : 1 cuillerée à thé (12,5 mg/5 ml)	2 à 4 cuillerées à thé (10 à 20 ml) toutes les 4 à 6 heures	NE PAS dépasser 16 cuillerées à thé (80 ml) par période de 24 heures NE PAS utiliser avec d'autres produits contenant de la diphéhydramine, même ceux que l'on applique sur la peau
Chlorhydrate de diphéhydramine teneur extra-puissante et formule-nuit <i>par exemple</i> BENADRYL® Extra-puissant Formule-nuit	Chlorhydrate de diphéhydramine : 50 mg par caplet	1 caplet au coucher	1 caplet au coucher, au besoin ou selon les directives d'un médecin NE PAS utiliser avec d'autres produits contenant de la diphéhydramine, même ceux que l'on applique sur la peau

Ce que vous pouvez faire

- Lorsqu'un dispositif d'administration est fourni avec le médicament, servez-vous uniquement de ce dispositif.
- Prenez **1 SEUL** médicament contenant un ingrédient médicinal donné à la fois.

Pourquoi?

Le fait de prendre plus d'1 médicament contenant le même ingrédient médicinal à la fois peut accroître votre risque d'être affecté par des effets indésirables néfastes.

Il est important de toujours lire l'étiquette et de suivre le mode d'emploi. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour déterminer le produit qui convient le mieux à votre enfant, consultez un professionnel de la santé.



Conseils, quiz et vidéos sur [medicationsensee.ca](https://www.medicationsensee.ca)

REACTINE® et BENADRYL® sont des marques commercialisées par Soins-santé grand public McNeil.
© Johnson & Johnson Inc, 2021

Posologie des antiallergiques en vente libre pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus

Loratadine	QUANTITÉ [Ingrédient(s) actif(s)]	DOSE et FRÉQUENCE (Adultes seulement : 12 ans et plus)	DAILY LIMIT
Loratadine <i>par exemple</i> CLARITIN® Allergies 24 heures	Loratadine : 10 mg par comprimé	1 comprimé toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 1 comprimé par période de 24 heures
Comprimés de loratadine à désintégration orale <i>par exemple</i> Comprimés ultra-fondants CLARITIN® 24 heures	Loratadine : 10 mg par comprimé	1 comprimé toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 1 comprimé par période de 24 heures
Loratadine en capsules <i>par exemple</i> Capsules liquides CLARITIN® 24 heures	Loratadine : 10 mg par capsule	2 capsule toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 1 comprimé par période de 24 heures

Desloratadine	QUANTITÉ [Ingrédient(s) actif(s)]	DOSE et FRÉQUENCE (Adultes seulement : 12 ans et plus)	LIMITE QUOTIDIENNE
Desloratadine <i>par exemple</i> CLARITIN® Allergy 24 Hour	Desloratadine : 5 mg par comprimé	1 comprimé toutes les 24 heures	NE PAS prendre plus de 1 comprimé par période de 24 heures
Desloratadine with pseudoephedrine sulfate** <i>par exemple</i> AERIUS® DoubleAction 12 Hour	Desloratadine : 2,5 mg par comprimé PLUS Sulfate de pseudoéphédrine** : 120 mg par comprimé	1 comprimé toutes les 12 heures	NE PAS prendre plus de 2 comprimé par période de 24 heures

Fluticasone	QUANTITÉ [Ingrédient(s) actif(s)]	DOSE et FRÉQUENCE (Adultes seulement : 18 ans et plus)	LIMITE QUOTIDIENNE
Vaporisateur nasal de propionate de Fluticasone (corticostéroïde) <i>par exemple</i> Flonase® Soulagement des allergies	Propionate de fluticasone (corticostéroïde) : 50 mcg par vaporisation	1re semaine 2 vaporisations dans chaque narine une fois par jour, de préférence le matin. De la 2e semaine à 3 mois 1 vaporisation dans chaque narine une fois par jour, si les symptômes sont maîtrisés. Après 3 mois d'usage quotidien Demandez à votre médecin si vous pouvez continuer à utiliser ce produit.	1re semaine Pas plus de 2 vaporisations par jour dans chaque narine De la 2e semaine à 3 mois Pas plus de 1 vaporisation par jour dans chaque narine. Après 3 mois d'usage quotidien Demandez à votre médecin si vous pouvez continuer à utiliser ce produit et quelle peut être la limite quotidienne.

Ce que vous pouvez faire

- Lorsqu'un dispositif d'administration est fourni avec le médicament, servez-vous uniquement de ce dispositif.
- Prenez **1 SEUL** médicament contenant un ingrédient médicinal donné à la fois.

Pourquoi?

Le fait de prendre plus d'1 médicament contenant le même ingrédient médicinal à la fois peut accroître votre risque d'être affecté par des effets indésirables néfastes.

Il est important de toujours lire l'étiquette et de suivre le mode d'emploi. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour déterminer le produit qui convient le mieux à votre enfant, consultez un professionnel de la santé.



Conseils, quiz et vidéos sur [medicationsensee.ca](https://www.medicationsensee.ca)

REACTINE® et BENADRYL® sont des marques commercialisées par Soins-santé grand public McNeil.
© Johnson & Johnson Inc, 2021