

Posologie de l'acétaminophène chez les enfants

Acétaminophène	Si possible, établir la dose en fonction du poids de l'enfant, sinon en fonction de son âge. Dose unitaire orale†							
	Moins de 12 lb Moins de 4 mois	12 à 17 lb 4 à 11 mois	18 à 23 lb 12 à 23 mois	24 à 35 lb 2 à 3 ans	36 à 47 lb 4 à 5 ans	48 à 59 lb 6 à 8 ans	60 à 71 lb 9 à 10 ans	72 à 95 lb 11 ans
Poids et âge de l'enfant Gouttes concentrées pour nourrissons <i>Par exemple</i> Gouttes TYLENOL® pour nourrissons 80 mg/1 ml	<i>Consulter un médecin</i>			—	—	—	—	—
Suspension orale pour enfants <i>Par exemple</i> Suspension orale TYLENOL® pour enfants 160 mg/5 ml	<i>Utiliser les gouttes concentrées TYLENOL® pour nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>							
Comprimés pour enfants <i>Par exemple</i> Comprimés TYLENOL® VIT-FONDUS® pour enfants 160 mg	<i>Utiliser les gouttes concentrées TYLENOL® pour nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>							

Instructions importantes

La dose unitaire peut être répétée toutes les 4 à 6 heures, au besoin.

Ne PAS administrer plus de 5 doses par jour.

Ne PAS utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'acétaminophène.

†Produits TYLENOL® pour nourrissons et pour enfants

- La dose unitaire peut être répétée toutes les 4 à 6 heures, au besoin.
- **Ne PAS** administrer plus de 5 doses par jour.
- **Ne PAS** utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'acétaminophène.

ml = millilitre c. à thé = cuillère à thé
mg = milligramme lb = livres

Ce que vous pouvez faire

- **Toujours lire l'étiquette du médicament et en suivre le mode d'emploi.**
- **Établir la dose selon le poids actuel de votre enfant.** Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.
- **Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament** (seringue ou gobelet gradué).
- **Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose.** Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.








Posologie de l'ibuprofène ►

Conseils, quiz et vidéos sur [MedicationSensee.ca](https://www.MedicationSensee.ca)

Les marques de commerce des tierces parties mentionnées dans le présent site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
TYLENOL®, MOTRIN® et MOTRIMAX^{MC} 12 heures sont des marques de commerce de Soins-santé grand public McNeil.
© Johnson & Johnson Inc. 2016 EST-1182

Médication **sensée**®

Posologie de l'ibuprofène chez les enfants

Ibuprofène	Si possible, établir la dose en fonction du poids de l'enfant, sinon en fonction de son âge. Dose unitaire orale ^s							
	Moins de 12 lb Moins de 4 mois	12 à 17 lb 4 à 11 mois	18 à 23 lb 12 à 23 mois	24 à 35 lb 2 à 3 ans	36 à 47 lb 4 à 5 ans	48 à 59 lb 6 à 8 ans	60 à 71 lb 9 à 10 ans	72 à 95 lb 11 ans
Poids et âge de l'enfant Gouttes concentrées d'ibuprofène pour nourrissons <i>Par exemple</i> Gouttes concentrées MOTRIN® pour nourrissons 40 mg/1 ml	<i>Consulter un médecin</i>	 1,25 ml	 1,875 ml	—	—	—	—	—
Suspension orale d'ibuprofène pour enfants <i>Par exemple</i> Suspension orale MOTRIN® pour enfants 100 mg/5 ml	<i>Utiliser les gouttes concentrées MOTRIN® pour nourrissons selon le mode d'emploi sur l'étiquette ou les directives d'un médecin (pour les nourrissons de moins de 4 mois)</i>			 5 ml (1 c. à thé)	 7,5 ml (1,5 c. à thé)	 10 ml (2 c. à thé)	 12,5 ml (2,5 c. à thé)	 15 ml (3 c. à thé)

Instructions importantes

La dose unitaire peut être répétée toutes les 6 à 8 heures, au besoin.

Ne PAS administrer plus de 4 doses par jour.

Ne PAS utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'ibuprofène.

§Produits MOTRIN® pour nourrissons et pour enfants

- La dose unitaire peut être répétée toutes les 6 à 8 heures, au besoin.
- **Ne PAS** administrer plus de 4 doses par jour.
- **Ne PAS** utiliser en même temps que d'autres produits contenant de l'ibuprofène.

ml = millilitre c. à thé = cuillerée à thé
 mg = milligramme lb = livres

Ce que vous pouvez faire

- **Toujours lire l'étiquette du médicament et en suivre le mode d'emploi.** *anti-inflammatoire non stéroïdien
- **Établir la dose selon le poids *actuel* de l'enfant.** Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.
- **Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament** (seringue ou gobelet gradué).
- **Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose.** Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.

Posologie de l'acétaminophène ►

 Conseils, quiz et vidéos sur **MedicationSensee.ca**

Les marques de commerce des tierces parties mentionnées dans le présent site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. TYLENOL®, MOTRIN® et MOTRIMAX^{MC} 12 heures sont des marques de commerce de Soins-santé grand public McNeil. © Johnson & Johnson Inc. 2016 EST-1182

Médication **sensée**®