

zypAdhera® PATIENTENPASS



Name: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Im Notfall kontaktieren Sie bitte:

Lilly



Anwendungsgebiete

Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit Schizophrenie, die während einer akuten Behandlung hinreichend mit oralem Olanzapin stabilisiert wurden.

Wie alle Arzneimittel kann ZypAdhera® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen

Häufige Nebenwirkungen (betreffen 1 bis 10 Behandelte von 100)

- ZypAdhera® kann manchmal zu schnell in das Blut gelangen. Dies kann zu den folgenden Nebenwirkungen führen: sehr starke Schläfrigkeit, Schwindel, Verwirrtheit, Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Schwierigkeiten beim Gehen, Muskelsteifheit oder Zittern, Schwäche, Reizbarkeit, Aggression, Angst, Blutdruckanstieg oder Krampfanfälle. In einigen Fällen können diese Beschwerden zur Bewusstlosigkeit führen.
- Schläfrigkeit
- Schmerzen an der Injektionsstelle

Die folgenden Nebenwirkungen wurden nach Gabe von Olanzapin-Tabletten beobachtet, können aber auch nach Anwendung von ZypAdhera® auftreten.

Sehr häufige Nebenwirkungen (betreffen mehr als 1 Behandelten von 10)

- Gewichtszunahme
- Schläfrigkeit
- Erhöhung der Prolaktinwerte im Blut
- Zu Beginn der Behandlung können sich einige Patienten schwindelig oder der Ohnmacht nahe fühlen (mit einem langsamen Herzschlag) insbesondere beim Aufstehen aus dem Liegen oder Sitzen. Dies vergeht üblicherweise von selbst. Falls nicht, sagen Sie es bitte Ihrem Arzt.

Häufige Nebenwirkungen (betreffen 1 bis 10 Behandelte von 100)

- Veränderungen der Werte einiger Blutzellen und Blutfette sowie zu Beginn der Behandlung erhöhte Leberwerte
- Erhöhung der Zuckerwerte in Blut und Urin
- Erhöhung der Harnsäure- und Kreatininphosphokinaseswerte im Blut
- Verstärktes Hungergefühl
- Schwindel
- Ruhelosigkeit
- Zittern
- Ungewöhnliche Bewegungen (Dyskinesie)
- Verstopfung

- Mundtrockenheit
- Ausschlag
- Schwäche
- Starke Müdigkeit
- Wassereinlagerungen, die zu Schwellungen der Hände, Knöchel oder Füße führen
- Fieber
- Gelenkschmerzen
- Sexuelle Funktionsstörungen wie verminderter Sexualtrieb bei Männern und Frauen oder Erektionsstörungen bei Männern

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der angeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in diesem Patientenpass angegeben sind.

Zusätzliche Informationen zu ZypAdhera® sowie weitere Nebenwirkungen und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Wichtige Informationen für Patienten

ZypAdhera® kann manchmal zu schnell in die Blutbahn gelangen. Dies kann zu den folgenden Nebenwirkungen führen: Sehr starke Schläfrigkeit, Schwindel, Verwirrtheit, Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Schwierigkeiten beim Gehen, Muskelsteifheit oder Zittern, Schwäche, Reizbarkeit, Aggression, Angst, Blutdruckanstieg oder Krampfanfälle. In einigen Fällen können diese Beschwerden zur Bewusstlosigkeit führen.

Aus diesem Grund sollen folgende Hinweise beachtet werden:

- Nach jeder Injektion werden Sie in Ihrer medizinischen Einrichtung für mindestens 3 Stunden bezüglich der oben genannten Symptome beobachtet.
- Ihr Arzt oder das Pflegepersonal muss sicherstellen, dass Sie keine Symptome einer Überdosierung haben, bevor Sie gehen.
- Obwohl es unwahrscheinlich ist, können Sie diese Symptome auch noch später als 3 Stunden nach der Injektion bekommen. Wenn dieses passiert, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder das Pflegepersonal.
- Wegen dieses Risikos sollen Sie für den restlichen Tag nach jeder Injektion kein Fahrzeug führen und keine Maschinen bedienen.

Teilen Sie Ihrem Arzt oder dem Pflegepersonal auf jeden Fall mit, falls Sie in der Klinik oder der Praxis eines der folgenden Symptome verspüren:

- Sehr starke Schläfrigkeit
- Schwindel
- Verwirrtheit oder Orientierungslosigkeit
- Reizbarkeit oder Aggression
- Angst
- Schwierigkeiten beim Sprechen oder Gehen
- Schwäche
- Muskelsteifheit oder Zittern

Ihr Arzt oder das Pflegepersonal muss Sie untersuchen und sicherstellen, dass Sie wach und symptomfrei sind, bevor Sie die Klinik verlassen. Sie sollen auch darüber aufgeklärt werden, was zu tun ist, falls später noch Symptome auftreten sollten.

Zusätzliche Informationen zu ZypAdhera® sowie weitere Nebenwirkungen und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Verschriebene Medikamente

Datum:

Bitte prüfen und aktualisieren Sie diese Medikamentenliste bei jedem Besuch mit Ihrem Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus oder auch in der Notaufnahme.

Verschriebene Medikamente

Datum: _____

Name des Medikaments	Dosierung mg, Einheiten, Sprühstöße, Tropfen	Zeitraum Beginn/Ende	Zeit der Einnahme Wie oft pro Tag? Morgens und abends? Nach dem Essen?	Zweck Warum nehmen Sie es ein?

Im Notfall kontaktieren Sie bitte:

Arzt, der ZypAdhera® verschrieben hat
(Name, ggf. Name des Krankenhauses,
Telefonnummer): _____

Name: _____

Telefon: _____

Name: _____

Telefon: _____

Notarzt: 112