



# baqsimi<sup>®</sup>

(Glucagon) Nasenpulver 3 mg



## ANWENDUNGS- HINWEISE

### FÜR DEN HYPOGLYKÄMIE-NOTFALL

Zur Abgabe an den Patienten  
nach Verschreibung und nach Schulung

**Notfallausweis im  
hinteren Teil dieser  
Broschüre bitte gleich  
entnehmen, ausfüllen  
und gut sichtbar  
mitführen.**

Ich habe Diabetes. Bei schwerer Unterzuckerung kann ich mir nicht selbst helfen.

In diesem Fall suchen Sie nach einem kleinen gelben Röhrchen. Es befindet sich in:

Folgen Sie der Anleitung am Etikett.

Drücken Sie den Kolben erst nach dem Einführen in die Nase.

Rufen Sie danach den Notruf 144 oder 112.

Danke für Ihre Hilfe!



## WAS IST BAQSIMI®?

- BAQSIMI® ist ein Notfallmedikament. Es wird angewendet, um eine schwere Hypoglykämie (sehr stark erniedrigten Blutzucker) bei Personen mit Diabetes zu behandeln. Es ist zur Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 4 Jahren vorgesehen.
- BAQSIMI® ist eine Form von Glucagon, das als Nasenpulver verabreicht wird. Glucagon ist ein natürliches Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es hat die gegenteilige Wirkung von Insulin und erhöht den Blutzuckerspiegel.
- BAQSIMI® ist gebrauchsfertig.
- BAQSIMI® muss nicht inhaliert werden.
- **BAQSIMI® wird bei einer schweren Hypoglykämie gegeben, auch wenn Sie bewusstlos sind, Ihre Nase verstopft ist oder Sie ein abschwellendes Mittel für die Nase eingenommen haben.**
- BAQSIMI® muss nicht im Kühlschrank gelagert werden. Es kann bei Temperaturen bis zu 30°C aufbewahrt werden.



## WANN WIRD BAQSIMI® ANGEWENDET?

- BAQSIMI® wird angewendet, wenn jemand eine schwere Hypoglykämie hat, nicht mehr essen und trinken kann und die Hilfe anderer Personen benötigt.
- Es ist wichtig, dass die Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld die Anzeichen einer schweren Hypoglykämie erkennen, sodass sie vorbereitet sind und Hilfe leisten können.

Mögliche Anzeichen einer schweren Hypoglykämie:

- Schwindel
- Stimmungsschwankungen
- Konzentrations- schwäche oder Verwirrtheit
- Koordinationsverlust
- Zittern oder Schwitzen
- Krampfanfall oder Bewusstlosigkeit

Halten Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten, gelben Röhrchen verschlossen.



# WIE WIRD BAQSIMI® ANGEWENDET?

Lesen Sie die Gebrauchsinformation und Bedienungsanleitung durch, bevor Sie BAQSIMI® benötigen.

- Zeigen Sie Ihren Familienmitgliedern, Freunden oder Arbeitskollegen, wo Sie BAQSIMI® aufbewahren und erklären Sie Ihnen, wann und wie es anzuwenden ist. **Es ist wichtig, dass Ihr persönliches Umfeld weiß, wie es angewendet wird, bevor Sie es benötigen.**
- Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur unmittelbaren Anwendung im eingeschweißten, gelben Röhrchen auf und ziehen Sie NICHT die Folie ab. Dadurch bleibt BAQSIMI® vor Feuchtigkeit geschützt. Wenn das Arzneimittel feucht wird, kann es sein, dass es weniger oder gar nicht wirksam ist.
- BAQSIMI® enthält nur eine Dosis Glucagon – entlüften Sie das Einzeldosisbehältnis daher NICHT und drücken Sie daher NICHT den Kolben, bevor Sie die Spitze des Behältnisses in das Nasenloch eingeführt haben.


## Vorbereitung erst unmittelbar vor der Anwendung:

- Entfernen Sie die Folie durch Ziehen am roten Streifen.
- Öffnen Sie das gelbe Röhrchen und entnehmen Sie das Einzeldosisbehältnis.

Halten Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten, gelben Röhrchen verschlossen.



## Zur nasalen Anwendung und nur zum einmaligen Gebrauch



- 1 • Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zwischen den Fingern.
- BAQSIMI® enthält nur eine Dosis Glucagon. Deshalb zunächst NICHT den Kolben (A) drücken und NICHT das Einzeldosisbehältnis testen.



- 2 • Schieben Sie die Spitze des Behältnisses (B) behutsam in ein Nasenloch, bis ein Finger die Außenseite der Nase berührt.



- 3 • Drücken Sie jetzt den Kolben (A) vollständig durch.
- Die Dosis wurde vollständig verabreicht, wenn der grüne Streifen am Kolben nicht mehr sichtbar ist.

## Nach der Anwendung:

- Falls die Person bewusstlos ist, bringen Sie diese nach der Gabe von BAQSIMI® in die stabile Seitenlage.
- **Fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an.**
- Wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist, halten Sie diese dazu an, so schnell wie möglich einen Imbiss oder ein Getränk mit hohem Zuckergehalt, wie z.B. Traubenzucker oder Fruchtsaft, zu sich zu nehmen.
- **Entsorgen Sie das gebrauchte Einzeldosisbehältnis und das gelbe Röhrchen gemäß den lokalen Abfallbestimmungen.**



Halten Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten, gelben Röhrchen verschlossen.



### Hier kommen Sie zum BAQSIMI®-Schulungsvideo:

Einfach den QR-Code scannen oder dem Link folgen  
[www.lilly.at/de/video/baqsimi.aspx](http://www.lilly.at/de/video/baqsimi.aspx)

## NOTFALLAUSWEIS

- Der BAQSIMI® Notfallausweis dient dazu, dass jeder Ersthelfer BAQSIMI® bei Ihnen findet, um Ihnen bei einer schweren Hypoglykämie Hilfe zu leisten.
- Überlegen Sie, wo genau Sie BAQSIMI® bei sich tragen wollen. Schreiben Sie den Aufbewahrungsort von BAQSIMI® auf den Notfallausweis.
- Tragen Sie den Notfallausweis und BAQSIMI® immer bei sich.
- Falls Sie hier keinen Notfallausweis auffinden oder ihn verloren haben, bitte anfordern unter:  
Tel: + 43 1 206 09 1270  
E-Mail: [medservices@lilly.com](mailto:medservices@lilly.com)

Ich habe Diabetes. Bei schwerer Unterzuckerung kann ich mir nicht selbst helfen.  
**In diesem Fall suchen Sie nach einem kleinen gelben Röhrchen. Es befindet sich in:**

Folgen Sie der Anleitung am Etikett.

Drücken Sie den Kolben erst nach dem Einführen in die Nase.

Rufen Sie danach den Notruf 144 oder 112.

Danke für Ihre Hilfe!





# baqsimi<sup>®</sup>

(Glucagon) Nasenpulver 3 mg

## **WEITERE HINWEISE**

Diese Broschüre ist verpflichtender Teil der Zulassung von BAQSIMI<sup>®</sup> 3 mg Nasenpulver und wurde als zusätzliche risikominimierende Maßnahme beauftragt. Auf diese Weise soll das Risiko einer unsachgemäßen Anwendung des Einzeldosisbehältnisses minimiert werden, sodass es nicht zu einem Ausbleiben der Arzneimittelwirkung kommt.

Für detaillierte Informationen in Bezug auf die Anwendung und die Handhabung von BAQSIMI<sup>®</sup> lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation und Bedienungsanleitung.

## **Meldung von Nebenwirkungen oder Produktreklamationen**

Um Nebenwirkungen oder Produktreklamationen im Zusammenhang mit unseren Produkten zu melden, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Tel: +43 1 206 09 1270

E-Mail: [medservices@lilly.com](mailto:medservices@lilly.com)

**Eli Lilly Ges.m.b.H.**  
**Erdberger Lände 26a, A-1030 Wien**  
**[www.lilly.at](http://www.lilly.at)**