

BEKÄMPA HALSONT



FÖRSTA TECKEN PÅ ONT I HALSEN?

- ✓ Snabb lindring vid halsont
- ✓ Antibakteriell
- ✓ Antiviral



OND OCH SVULLEN HALS?

- ✓ Smärtstillande
- ✓ Antiinflammatorisk
- ✓ Lindrar symptom som svullnad vid halsont

Vänd för mer läkemedelsinfo

Strepsils Honung & Citron, Strepsils Jordgubb, Strepsils Mint, Strepsils Ingefära, Strepsils Apelsin och Strepsils Citron, sugtablett (2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg). **INDIKATION:** Lindriga infektioner i munhåla och svalg ("ont i halsen"). **DOSERING:** Strepsils Honung & Citron, Strepsils Jordgubb, Strepsils Ingefära, Strepsils Apelsin och Strepsils Citron: Vuxna och barn från 6 år: En sugtablett får vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högst 12 sugtabletter per dygn. Strepsils Mint: Vuxna: högst 12 sugtabletter per dygn. Barn över 12 år: högst 8 sugtabletter per dygn. Barn under 12 år endast enligt läkares föreskrift. **VIKTIG INFORMATION:** Vid ihållande symtom eller hög feber kontakta läkare. Sugtablett ska inte ges till små barn på grund av kvävningsrisk. Vid graviditet eller amning, rådfråga läkare före bruk. Receptfritt läkemedel. **Följ noga anvisningarna i bipacksedeln.** För mer information: www.fass.se och www.strepsils.se. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, +45 44 44 97 01.

Strefen Honung & Citron 16,2 mg/ml munhålespray, lösning, Strefen 8,75 mg sugtabletter, Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter (flurbiprofen). **INDIKATION:** Strefen Honung & Citron 16,2 mg/ml munhålespray, lösning: För kortvarig symtomlindring vid akut halsont hos vuxna. Strefen 8,75 mg sugtabletter, Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter: För kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder. **DOSERING:** Strefen Honung & Citron 16,2 mg/ml munhålespray, lösning: En dos (3 sprayningar) med 3 - 6 timmars intervall efter behov. Max 5 doser under en 24-timmarsperiod i högst 3 dagar i följd. Ska sprayas längst bak i svalget. Undvik att andas in under sprayning. Ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Strefen 8,75 mg sugtabletter, Strefen Apelsin 8,75 mg sugtabletter: En sugtablett var 3:e-6:e timme efter behov. Högst 5 sugtabletter per dygn i högst tre dagar. Ska inte användas av barn under 12 år. **VIKTIG INFORMATION:** Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar. Ta inte Strefen om du är allergisk mot acetylsalisylsyra eller andra NSAID-preparat. **Gravida eller ammande** kvinnor ska inte använda Strefen. Strefen 8,75 mg sugtabletter: Ska ej användas vid veteallergi. **Följ noga anvisningarna i bipacksedeln.** För mer information se: www.fass.se. Receptfritt läkemedel. Förpackningar: 15 ml flaska med dospump, 16 sugtabletter. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, +45 44 44 97 01. RKT-M-34388 8/2023

