

PRODUKTGUIDE



Det finns mer än ett sätt att hantera smärta. Hitta en produkt som passar just dina behov.

Ipren Iprensa

Ipren® är ett receptfritt läkemedel som hjälper vid smärta och feber. Ipren® och Iprensa® verkar smärtlindrande, febernedsättande och inflammationsdämpande.

Ipaflex.

Ipaflex® är dubbelverkande: Lindrar smärta och dämpar inflammation.



- Hjälper bland annat vid huvudvärk, feber & mensvärk
- Ger långvarig smärtlindring i upp till 8 timmar

- Hjälper bland annat vid feber, huvudvärk och tandvärk
- Mindre tablett än Ipren® 400 mg – kan vara lättare att svälja

- Hjälper bland annat vid tandvärk och feber vid förkylningssjukdomar
- Förs upp med den trubbiga änden först

- Hjälper bland annat vid tandvärk och feber vid förkylningssjukdomar
- Sockerfri med apelsin smak



- För tillfällig lokal smärta i muskler & leder
- Hjälper vid smärta orsakad av t.ex. sportskador, fysisk aktivitet eller överansträngning
- Endast för utvärtes bruk

- Ger långvarig smärtlindring i upp till 8 timmar
- Lindrar fyra symtom vid förkylning & influensa: huvudvärk, feber, halsont och muskelvärk

- Ger långvarig smärtlindring i upp till 12 timmar
- Lindrar värk i muskler, rygg och leder



PRODUKTFÖRDELAR



FORMAT



STYRKOR



STORLEKAR



ÅLDER



DOSERING



AKTIV SUBSTANS

	<ul style="list-style-type: none"> • Hjälper bland annat vid huvudvärk, feber & mensvärk • Ger långvarig smärtlindring i upp till 8 timmar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hjälper bland annat vid feber, huvudvärk och tandvärk • Mindre tablett än Ipren® 400 mg – kan vara lättare att svälja 	<ul style="list-style-type: none"> • Hjälper bland annat vid tandvärk och feber vid förkylningssjukdomar • Förs upp med den trubbiga änden först 	<ul style="list-style-type: none"> • Hjälper bland annat vid tandvärk och feber vid förkylningssjukdomar • Sockerfri med apelsin smak 	<ul style="list-style-type: none"> • För tillfällig lokal smärta i muskler & leder • Hjälper vid smärta orsakad av t.ex. sportskador, fysisk aktivitet eller överansträngning • Endast för utvärtes bruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ger långvarig smärtlindring i upp till 8 timmar • Lindrar fyra symtom vid förkylning & influensa: huvudvärk, feber, halsont och muskelvärk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ger långvarig smärtlindring i upp till 12 timmar • Lindrar värk i muskler, rygg och leder 														
	Filmdragerade tabletter	Filmdragerade tabletter	Suppositorier	Oral suspension/flytande	Gel	Mjuka kapslar	Mjuka kapslar														
	400 mg	200 mg	60 mg	20 mg/ ml	5%	400 mg	200 mg														
	10 st & 30 st	30 st	10 st	100 ml	50 g	20 st	20 st														
	Från 12 år (över 40 kg)	Från 6 år (och över 20 kg)	Från 6 månader (och över 7 kg)	Från 6 månader (och över 7 kg)	Från 16 år	Från 12 år	Från 12 år (över 50 kg)														
	<p>1 tablett vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.</p> <p>Max 3 tabletter per dygn. Ska inte användas i mer än 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber utan läkarkontakt.</p> <p>Kontakta läkare om ungdomar måste ta detta läkemedel i mer än 3 dagar.</p>	<p>Barn 6-12 år (över 20 kg): 1 tablett vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Max 3 tabletter per dygn.</p> <p>Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg): 1 tablett vid behov 1-4 gånger per dygn, eller 2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn, med minst 4-6 timmars mellanrum. Max 6 tabletter per dygn.</p> <p>Ska inte användas i mer än 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber utan läkarkontakt.</p> <p>Kontakta läkare om barn och ungdomar måste ta detta läkemedel i mer än 3 dagar.</p>	<p>Doserna ges vid behov, med minst 6 timmars mellanrum.</p> <p>7-15 kg: 1 suppositorium 1-4 gånger per dygn. Max 4 st per dygn.</p> <p>Över 15-24 kg: 2 suppositorier 1-4 gånger per dygn. Max 8 st per dygn.</p> <p>Kontakta läkare om barnet behöver ta detta läkemedel i mer än 3 dagar.</p>	<p>Doserna ges vid behov, med minst 6 timmars mellanrum.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vikt</th> <th>Dosering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 - 10 kg</td> <td>2,5 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> <tr> <td>10 - 15 kg</td> <td>3,5 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> <tr> <td>15 - 19 kg</td> <td>5 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> <tr> <td>19 - 27 kg</td> <td>7 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> <tr> <td>27 - 37 kg</td> <td>10 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> <tr> <td>37- 42 kg</td> <td>13 ml 3-4 gånger per dygn</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontakta läkare om barnet behöver ta detta läkemedel i mer än 3 dagar.</p>	Vikt	Dosering	7 - 10 kg	2,5 ml 3-4 gånger per dygn	10 - 15 kg	3,5 ml 3-4 gånger per dygn	15 - 19 kg	5 ml 3-4 gånger per dygn	19 - 27 kg	7 ml 3-4 gånger per dygn	27 - 37 kg	10 ml 3-4 gånger per dygn	37- 42 kg	13 ml 3-4 gånger per dygn	<p>Gelen appliceras på det smärtande eller inflammerade området tre gånger per dygn. Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området, vanligen räcker det med 9-10 gram gel per dygn (motsvarar ca 18-20 cm gelsträng), dock högst 15 gram per dygn.</p> <p>Massera in gelen i huden under några minuter. Tvätta händerna efteråt. Får endast användas för utvärtes bruk.</p> <p>Max en veckas behandling.</p>	<p>1 kapsel tas vid behov 1-3 gånger per dygn, med 4-6 timmars mellanrum. Max 3 kapslar per dygn.</p> <p>Ska inte användas i mer än 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber utan läkarkontakt.</p> <p>Kontakta läkare om ungdomar måste ta detta läkemedel i mer än 3 dagar.</p>	<p>1 kapsel tas var 8-12e timme vid behov. Första behandlingsdagen kan 2 kapslar tas som startdos, följt av 1 kapsel efter 12 timmar. Högst 3 kapslar per dygn.</p> <p>Personer över 65 år ska inte ta mer än 2 kapslar per dygn, tagna som 2 singeldoser.</p> <p>Kontakta läkare om symtomen försämrats eller inte förbättras inom 5 dagar.</p>
Vikt	Dosering																				
7 - 10 kg	2,5 ml 3-4 gånger per dygn																				
10 - 15 kg	3,5 ml 3-4 gånger per dygn																				
15 - 19 kg	5 ml 3-4 gånger per dygn																				
19 - 27 kg	7 ml 3-4 gånger per dygn																				
27 - 37 kg	10 ml 3-4 gånger per dygn																				
37- 42 kg	13 ml 3-4 gånger per dygn																				
	Ibuprofen	Ibuprofen	Ibuprofen	Ibuprofen	Ibuprofen	Ibuprofen	Naproxen														