

Noste tento krátký přehled  
u sebe a ukažte jej zdravotnickým  
pracovníkům, kteří o Vás pečují.

-----  
Vaše jméno

-----  
Jméno lékaře (který předepsal Olumiant):

-----  
Telefonní číslo lékaře:

ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8  
Verze 4/2022  
Schváleno SÚKL: 13. 4. 2022

# KARTA UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

## Informace pro pacienta o přípravku OLUMIANT® (baricitinib)

*Přípravek je určen k léčbě dospělých s revmatoidní  
artritidou nebo s atopickou dermatitidou.*

*Tento text obsahuje důležité informace, které  
potřebujete znát před zahájením a během léčby  
přípravkem Olumiant.*

*Další informace o přípravku Olumiant najdete  
v Příbalové informaci pro uživatele (PIL), která je  
součástí balení přípravku a lze jí také vyhledat na:  
[www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)*

## Těhotenství:

---

- Neužívejte Olumiant, jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.
- Během léčby přípravkem Olumiant (a po dobu jednoho týdne po jejím ukončení) používejte spolehlivou antikoncepci.
- Pokud otěhotníte (nebo chcete otěhotnět), sdělte to ihned svému lékaři.

## Infekce:

---

Olumiant může způsobit zhoršení existující infekce nebo zvýšit pravděpodobnost onemocnění novou infekcí nebo zvýší pravděpodobnost reaktivace virů. Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky infekce, jako jsou:

- Horečka, nehojící se rány, pocit únavy větší než obvykle nebo problémy s chrupem.
- Kašel, který neustupuje, noční pocení a úbytek na váze. Mohou to být příznaky tuberkulózy (infekčního onemocnění plic).
- Bolestivá kožní vyrážka s puchýřky. Může to být příznak infekčního onemocnění pásovým oparem.

## Tuky v krvi:

---

- Může se stát, že Váš lékař Vám během léčby přípravkem Olumiant bude kontrolovat hladinu tuků v krvi (např. cholesterolu).

## Krevní sraženiny:

---

Olumiant může způsobovat vznik krevní sraženiny v noze, která může putovat do plic. Neprodleně informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků:

- Otok nebo bolest jedné nohy
- Teplo nebo zčervenání jedné nohy
- Nezvyklá dušnost
- Rychlé dýchání
- Bolest na hrudi

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, i takový který není uveden v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (<http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>)  
Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41,  
e-mail: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz)