

EDUKAČNÍ MATERIÁL

BAQSIMI

3 mg nosní zásyp
v jednodávkovém
obalu (*glucagonum*)



INFORMACE KE ŠKOLÍCÍ POMŮCCE

Uvnitř naleznete návod k použití školící pomůcky - demo-aplikátoru a více informací o přípravku Baqsimi.

INDIKACE

Přípravek Baqsimi je indikován k léčbě závažné hypoglykemie u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 4 let s onemocněním diabetes mellitus.

Prosím seznamte se Souhrnem informací o přípravku a Návodem k použití přípravku Baqsimi, který je součástí balení přípravku Baqsimi.

ŠKOLÍCÍ POMŮCKA

Důležité informace:

Tato pomůcka je určena k výuce a nácviku hlavních kroků při podávání přípravku Baqsimi. Je nutno si uvědomit následující hlavní rozdíly mezi školící pomůckou a skutečným přípravkem.

Školící pomůcka

- **neobsahuje léčivo**
- **slouží pouze k demonstračním účelům** z hygienických důvodů se **NEZASUNUJE** do nosní dírky
- **nesmí se nosit a uchovávat společně s přípravkem Baqsimi**, zabrání se tak případné záměně v případě závažné hypoglykemie

Znovunastavení školící pomůcky k opakovanému použití:



UCHOPTE prsty spodní část pod špičkou (úzkým koncem). Otáčejte tělem pomůcky, dokud nedojde k resetování pístu a neobjeví se opět zelený proužek.

Na rozdíl od školící pomůcky lze jednodávkový obal s jednou dávkou přípravku Baqsimi použít pouze jednou.

CO JE BAQSIMI?

Přípravek Baqsimi je léková forma glukagonu, která se podává vstříknutím prášku do nosní dutiny.

Kdy použít přípravek Baqsimi

- Baqsimi se používá v nebezpečné situaci způsobené závažnou hypoglykemií, kdy postižený není schopen jíst ani pít a potřebuje pomoc jiné osoby.
- Je důležité, aby lidé v okolí pacienta byli schopni případné příznaky této nebezpečné situace rozpoznat a byli připraveni poskytnout účinnou pomoc.

Vysvětlete pacientovi možné příznaky závažné hypoglykémie:

- závrať
- nepozornost nebo zmatenost
- křeče nebo ztráta vědomí
- výkyvy nálady
- nedostatek koordinace
- třes nebo pocení

Na dalších stranách najdete informace k podávání přípravku

BAQSIMI

3 mg nosní zásyp v jednodávkovém obalu (*glucagonum*)

Nutné zásady pro osoby s diabetem, kterým byl přípravek Baqsimi předepsán:

- mít přípravek vždy po ruce
- ukázat svému okolí způsob použití
- sdělit svému okolí, kde mají Baqsimi uložen

PODÁNÍ PŘÍPRAVKU BAQSIMI – instrukce, které mají být vysvětleny pacientovi:

- **Před použitím přípravku Baqsimi si přečtete návod k použití.**
- **Své rodině a přátelům ukažte, kde máte přípravek Baqsimi obvykle uložen, a vysvětlete, jak se přípravek používá. Musí vědět, jak přípravek použít před tím, než jej budete potřebovat.**
- **Nesnímejte ochrannou fólii ani neotvírejte žlutou tubu, dokud není potřeba podat dávku.** Byla-li žlutá tuba otevřená, mohla se do aplikátoru (jednodávkového obalu) dostat vlhkost a lék nemusí správně účinkovat.
- **Nestlačujte píst před zavedením do nosu. Jinak dojde ke ztrátě jediné dávky v jednodávkovém obalu**

PODÁNÍ DÁVKY



UCHOPTE aplikátor (jednodávkový obal), jak je vyobrazeno. **Nestlačujte píst před zavedením do nosu.**



ZAVEĎTE úzký konec do jedné z nosních dírek.



STLAČTE píst až nadoraz, dokud **nepřestane být vidět zelený proužek.**

**PRO ZHLÉDnutí VIDEA,
JAK BAQSIMI POUŽÍVAT, NAVŠTIVTE
STRÁNKU www.baqsimi.eu/cz**

PO PODÁNÍ DÁVKY

- Je-li osoba s nízkou hladinou krevního cukru v bezvědomí, otočte ji po podání přípravku Baqsimi na bok.
- **Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.**
- Osobu s nízkou hladinou krevního cukru přimějte, aby co nejdříve snědla jídlo či vypila nápoj s vysokým obsahem cukru, jako jsou sladkosti či ovocný džus.
- Použitý aplikátor (jednodávkový obal) a tubu vyhodte.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti o hlášení najdete na:
<http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email:
farmakovigilance@sukl.cz

Tato informace může být také hlášena společnosti Eli Lilly ČR telefonicky tel.: 800 112 122 (ČR) nebo emailem:
phv_czsk@lilly.com

Aktuálně platný SmPC lze vyhledat na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na adrese
<http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>