

Tableau canadien des faits sur le produit

SIROP ZARBEE'S TOUX + MUCOSITÉS POUR ENFANTS POUR LA NUIT NPN 80129935

Info-produit

Ingrédients médicinaux dans chaque portion (5 mL)

Miel (<i>Apis mellifera</i> – Miel)	6 g
Extrait de <i>matricaria chamomilla</i> (camomille allemande) (10:1 équivalant à 500 mg de fleur séchée)	50 mg
Extrait de <i>sambucus nigra subsp. nigra</i> (Baie de sureau européenne) (30-35:1 équivalant à 750 à 875 mg de fruits séchés)	25 mg
Extrait d' <i>Hedera helix</i> (lierre anglais) (4-7:1 équivalant à 72-126 mg de feuille séchée)	18 mg
Zinc (gluconate de zinc)	1,7 mg

Usages

La camomille est utilisée en phytothérapie pour aider à soulager l'agitation et la nervosité • Le miel apaise la toux associée à la sécheresse et à l'irritation de la gorge • La feuille de lierre aide à éliminer les mucosités de la toux.

Mises en garde

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 mois en raison du risque de botulisme • si votre enfant est allergique à l'un des ingrédients ainsi qu'aux ingrédients de la famille des astéracées, y compris l'herbe à poux.

Cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé en cas d'essoufflement (dyspnée) ou de mucus purulent (expectoration) • si la douleur à la gorge est très sévère ou persiste pendant plus de 2 jours ou si la toux persiste pendant plus de 7 jours, a tendance à réapparaître ou est accompagnée d'une forte fièvre, d'une éruption cutanée ou de maux de tête persistants. Il pourrait s'agir de signes d'une affection grave • si l'hypersensibilité ou des allergies se produisent.

Garder hors de la portée des enfants

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée • En cas de surdosage, appeler un centre antipoison ou un médecin • Un apport complémentaire en zinc peut causer une carence en cuivre. Si vous ne savez pas si vous prenez suffisamment de cuivre, consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation. • Un effet diurétique peut survenir.

Mode d'emploi

Enfants (2 à 12 ans) : Pour une utilisation occasionnelle. Bien agiter avant l'utilisation. Prendre 1 dose (5 ml), 2 fois par jour (le soir et avant le coucher), avec de la nourriture, quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Ne pas dépasser 2 doses par période de 24 heures. Consulter votre médecin avant l'utilisation si votre enfant est âgé de 2 à 4 ans, car une toux persistante ou récurrente nécessite un diagnostic médical avant le traitement, ou si votre enfant prend des médicaments ou est sous les soins d'un médecin pour une affection médicale. À prendre uniquement selon le mode d'emploi.

Autres renseignements

Conserver entre 15 et 30 °C. Ne pas utiliser si le sceau sous le capuchon est manquant ou brisé. Bien refermer le capuchon après chaque utilisation.

Ingrédients non médicinaux

Acide citrique, maltodextrine, arôme de baies mélangées, eau.

Vous avez des questions? 1 877 528-0420 ou visitez www.zarbees.ca