

Pflegeplan für Streuobstbau 25

Kernobst

Steinobst

Stadium	Datum	Schorf + Mehltau	Schädlinge	Schrotschuss Monilia Zwetschenrost	Schädlinge	Datum	Stadium
	Austriebspritzung Mitte März	Curenox 50 0,2% ± Bei Feuerbrandgefahr: 0,3% Curenox 50 mit Sonderbewilligung	Parafol 3,5%	Curenox 50 0,3% ± Parafol 3,5%		Mitte März	
	Vorblütenspritzung Mitte April	Slick + DelanWG 0,015%+0,03% ±	Gazelle SG 0,02%	Slick + DelanWG 0,02%+0,03%		Mitte April	
	Blütenspritzung	Slick + DelanWG 0,015%+0,03%		Slick + DelanWG 0,02%+0,03%			
	Nachblütenspritzung erste Woche Juni	Slick + DelanWG 0,015%+0,03% ±	Affirm Profi 0,2% (1. Apfelwickler)	Slick + DelanWG 0,02%+0,03% ±	Gazelle 0,015% (Pflaumensägewespe)		
 	Sommerbehandlungen Ende Juni	Slick + DelanWG 0,015%+0,03% ±	Affirm Profi 0,2% (2. Apfelwickler)	<u>Kirschfliegen</u> 1. Behandlung bei Farbumschlag grün/gelb: Moon Sensation 0,035% (Fruchtmonilia) ± 2. Behandlung 10 Tage später Moon Sensation 0,035% ± <u>Zwetschgen</u> Moon Sensation 0,035% (Fruchtmonilia) ±	Gazelle SG 0,02% Gazelle SG 0,02% Affirm Profi 0,2% (Pflaumenwickler)	Mitte Juni WF 14 Tg WF 14 Tg Anfang Juli WF 21 Tg	

Ihr Ansprechpartner

Ivo Rüst

Tel. 079 423 18 86

ivo.ruest@fenaco.com