

Pflegeplan für Streuobstbau 26

Kernobst

Steinobst

Stadium	Datum	Schorf + Mehltau	Schädlinge	Schrotschuss Monilia Zwetschenrost	Schädlinge	Datum	Stadium
	Ausblühspritzung Mitte März	200 gr /100 lt Curenox 50 ± 0,2% Bei Feuerbrandgefahr: 0,3% Curenox 50 mit Sonder-bewilligung	Parafol 3.5lt/100lt 3,5%	Curenox 50 ± 0.3%	Parafol 3,5%	Mitte März	
	Vorblütenspritzung Mitte April	15 ml/100lt Slick + 30 gr/100lt DelanWG ± 0.015%+0.03%	20 gr/100lt Gazelle SG 0.02%	Slick + DelanWG 0.02%+0.03%		Mitte April	
	Blütenspritzung	Slick + DelanWG 0.015%+0.03%		Slick + DelanWG 0.02%+0.03%			
	Nachblütenspritzung erste Woche Juni	Slick + DelanWG ± 0.015%+0.03%	200gr/100lt Affirm Profi* 0.2% (1. Apfelwickler)	Slick + DelanWG ± 0.02%+0.03%	Gazelle 0.015% (Pflaumensägewespe)		
 	Sommerbehandlungen Ende Juni	Slick + DelanWG ± 0.015%+0.03%	Affirm Profi* 0.2% (2. Apfelwickler)	<u>Kirschfliegen</u> 1. Behandlung bei Farbumschlag grün/gelb: 35 ml/100lt Moon Sensation ± 0.035% (Fruchtmonilia) 2. Behandlung 10 Tage später Moon Sensation ± 0.035% <u>Zwetschen</u> Moon Sensation ± 0.035% (Fruchtmonilia)	20gr/100lt Gazelle SG 0.02% Gazelle SG 0.02% Affirm Profi* 0.2% (Pflaumenwickler)	Mitte Juni WF 14 Tg WF 14 Tg Anfang Juli WF 21 Tg	

Ihr Ansprechpartner

Ivo Rüst

+41 79 423 18 86

ivo.ruest@fenaco.com

* nur in Obstanlagen