


ZR V 3. Split 26

Variante -

Fläche 0 ha



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	0	5 - 7 kg/ha							Max. 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha / Jahr anwenden. Entspricht 14 kg / ha CarkaoI5!	
Erdflöhe mit Sonderbewilligung Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid												
Karate Zeon PI F-4040	Erdräupen, Rübenerrdlöhe	10-12	0	0.075 l/ha		42		G20			● Schadschwelle: Keimblatt 50 % befallene Pflanzen. 2-Blatt: 80 % befallene Pflanzen. Braucht Sonderbewilligung! mischbar mit Herbiziden, max. 1 x	
Blattläuse: Spritzfolge gemäss Rübenfachstelle Gemäss allg. Verfügung!												
Teppeki	Grüne Blattlaus	10	0	140 g/ha							gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
oder Gazelle SG	Grüne Blattlaus	10	0	200 g/ha							Braucht Sonderbewilligung gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
oder Movento SC	Grüne Blattlaus	10	0	0.45 l/ha							gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
+ Mero W-5168	für bessere Benetzung	10	0	1 l/ha								
Herbizid 1. Split Sugaro Gold = Metamitron 1:1												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser	10-12	0	1.5 - 2 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter	10-12	0	1.5 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Lenacil Schneiter W-2485	Unkräuter, Raps, Melden, etc.	10-12	0	0.1 - 0.15 kg/ha		S2 + Sh	G20	1P	●		Produkt entspricht Venzar 1:1 mischbar!	

ZR V 3. Split 26

Variante -

Fläche 0 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 7 - 8 Tage später												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser		0	1.5 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter		0	1.5 - 2 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Lenacil Schneiter W-2485	Unkräuter, Raps, Melden, etc.		0	0.2 kg/ha			S2 + Sh	G20	1P	●	Produkt entspricht Venzar 1:1 mischbar!	
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 - 1 l/ha							Entsprechend Unkrautgrösse, Witterung, nicht über 25 C	
Herbizid 3. Split Wenn neue Unkräuter aufgelaufen sind!												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser		0	1.5 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser und Unkräuter		0	2 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 - 1 l/ha							Entsprechend Unkrautgrösse, Witterung, nicht über 25 C	
Gräserherbizid												
Fusilade Max PI D-7001	Gräser, Ausfallgetreide		0	1 - 2 l/ha		56					gegen kleine Hirsen 1 lt/ha zum Split beimischen	
Disteln												
Clio 100 W-7420-1	Mehrjährige Disteln		0	1 - 1.2 l/ha							Entspricht vormals Lontrel 100 1:1 mischbar!	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	1 l/ha							Als Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden.	
Spurenelemente Kurz vor Reihenschluss!												
Borstar	Bor-, Molybdänbedarf		0	2 l/ha								
+ Sulfomag	Schwefel, Magnesium		0	3 l/ha							Auch zusätzlich zu Fungizid beimischbar!	
+ Mangan 500 SC Lebosol	Manganbedarf		0	0.5 - 1 l/ha								
+ 13.0.46 Kalinitrat wasserlös			0	10 kg/ha								

ZR V 3. Split 26

Variante -

Fläche 0 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Fungizid Bei Befallsbeginn, Anf. Juli kontrollieren! NICHT UNTERDOSIEREN!												
Spyrale PI A-7179	Rost, Cercospora, Ramularia, Mehltau		0	1 l/ha		28		G50	1P	●		
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
+ Borstar			0	2 l/ha								
2. Fungizid 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung												
Propulse W-6825	Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheit		0	1.2 l/ha		7					Diese Notfallzulassung ist befristet auf den 31. Oktober 2025. BBCH 31 - 49 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 14 Tagen	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
3. Fungizid 18 - 21 Tage später! NICHT UNTERDOSIEREN!												
Spyrale PI A-7179	Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheit		0	1 l/ha		28		G50	1P	●		
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
4. Fungizid 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung												
Proline W-6339	Cercospora, Ramularia, Mehltau		0	0.6 l/ha								
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotopen (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial