


Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	0	5 - 7 kg/ha							Max. 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha / Jahr anwenden. Entspricht 14 kg / ha CarkaoI5!	
Erdflöhe Kontrolle beim auflaufen - Keimblattstadium!												
Karate Zeon PI F-4040	Erdräupen, Rübenerdföhe	10	0	0.075 l/ha		42		G20			● Schadschwelle im Keimblatt: 50 % befallene Pflanzen. 2-4 Blatt: 80 % befallene Pflanzen. Sonderbewilligung erforderlich. Max. 1 x Mischbar mit Herbizid.	
Blattläuse Gemäss allg. Verfügung und Aufruf durch Fachstelle!												
Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.14 kg/ha		60					SOBE!	
oder Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.2 kg/ha		90					SOBE!	
oder Movento SC W-6742	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.45 l/ha		90					SOBE!	
Herbizid 1. Split Sobald Unkräuter auflaufen!												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser	10	0	1.5 - 2 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter	10	0	1.5 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Tomahawk W-7320-4	Unkräuter, Melden, Hundspe., Klebern, Hirsen	10	0	0.2 l/ha			S2 + Sh		B3 W3		Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	

ZR Standart 26

Variante -

Fläche 0 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 7 - 10 Tage später												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser		0	1.5 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter		0	1.5 - 2 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Tomahawk W-7320-4	Unkräuter, Melden, Hundspe., Klebern, Hirsen		0	0.4 l/ha			S2 + Sh	B3 W3			Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 - 1 l/ha							Nicht über 25 C!	
Herbizid 3. Split wenn neue Unkräuter aufgelaufen!												
Sugaro Gold W-7087-1	Unkräuter, Ungräser		0	2 l/ha								
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser und Unkräuter		0	2 l/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Tomahawk W-7320-4	Unkräuter, Melden, Hundspe., Klebern, Hirsen		0	0.6 l/ha			S2 + Sh	B3 W3			Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Gräserherbizid												
Fusilade Max PI D-7001	Hirsen u. Gräser		0	1.5 - 3 l/ha		56						
Disteln												
Clio 100 W-7420-1	Mehrfährige Disteln		0	1 - 1.2 l/ha							Entspricht Lontrel 100 1:1 mischbar!	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	1 l/ha								
Spurenelemente Kurz vor Reihenschluss!												
Borstar	Bor-, Molybdänbedarf		0	2 l/ha								
+ Sulfomag			0	3 l/ha							Kann zusätzlich auch zu Fungizid zugefügt werden!	
+ Mangan 500 SC Lebosol			0	0.5 - 1 l/ha								
+ 13.0.46 Kalinitrat wasserlös			0	10 kg/ha								

ZR Standart 26

Variante -

Fläche 0 ha



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 1 Kontrolle ab Juli! NICHT UNTERDOSIEREN!												
Spyrale PI A-7179	Rost, Cercospora, Echter Mehltau		0	1 l/ha		28		G50	1P	●	Max. 2 x / Jahr	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
+ Borstar			0	2 l/ha								
Fungizid 2 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung												
Propulse W-6825	Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheit		0	1.2 l/ha		7					Diese Notfallzulassung ist befristet auf den 31. Oktober 2025. BBCH 31 - 49 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 14 Tagen	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
Fungizid 3 18 - 21 Tg. später NICHT UNTERDOSIEREN!												
Spyrale PI A-7179	Rost, Echter Mehltau, Cercospora		0	1 l/ha		28		G50	1P	●		
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	3 l/ha		14						
Fungizid 4 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung												
Proline W-6339	Cercospora, Ramularia, Mehltau		0	0.6 l/ha								
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial