

Zuckerrüben – Spritzplan 2026



Seite 1:

Herbizid-Strategie für konventionelle Sorten

Seite 2:

Herbizid-Strategie für Conviso-Rübensorten + Fungizid-Strategie

Herbizid-Strategie konventionelle Sorten:

Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung
	Schneckenfrass	Schnecken-Linsen	3 kg		beim Auflaufen auf Schnecken achten
		oder Steiner gold	5 kg		
1. Split	Einjährige Samenunkräuter, Ungräser Hundspetersilie, Klebern, Hirsen Ausfallraps, Vogelknöterich Pflanzenstärkung / vitalisierend ev. Erdflöhen / Raupen	Mentor Uno	0.5 l		Im Keimblattstadium der Unkräuter. Unabhängig vom Rübenstadium <20° (morgens spritzen)
		+ Rübex	1.5 l		
		+ Beta OMYA	1.5 l		
		+ Solanis*	0.3 l	*	
		+ Spark (anstelle Solanis)	50-100 g	*	
		+ Oxysol	350 g		
		+ ev. Aligator*	0.3 l	*	BSS erfüllen + notieren Sonderbewilligung notwendig!
2. Split	Einjährige Samenunkräuter, Ungräser Hundspetersilie, Klebern, Hirsen (Netzmittel / Blattdüngung) Pflanzenstärkung / vitalisierend ev. Erdflöhen / Raupen	Mentor Uno	0.75 l		7-10 Tage nach dem 1. Split <20° (morgens spritzen)
		+ Rübex	1.75 l		
		+ Beta OMYA	1.5 l		
		+ Solanis*	0.6 l	*	
		+ Complestal P-Top	1.5 l		
		+ Oxysol	350 g		
		+ ev. Aligator*	0.3 l	*	BSS erfüllen + notieren Sonderbewilligung notwendig!
Bei Problemen mit Vogelknöterich und Ausfallraps sollte im 1. Split 0.3 l Solanis mit 50-100 g Spark* ersetzt werden. Spark (Venzar / Lenacil) ist jedoch im IP-Suisse-Anbau nicht bewilligt . Gerne in Rücksprache mit Pius Fleischmann					
3. Split	Einjährige Samenunkräuter, Ungräser Hundspetersilie, Klebern, Hirsen (Netzmittel / Blattdüngung) Pflanzenstärkung / vitalisierend	Mentor Uno	1 l		Sobald eine neue Unkrautwelle keimt, spätestens vor Reihenschluss <20° (morgens spritzen) (Loper unterstützt die Versiegelung und verhindert eine Spätverunkrautung)
		+ Rübex	2 l		
		+ Beta OMYA	2 l		
		Solanis*	0.6 l	*	
		Loper	0.5 l		
		+ Complestal P-Top	2 l		
		+ Oxysol	350 g		
Bekämpfung auf Grund der Schadschwelle und Empfehlung der Rübenfachstelle	Schwarze Rübenblattlaus	Pirimicarb*	250 g	*	Bei Pirimicarb und Teppeki ist keine Sonderbewilligung notwendig
	Blattläuse (Röhrenläuse)	Teppeki	140 g		
	Blattläuse (Röhrenläuse)	Pistol	200 g		Sofern eine Allgemeinverfügung für 2026 vom BLW erteilt wird
	Blattläuse (Röhrenläuse)	Movento SC	0.45 l		
Bei Reihenschluss	Herz-/Trockenfäule (Bormangel)	Maneltra Bor	3-5 l		Trockenheit / PH >7 (Bor-Mangel)
Korrekturbehandlung bei aufgelaufenem	Sonnenblumen, Disteln	+ Alopex	167 g		Sonnenblumen bis 4-Blatt Disteln bis 20-40 cm
	Netzmittel	+ Telmion	1.5 l		
Korrekturbehandlung bei aufgelaufenen	Hirsen	Ruga	2.5 l		Spritzabstände: Split → Ruga 5-7 Tage Ruga → Split 2-3 Tage
	Raigras, Quecken	Ruga	4 l		

Bei schlechter Witterung und ungünstigen Bedingungen die Aufwandsmenge in Futterrüben auf 70% reduzieren

Herbizid-Split-Anpassung bei trockener Witterung

Bei Trockenheit (wenig Bodenfeuchte) wirken die Bodenherbizide (Loper, Solanis) ungenügend.
In diesem Fall sind die Tankmischungen blattaktiver zu gestalten.

möglicher Split bei Trockenheit Gegen eine Spätver- unkrautung sollten die Bodenherbizide noch vor Reihenschluss platziert werden.	Einjährige Samenunkräuter, Ungräser	Mentor Uno	1 l		blattaktiver Split <20° (morgens spritzen)
		+ Rübex	1.75 l		
		+ Beta OMYA	1 l		
	Hundspetersilie, Disteln, Kamille (Netzmittel / Blattdüngung)	+ Alopex	80 g		
		+ Complestal P-Top	2 l		

Fungizid-Strategie

1. + 2. Fungizid (Resistenzgruppe 5 + 3)	Blattflecken, Mehltau, Rost	Ethosan	1 l	*	Beim Infektionsdruck und Auftreten der ersten Blattflecken Morgens ins abtrocknende Tau applizieren
	Blattflecken	+ Funguran Flow	2 l		
	S-Blattdünger	+ Sulfix	3 l		
	Blattdünger Mg, B, Mn + S	+ Combitop / Bortop	10 kg		
	Spurenelemente / Netzmittel	+ Microplant	1 l		
3. Fungizid (Resistenzgruppe 3)	Blattflecken, Mehltau, Rost	Proline	0.6 l		3 Wochen nach der letzten Behandlung (bis 5 Wochen vor Ernte) Morgens ins abtrocknende Tau applizieren
		+ Funguran Flow	2 l		
	Zuckerumlagerung	+ Sugar Mover	2 l		
	Blattdünger Mg, B, Mn + S	+ Combitop / Bortop	10 kg		
	Spurenelemente / Netzmittel	+ Microplant	1 l		

Bemerkung:

2025 wurde Propulse mit einer Notfallzulassung auf Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten in Zuckerrüben / Futterrüben bewilligt. Diese Zulassung war bis 31.10.2025 befristet.

Für 2026 ist noch keine Notfallzulassung für (Propulse oder Enduro) erteilt worden.

Herbizid-Strategie für Conviso-Sorten (Sulfonylharnstoff-resistenten Zuckerrübensorte)

1. Split 2-Blatt von (Weisser Gänsefuss)	Systemische, blattaktive Wirkung auf aufgelaufene Unkräuter / Ungräser	Conviso One*	0.5 l	*	Anwendung auf trockene Pflanzen bei hoher Luftfeuchtigkeit und genügend Bodenfeuchtigkeit
	Netzmittel	+ Actirob B	1-1.25 l		
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxsol	350 g		
	ev. Erdflöhen / Raupen	+ ev. Aligator*	0.3 l	*	BSS erfüllen + notieren Sonderbewilligung notwendig!
2. Split ca. 10-14 Tagen nach dem 1. Split	Systemische, blattaktive Wirkung auf aufgelaufene Unkräuter / Ungräser	Conviso One*	0.5 l	*	Anwendung auf trockene Pflanzen bei hoher Luftfeuchtigkeit und genügend Bodenfeuchtigkeit
	Netzmittel	+ Actirob B	1-1.25 l		
	(Netzmittel / Blattdüngung)	+ Complezal P-Top	2 l		
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxsol	350 g		
	ev. Erdflöhen / Raupen	+ ev. Aligator*	0.3 l	*	BSS erfüllen + notieren Sonderbewilligung notwendig!

Herbizid-Strategie für Conviso-Sorten (Verzicht auf Herbizide = bis 4-Blatt der ZR Flächenbehandlung erlaubt)

1. Split bis 4-Blatt der Zuckerrüben	Systemische, blattaktive Wirkung auf aufgelaufene Unkräuter / Ungräser	Conviso One*	0.7 l	*	Anwendung auf trockene Pflanzen bei hoher Luftfeuchtigkeit und genügend Bodenfeuchtigkeit
	Netzmittel	+ Actirob B	1 l		
	Bodenversiegelung gegen auflaufende Unkräuter	+ Beta Omya	1.5 l		
		+ Solanis*	0.6 l	*	
	(Netzmittel / Blattdüngung)	+ Complezal P-Top	2 l		
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxsol	700 g		
	ev. Erdflöhen / Raupen	+ ev. Aligator*	0.3 l	*	BSS erfüllen + notieren Sonderbewilligung notwendig!

Produkte mit Anwendungs-Auflagen	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	SPe 2 (Anwendungs-Verbote)			SPe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Pirimicarb	-	-	-	-	-	1 Punkt
Aligator (3 dl/ha)	-	-	-	-	50 m	1 Punkt
Ethosan (Spyrale)	-	-	-	-	50 m	1 Punkt
Spark / Venzar / Lenacil	(Nicht in IP-Suisse bewilligt)	X	-	-	20 m	1 Punkt
Conviso One	-	-	-	-	6 m	2 Punkte
Solanis	max. 250 g Quinmerac (1.5 l Solanis) / Parzelle / 2 Jahre	X	X	X	-	-

Unabhängig vom Produkt muss im ÖLN zur Verminderung von Abdrift und Abschwemmung mindestens 1 Punkt erreicht werden.