


Speise- und Industriekartoffeln 2026



Fläche 0 ha



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Beizung beim Kartoffellegen												
Symbac netto	Teilwirkung Rhizoctonia Solani, Förderung des Wurzelwachstums		0	0.5 l/ha								
+ Sercadis BASF W-7134	Rhizoctonia-solani-Krankheit		0	0.5 l/ha							● Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Beim Legen auf die Knolle sprühen. Bei Furchenbehandlung vor und auf die Knolle ist 0.8 lt/ha möglich.	
Herbizid Voraufbau												
Boxer PI D-7296			0	2.5 l/ha								
+ Bandur Bayer W-6149	Ungräser und Unkräuter		0	2 l/ha				G20	3P	●	nur im Voraufbau verwenden	
+ Sencor SC W-6630	Ungräser und Unkräuter		0	0.5 l/ha					1P	●	Aufbrauchsfrist: 01.07.2026	
Herbizid Voraufbau ohne Metribuzin												
Boxer PI D-7296			0	2.5 l/ha								
+ Bandur Bayer W-6149	Ungräser und Unkräuter		0	2 l/ha				G20	3P	●	nur im Voraufbau verwenden	
+ Proman W-7256	Unkräuter, Ungräser		0	2 l/ha				B20				

Speise- und Industriekartoffeln 2026



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Korrektur Gräser und Hirsen												
Select Stähler W-6010	Hirsen, Gräser		0	0.5 - 1 l/ha			S2 + Sh	B6			vor Reihenschluss anwenden. Keine zu späten Spritzungen.	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	1 l/ha							nur bei Solo-Anwendung dazugeben	
Korrektur Winden												
Titus Stähler W-4701	Winden, Hirsen		0	40 g/ha							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ca. 20 cm Staudenhöhe	
+ Boxer PI D-7296	Verstärkt Wirkung		0	0.5 l/ha						1P		
Fungizid 1												
Enervin SC W-7648	Kraut und Knollenfäule		0	1.2 l/ha								
+ Cymoxanil WG Schneiter W-6693	Kraut- und Knollenfäule, Alternaria		0	0.25 kg/ha		21					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Patastar Plus Landor			0	3 - 5 l/ha							Phosphor Blattdüngung zur Förderung des Knollenansatzes	
Fungizid 2												
Infito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●		
+ Dagonis W-7341	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.75 l/ha		14				●	Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. 1 x Dagonis + 3 x Revus Top möglich!	
+ Patastar Plus Landor			0	5 l/ha							Phosphor Blattdüngung zur Förderung des Knollenansatzes	
ev Yukan netto			0	1 l/ha								
Fungizid 3												
Revus Top PI F-5399	Alternaria spp., Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14			1P	●		
+ MagMan Plus			0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha								

Speise- und Industriekartoffeln 2026



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 4												
Infinito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●	Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. max. 4 Behandlungen	
+ MagMan Plus			0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha							zur Stärkung der Pflanzen	
evt Calstar	Teilwirkung gegen Eisenflecken		0	4 l/ha							Bei anfälligen Sorten: Lady Rosetta, Lady Christl, Chalenger, Charlotte, Laura, Gourmandine, Erika, Venezia, Victoria, Markies, Belmonda	
Fungizid 5												
Revus Top PI F-5399	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14				1P ●	Bei hohem Krautfäuledruck Sporex beimischen!	
+ Borstar	Aufbau der Zellwandstruktur, innere Qualität und Stärke		0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha							zur Stärkung der Pflanzen	
Fungizid 6												
Infinito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●	Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. Max. 4 x	
+ Sulfomag			0	0 l/ha							Magnesium und Schwefel fördert die Photosynthese und Stärke	
+ Calstar	Teilwirkung Eisenflecken		0	4 l/ha							Bei anfälligen Sorten: Lady Rosetta, Lady Christl, Chalenger, Charlotte, Laua, Gourmandine, Erika, Venezia, Victoria, Markies, Belmonda	
Keimverhinderung/ Durchwuchs												
Itcan SL 270 W-6933	Verhinderung von frühzeitiger Keimung am Lager und Kontrolle der Durchwuchskartoffeln		0	11 l/ha		21				W3	Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Anwendung ab einer Knollengrösse von: 25 mm bei festkochenden Sorten 35 mm bei mehligkochenden- und Industriesorten Nicht bei Temperaturen über 25°C anwenden, 24 h kein Regen nach der Applikation Nur solo anwenden!	

Speise- und Industriekartoffeln 2026



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 7												
Revus Top PI F-5399	Alternaria., Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14				1P	●	
+ Sulfomag			0	3 l/ha								
Blattläuse												
Movento SC W-6742	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.75 l/ha		14					ohne Sonderbewilligung möglich Schadschwelle: 10 Läuse/ Fiederblatt, Max. 2 x	
Krautfäule Abstopp - Spritzung												
Sporex W-7534-1	Kraut- und Knollenfäule		0	0.25 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. ist identisch mit Cymoxanil WG von Schneiter	
+ Infinito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●	Max. 4 Behandlungen!	
+ Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. max. 3 Behandlungen	
Fungizid 8												
Enervin SC W-7648	Kraut-, Knollenfäule		0	1.2 l/ha								
+ Cymoxanil WG Schneiter W-6693	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Knollenfäule		0	0.25 kg/ha		21						
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14						
Fungizid 9												
Shirlan PI D-3844	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	0.4 l/ha		14		G20	4P			
oder Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					max. 3 Behandlungen Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist	
Schnecken 1. Behandlung vor Reihenschluss												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken		0	5 - 7 kg/ha							Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	

Speise- und Industriekartoffeln 2026



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Kartoffelkäfer ohne SoBe												
Audienz Omya W-6020	Kartoffelkäfer		0	0.05 l/ha		21					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Schadschwelle 1 - 2 Herde / a	
2. Kartoffelkäfer mit SoBe												
Coragen PI I-7380	Kartoffelkäfer		0	60 ml/ha		14						
Blattläuse u. Kartoffelkäfer mit SoBe												
Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.2 kg/ha							Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
Abbrennen von abreifenden Stauden												
Firebird Plus W-7340	Desikkation, Abbrennen		0	2 l/ha					G20	3P	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Am Vormittag in abgehenden Tau spritzen!	
+ Shirlan PI D-3844	Kraut- und Knollenfäule, Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.4 l/ha		14			G20	4P		
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	2 l/ha								
2. Behandlung 5 - 7 Tg. später												
Spotlight Plus Ewia PI I-6117	Desikkation, Abbrennen		0	1 l/ha							Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	2 l/ha							2.0 lt/ha Parafof brennt noch stärker, nur in Saatkartoffeln bewilligt!	
Schlegeln u. Abbrennen innerhalb 24 h												
Firebird Plus W-7340	Desikkation, Abbrennen		0	2 l/ha					G20	3P	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
oder Spotlight Plus Ewia PI I-6117	Desikkation, Abbrennen		0	1 l/ha							Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Shirlan PI D-3844	Kraut- und Knollenfäule, Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.4 l/ha		14			G20	4P		
+ev. Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 - 2 l/ha								

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen

Speise- und Industriekartoffeln 2026

Fläche 0 ha



Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial