

Gerste – Spritzplan 2026



	Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung
(Winter-) Gerste (konventionell) _____ ha						
Herbst	Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Aduka	0.6 l		Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen.
		unterstützt die Gräserwirkung	+ Arlit	+ 1-2 l		
	Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Trinity*	2 l	*	Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung.
		unterstützt die Gräserwirkung	+ Arlit	+ 1-1.5 l		
	Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Trinity*	2 l	*	
		inkl. Raigras-Horste	+ Grant	+ 0.9 l		

Frühjahr - Herbizid Korrektur-Behandlungen oder Frühjahr-Strategien siehe bei Extenso-Varianten (min. 5 Tage Abstand zum Verkürzen)

1	1-Fungizid-Strategie	Blatt- / Ährenkrankheiten	Enduro 	1.5 l		Fahnenblatt (bevor Grannen / Ähre sichtbar)
		Blatt- / Ährenkrankheiten	oder Casac	oder 1 l		
		Halmverstärkung	+ Elotin	0.5-0.75 l		
1	Fungizid mit Halmverkürzung	Blattkrankheiten + Mehltau	Casac	1 l		1-2 Knoten-Stadium (BBCH 31-32)
		Halmverkürzung	+ Paudor 	0.8-1 kg		Temperaturanspruch: ab 10-12° (tags)
		oder Halmverkürzung (anstatt Paudor)	+ Milo + Elotin	0.5 l 0.4 l		Temperaturanspruch: ab 14-16° (tags) allgem. wüchsiges Wetter > 5°(nachts)
2	Fungizid mit Ährenstielverkürzung	Blatt- / Ährenkrankheiten	Enduro 	1.5 l		Fahnenblatt (BBCH 39) (bevor Grannen / Ähre sichtbar)
		Halmverstärkung	+ Elotin	0.5-0.75 l		
Blattdüngung mit vitalisierender Wirkung		Schwefeldüngung +	Sulfix	3 l		In allen Applikationen bei trockenem Bestand <23° möglich
		Mg, S, Zn, Mn	Epso Combitop	5 kg		
1	= 1-Fungizid-Strategie nur für standfeste Sorten					
1 + 2	= 2-Fungizid-Strategie (mit Halmverkürzung) für alle ertragreichen Sorten, die zur Lagerfrucht neigen.					

(Winter-) Gerste (extenso) _____ ha						
Herbst	Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Aduka	0.6 l		Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen.
		unterstützt die Gräserwirkung	+ Arlit	+ 1-2 l		
	Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Trinity*	2 l	*	Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung.
		unterstützt die Gräserwirkung	+ Arlit	+ 1-1.5 l		
	Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser	Trinity*	2 l	*	
		inkl. Raigras-Horste	+ Grant	+ 0.9 l		

Frühjahr	Gräser ohne Unkraut	Ungräser (ungenügend auf einj. Rispe)	Grant	1.2 l		bis BBCH 32 (2-Knoten) >10°
	Einjährige Rispengras	einjährige Rispe + Unkraut	Zepter	200 g		bis BBCH 29 (Bestockung) >10°
	Kor.: Blacken, Disteln, Mohn, Raps	Unkraut (ohne Klebern, Winden)	Biplay SX*	45 g	*	bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >10°
	Kor.: Disteln, Blacken, Kornblume	Unkraut (ohne Klebern, Ehrenpreis)	Taxi SX	45 g		bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >10°
	Kor.: Klebern, Blacken, Taubnessel	Unkraut (ohne Disteln, Raps)	Pixxaro EC	0.5 l		bis BBCH 39 (Fahnenblatt) > 5°
	Kor.: Klebern, Disteln	Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel)	Starane XL	1.8 l		bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >15°
	Kor.: Blacken, Winden, Klebern	Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel)	Hoestar	40 g		bis BBCH 49 (Ähreschieben) >15°
	Breite Tankmischung auf Unkräuter und Ungräser	Ungräser	Grant	1.2 l		bis BBCH 32 (2-Knoten) breite, komplette Tankmischung mit vitalisierender Blattdüngung
		div. Unkräuter	+ Taxi SX	30 g		
			+ Pixxaro EC	0.3 l		
		Schwefeldüngung	+ Sulfix	3 l		
	Blattdüngung Mg, S, Mn, Zn		+ Epso Combitop	6-8 kg		

Produkte mit Anwendungs-Auflagen	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	Spe 2 (Anwendungs-Verbote)			Spe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Trinity	-	X	-	-	20 m	1 Punkt
Biplay SX	aufbrauchen in Gerste bis 01.10.2027	-	-	-	-	1 Punkt
Aduka	Verkauf bis 01.01.2026 / aufbrauchen bis 01.01.2027	-	-	-	6 m	2 Punkte

Resistenzmanagement: Mit **Enduro** kann eine auf höchstem Niveau funktionierende Fungizid-Strategie ohne die resistenzanfällige SDHI-Gruppe geführt werden.