



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schnecken												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken		0	5 - 7 kg/ha							Max. 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha / Jahr anwenden. Entspricht 14 kg / ha Carkol5!	
Erdflöhen												
Karate Zeon PI F-4040	Rübenerdflöhe		0	0.075 l/ha		42		G20			Schadschwelle im Keimblatt: 50 % befallene Pflanzen. 2-4 Blatt: 80 % befallene Pflanzen. Sonderbewilligung erforderlich. Max. 1 x Mischbar mit Herbizid.	
Blattläuse Einsatz gemäss allg. Verfügung!												
Teppeki ISK PI D-5649	Blattläuse (Röhrenläuse)	14	0	0.14 kg/ha		60					Braucht SoBe. Einsatz nach Fachstelle!	
oder Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)	14	0	0.2 kg/ha		90					Braucht Sonderbewilligung! Gegen Virusvektoren, Einsatz nach Fachstelle!	
oder Moverto SC W-6742	Blattläuse (Röhrenläuse)	14	0	0.45 l/ha		90					Braucht Sonderbewilligung! Gegen Virusvektoren, Einsatz nach Fachstelle! Max. 1 x	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	14	0	1 l/ha								
Herbizid 1. Split Behandlung spätestens wenn weisser Gänsefuss 2 echte Blätter hat.												
Conviso One netto W-7261	Unkräuter und Ungräser	12	0	0.5 l/ha						2P	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 10 Tagen.	
+ Tomahawk W-7320-4	Unkräuter, Ehrenpreis	12	0	0.4 l/ha			S2 + Sh		B3 W3		Achtung: Rübepflanzen dürfen keine frischen Erdflöhschäden aufweisen!	
+ Mero W-6720	Wirkungsverstärkung	12	0	1 l/ha								

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 10-14 Tage nach dem ersten Split												
Conviso One netto W-7261	Unkräuter und Ungräser	14-16	0	0.5 l/ha							2P	
+ Tomahawk W-7320-4	Unkräuter, Ehrenpreis, Hirsen	14-16	0	0.6 l/ha			S2 + Sh	B3 W3			Achtung: Rübenpflanzen dürfen keine frischen Erdflohschäden aufweisen!	
+ Mero W-6720	Wirkungsverstärkung	14-16	0	1 l/ha								
Spurenelemente Kurz vor Reihenschluss!												
Borstar			0	2 l/ha							Mischbar mit anderen Borprodukten	
+ Sulfomag	Schwefel, Magnesium		0	3 l/ha							Kann zusätzlich auch zu Fungizid zugefügt werden!	
+ Mangan 500 SC Lebosol	Mn		0	0.5 - 1 l/ha								
+ 13.0.46 Kalinitrat wasserlös			0	10 kg/ha								
Fungizid 1 Erste Cercospora Flecken sichtbar. Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Spyrale PI A-7179	Cercospora, Ramularia, Mehltau, Rost		0	1 l/ha		28		G50	1P	●	Max. 2 x /Jahr	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
+ Borstar			0	2 l/ha								
Fungizid 2 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Propulse W-6825	Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheit		0	1.2 l/ha		7					Diese Notfallzulassung ist befristet auf den 31. Oktober 2025. BBCH 31 - 49 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 14 Tagen	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						
Fungizid 3 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Spyrale PI A-7179	Cercospora- und Ramularia Blattfleckenkrankheit		0	1 l/ha		28		G50	1P	●	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 4 18 - 21 Tage nach der ersten Behandlung												
Proline W-6339	Cercospora, Ramularia, Mehltau		0	0.6 l/ha								
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		0	2 l/ha		14						

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial