


Birne Nützlinge

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Knospenschwellen												
Curenox 50 WG W-6556	Schorf des Kernobstes	51	1	1.4 KG	1.4 kg							
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Gallmilben	51	1	8 kg/ha	8 kg							
Austriebsspritzung												
Curenox 50 WG W-6556	Schorf des Kernobstes	53	1	1 kg/ha	1 kg							
+ Parafol netto W-1454-2	Napfschildläuse, Austernschildläuse, Rote Spinne, Gallmilben, Frostspanner	53	1	40 l/ha	40 l							
2. Vorblütenbehandlung												
Delan WG BASF W-6060	Schorf	54	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Gallmilben	54	1	8 kg/ha	8 kg							
+ Borstar Landor		54	1	1 - 1 l/ha	1 l							

Birne Nützlinge



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Vorblütenbehandlung Schädlinge												
+ Dipel DF W-6777	Schalenwickler	57	1	1.6 kg/ha	1600 g						Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.	
Rote Knospe/Ballon											Wasseraufwandmenge: 800 l/ha	
Argolem netto W-5497-1	Birnenblütenbrand	59	1	8 kg/ha	8 kg						2-4 Behandlungen im Abstand von 5 Tagen, empfohlene Brühemenge 800 l/ha.	
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Gallmilben	59	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
+ Borstar Landor		59	1	1 l/ha	1 l							
Zentralblüte geöffnet											Wasseraufwandmenge: 800 l/ha	
Argolem netto W-5497-1	Birnenblütenbrand, Schorf, Mehltau	61	1	8 kg/ha	8 kg						2-4 Behandlungen im Abstand von 5 Tagen, empfohlene Brühemenge 800 l/ha.	
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	61	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
evtl. LMA W-6925	Feuerbrand, Birnenblütenbrand	61	1	10 kg/ha	10 kg						Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
Vollblüte											Wasseraufwandmenge: 800 l/ha	
Argolem netto W-5497-1	Birnenblütenbrand, Schorf, Mehltau	65	1	8 kg/ha	8 kg						2-4 Behandlungen im Abstand von 5 Tagen, empfohlene Brühemenge 800 l/ha.	
Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	65	1	3.2 kg/ha	3.2 kg							
Borstar Landor		65	1	1 l/ha	1 l							
Feuerbrand												
BlossomProtect Kombi Pack W-6533	Feuerbrand		1	1.5 kg/ha	1.5 kg						BlossomProtect ist gemeinsam mit BufferProtect oder BufferProtect NT anzuwenden. Einsatz am Tag vor errechnetem Blüten-Infektionstag. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Infektionstagen muss die Behandlung alle 2 Tage wiederholt werden, so lange neu Blüten aufgehen.	
+ Buffer Protect	Feuerbrand		1	6 kg/ha	6 kg							
oder LMA W-6925	Feuerbrand		1	20 kg/ha	20 kg						am errechneten Infektionstag	

Birne Nützlinge



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Verwirrung Aufhängen												
Abblühen												
Faban BASF W-7213	Schorf	69	1	1.2 l/ha	1.2 l			G20 B6	1P			
+ Flint Bayer W-5994	Birnengitterrost, Schorf, Echter Mehltau	69	1	160 g/ha	0.16 kg	21	S2 + Sh	G50 W3			Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Calstar		69	1	6 l/ha	6 l							
AminoCare Plus		69	1	2 l/ha	2 l							
Nützlinge gegen Birnblattsauger ausbringen Insektizide anpassen												
Anthopak			1	2000 Stk/ha	2000 Stk						ab 10°C	

Birne Nützlinge



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Nachblüte												
Delan WG BASF W-6060	Schorf	71	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Slick Syngenta W-5056	Birnengitterrost, Echter Mehltau, Schorf, Blüten- und Zweigdürre	71	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Echter Mehltau	71	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	71	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
AminoCare Plus		71	1	2 l/ha	2 l							
3. Nachblüte Ende Mai/Anfang Juni, 1. AW Behandlung												
Delan WG BASF W-6060	Schorf	73	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Strobby WG BASF W-5460	Schorf, Echter Mehltau	73	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	73	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ Calstar		73	1	6 l/ha	6 l							
+ AminoCare Plus		73	1	2 l/ha	2 l							

Birne Nützlinge

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fruchtausdünnung												
Maxcel Omya W-6529-1	Fruchtausdünnung	73	1	6 l/ha	6 l							
1. Sommerspritzung ca. 10.-15.Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf des Kernobstes	74	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Birngitterrost, Echter Mehltau, Schorf	74	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Echter Mehltau	74	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	74	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
2. Sommerspritzung 20-25. Juni												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	75	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Baxoda netto		75	1	3 kg/ha	3 kg							
+ Calstar		75	1	6 l/ha	6 l							
3. Sommerspritzung ca. 1. Juliwoche												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	77	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Baxoda netto	Mehltau	77	1	3 kg/ha	3 kg							
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	77	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
4. Sommerspritzung ca. 5 Wochen vor Ernte												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	81	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Baxoda netto	Mehltau	81	1	3 kg/ha	3 kg							
+ Calstar		81	1	6 l/ha	6 l							

Birne Nützlinge




Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Erntespritzung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	81	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
Moon Privilege W-6828	Lagerkrankheiten	81	1	0.32 l/ha	0.32 l	14					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Calstar		81	1	6 l/ha	6 l							
2. Erntespritzung												
Moon Privilege W-6828	Lagerkrankheiten	85	1	0.32 l/ha	0.32 l	14					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Calstar		85	1	6 l/ha	6 l							
Nacherntebehandlung												
Kumulus WG W-4458	Schorf des Kernobstes, Rostmilben, Echter Mehltau des Apfels/der Birne		1	8 kg/ha	8 kg							
+ Harnstoff 46% geprillt Landor			1	15 kg/ha	15 kg							
+ Zink 700 SC Lebosol			1	1 l/ha	1 l							
+ Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

Berater **Wolfram Lempp**
 Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Austriebsspritzung												Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha
Curenox 50 WG W-6556	Schorf	51	1	2.4 kg/ha	2.4 kg						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Parafof netto W-1454-2	Napfschildläuse, Austernschildläuse, Rote Spinne, Gallmilben, Frostspanner	51	1	40 l/ha	40 l							
1. Vorblütenspritzung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Delan WG BASF W-6060	Schorf	53	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	53	1	4 kg/ha	4 kg							
Borstar Landor		53	1	0 l/ha								

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Vorblütenspritzung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Syllit W-7402-1	Schorf des Kernobstes	54	1	1.92 l/ha	1.92 l	60		G50	1P			
Wildbienen bestellen												
OSMIPRO Service			1	2 Stk/ha	2 Stk							
Pheromonfallen aufhängen												
Phero Delta Falle 1 ST			1	1 Stk/ha	1 Stk				erhältlich für Apfelwickler, kleiner Fruchtwickler, Schalenwickler, Fleckenminiermotte, Apfelglasflügler, Blausieb			
Rote Knospe												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Delan WG BASF W-6060	Schorf	57	1	0.8 kg/ha	0.8 kg			G50	1P	Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.		
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	57	1	4 kg/ha	4 kg							
Borstar Landor		57	1	1 l/ha	1 l							
evtl. Ethefon S W-3064	Blüten- und Fruchtausdünnung	57	1	0.3 l/ha	0.3 l				Aufbrauchsfrist: 31.12.2026			

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Rote Knospe Schädlinge mit Fungizide mischbar, Schadschwelle siehe Zielsortiment											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
+ Teppeki Omya W-6555-1	Blattläuse (Röhrenläuse)	57-59	1	0.16 kg/ha	160 g	21					Das Mittel darf nicht in Tankmischungen mit Netzmitteln oder ölhaltigen/auf Öl basierenden Pflanzenschutzmitteln ausgebracht werden. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
oder Gazelle SG W-6581	Blattläuse	57-59	1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe. evtl. Junganlagen wegen grüner Apfelblattlaus	
+ Zorro Omya W-7153	Apfelwickler, Schalenwickler	57-59	1	0.2 kg/ha	0.2 kg	21		G50			Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
oder Dipel DF W-6777	Schalenwickler, Frostspanner	57-59	1	1.6 kg/ha	1600 g						Nicht bei kaltem Wetter einsetzen.	
Zentralblüte geöffnet											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Faban BASF W-7213	Schorf, NW Kelchfäule	61	1	1.2 l/ha	1.2 l			G20	1P	B6		
+ Calstar		61	1	5 l/ha	5 l							
+ AminoCare Plus		61	1	2 l/ha	2 l							
Vollblüte											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Kelchfäule	65	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Flint Bayer W-5994	Botryosphaeria obtusa (Black rot)	65	1	240 g/ha	0.24 kg	21	S2 + Sh	G50	1P	W3	Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
Borstar Landor		65	1	1 l/ha	1 l							
Feuerbrand/Triebkürzung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Regalis Plus W-7110-1	Hemmung des Triebwachstums	65	1	1.25 kg/ha	1.25 kg			B6				

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Feuerbrand												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
LMA W-6925		65	1	20 kg/ha	20 kg							
oder BlossomProtect Kombi Pack W-6533	Feuerbrand	65	1	1.5 kg/ha	1.5 kg						Einsatz am Tag vor errechnetem Blüten-Infektionstag. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Infektionstagen muss die Behandlung alle 2 Tage wiederholt werden, so lange neu Blüten aufgehen. Kann bei empfindlichen Sorten zu einer Mehrberostung der Früchte führen.	
Ende der Blüte												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Faban BASF W-7213	Schorf	69	1	1.2 l/ha	1.2 l				G20	1P		
+ Sercadis BASF W-7134	Schorf	69	1	0.21 l/ha	0.21 l	35			G20		● Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evtl. Gazelle SG W-6581	Sägewespen	69	1	0.24 kg/ha	240 g				G20	1P		
AminoCare Plus		69	1	2 l/ha	2 l							
Ethefon S W-3064	Blüten- und Fruchtausdünnung	69	1	0.3 l/ha	0.3 l						Aufbrauchsfrist: 31.12.2026	
Verwirrung Aufhängen												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Nachblüte												
Wasseraufwandmenge: 400 l/ha												
Delan WG BASF W-6060	Schorf des Kernobstes	71	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
+ Slick Syngenta W-5056	Echter Mehltau, Schorf,	71	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Echter Mehltau	71	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
+ AminoCare Plus		71	1	2 l/ha	2 l							
Ausdünnung												
Rhodofix W-3003	Blüten- und Fruchtausdünnung		1	3 kg/ha	3 kg	10						
+ Maxcel Omya W-6529-1	Fruchtausdünnung		1	5 L	5 l							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
bei Bedarf gegen Schädlinge Schadschwellen siehe Zielsortiment											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Movento SC W-6742	Blutlaus	71	1	2 l/ha	2 l	21						
oder Movento SC W-6742	Schildläuse, Läuse, Spinnmilben	71	1	1.44 l/ha	1.44 l	21						
oder Agroneem netto W-5351-7	Blattläuse (Röhrenläuse)	71	1	3.2 - 4 l/ha	4 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Keine Wirkung auf Apfelgraslaus. Spritzabstand zu Dithianon und Captan Produkten beachten	
evtl. Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)	71	1	0.24 kg/ha	240 g	21		G20	1P		Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der selben Wirkstoffgruppe.	
oder Quassan W-5201	Sägewespe, Miniermotten, Blattläuse	71	1	3 - 4 l/ha	4 l						10 Tage nach Flugbeginn Pfennigminiermotten einsetzen	
evtl. Teilwirkung gegen Schädlinge und Pilze, Pflanzenstärkung, gegen Vogelfrass		71	1	1 l/ha	1 l						Teilwirkung gegen Schädlinge und Pilze, Pflanzenstärkung, gegen Vogelfrass	

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
3. Nachblütenspritzung Ende Mai/Anfang Juni, 1. Wickler Bekämpfung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Delan WG BASF W-6060	Schorf	73	1	0.48 kg/ha	0.48 kg			G50	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. bei Tobi Lieferanten bis 30. 05. bei frühen Sorten bzw, 15.06. bei späten Sorten	
oder Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	73	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20			bei Tobi Lieferanten ab 01.06. bei frühen Sorten bzw. 16.06. bei späten Sorten	
+ Stroby WG BASF W-5460	Mehltau, Schorf	73	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evtl. Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	73	1	4 kg/ha	4 kg							
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	73	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
oder Affirm W-6748	Kleiner Fruchtwickler, Apfelwickler, Schalenwickler	73	1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	

Apfel 2026

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Sommerspritzung ca. 10.-15.Juni											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	74	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Slick Syngenta W-5056	Mehltau, Schorf	74	1	0.24 l/ha	0.24 l	21		G20		●		
+ Topas Vino W-4260	Mehltau	74	1	0.2 l/ha	0.2 l	21	S2 + Sh	B6				
evtl. Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	74	1	4 kg/ha	4 kg							
+ Affirm W-6748	Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner FW	74	1	3.2 kg/ha	3.2 kg	21		G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	
oder Zorro Omya W-7153	Apfelwickler, Schalenwickler, NW kleiner Fruchtwickler	74	1	0.2 kg/ha	0.2 kg	21		G50			Aufbrauchsfrist: 01.01.2027	
evtl. Calstar		74	1	5 l/ha	5 l							
Blutlaus nach Bedarf In die Wärme Spritzen, Temperatur ab 15 °C											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Pirimor Syngenta W-1899	Blutlaus	71-77	1	0.64 kg/ha	640 g	21		G50 B20	1P	●		
+ Etalfix Pro W-6458	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	71-77	1	0.2 l/ha	0.2 l			G6				
2. Sommerspritzung 20.-25.Juni											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	75	1	2.4 kg/ha	2.4 kg	21		G20				
+ Kumulus WG W-4458	Schorf, Mehltau	75	1	1.5 kg/ha	1.5 kg							
evtl. Calstar		75	1	5 l/ha	5 l							

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
3. Sommerspritzung ca. 1. Juliwoche												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	77	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Stroby WG BASF W-5460	Schorf, Mehltau	77	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Affirm W-6748	Kleiner FW, Apfelwickler, Schalenwickler	77	1	3.2 kg/ha	3.2 kg			G50 B100 P3	1P		Nur in Obstanlagen gemäss Art. 22 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (SR 910.91, LBV).	
PK Max Lebosol	bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit	77	1	5 l/ha	5 l							
4. Sommerspritzung ca. Mitte Juli												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf	77	1	1.6 kg/ha	1.6 kg	21		G20				
+ Stroby WG BASF W-5460	Schorf, Mehltau	77	1	0.2 kg/ha	0.2 kg			G6			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	77	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ PK Max Lebosol	bessere Fruchtausfärbung, Erhöhung der Lagerfähigkeit	77	1	5 l/ha	5 l							
1. Lagerspritzung												Wasseraufwandmenge: 400 l/ha
Merpan 80 WDG PI I-2143	Lagerschorf, Lentizellenfäulnis	85	1	2 kg/ha	2 kg	21		G20				
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	85	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ Sapphire Syngenta W-5361	Lagerkrankheiten	85	1	0.4 kg/ha	0.4 kg	8		G20				
+ Calstar		85	1	0 l/ha								

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Lagerspritzung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
etvl. Merpan 80 WDG PI I-2143	Lagerschorf, Lentizellenfäulnis	85	1	2 kg/ha	2 kg	21		G20			Wartezeit beachten	
+ Madex Top W-6813	Apfelwickler	85	1	0.1 l/ha	100 ml	7						
+ Sapphire Syngenta W-5361	Lagerkrankheiten	85	1	0.4 kg/ha	0.4 kg	8		G20		●		
+ Calstar		85	1	0 l/ha								
1. Nacherntebehandlung												
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf		1	2 kg/ha	2 kg	21		G20				
+ Curenox 50 WG W-6556	Schorf		1	0.3 KG	0.3 kg						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Harnstoff 46% geprillt Landor			1	10 kg/ha	10 kg							
+ Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
2. Nacherntebehandlung											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Merpan 80 WDG PI I-2143	Schorf		1	2 kg/ha	2 kg	21		G20				
+ Curenox 50 WG W-6556	Schorf		1	0.3 KG	0.3 kg						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Harnstoff 46% geprillt Landor			1	10 kg/ha	10 kg							
+ Zink 700 SC Lebosol			1	0.5 l/ha	0.5 l							

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial