


Eiweisserbsen 2025

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Variante Herbizid VA												
Bandur Bayer W-6149	Unkräuter, Ungräser	00-09	1	3 l/ha	3 l			G20	2P			
2. Variante Herbizid VA												
Clomastar PI F-6013	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	00-09	1	0.2 - 0.25 l/ha	0.25 l						Aufwandmenge in Abhängigkeit von der Bodenart; Sand-Ton	
+ Bandur Bayer W-6149	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	00-09	1	2.25 - 3 l/ha	3 l			G20	4P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Niedrige Aufwandmenge nur in Tankmischung gemäss den Angaben der Bewilligungsinhaberin.	
1. Variante Herbizid NA ohne Bentazon												
Stomp Aqua BASF W-6880	Unkräuter, Ungräser	10-14	1	0.9 l/ha	0.9 l							
+ Bolero BASF W-6099	Unkräuter	10-14	1	0.5 - 0.8 l/ha	0.8 l							
+ Bandur Bayer W-6149	Unkräuter, Ungräser	10-14	1	0.5 - 0.8 l/ha	0.8 l			G20	2P			

Eiweisserbsen 2025



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Fläche 1 ha		Datum		
											Auflagen / Bemerkungen				
2. Variante Herbizid NA Produkte MIT Wasserschutzgebietsauflage															
Stomp Aqua BASF W-6880	Unkräuter, Ungräser	10-14	1	0.9 l/ha	0.9 l										
+ Bolero BASF W-6099	Unkräuter	10-14	1	0.7 l/ha	0.7 l										
+ Basagran SG BASF W-5320	Unkräuter	10-14	1	0.7 kg/ha	0.7 kg		S2 + Sh + Karst	B3							
Insektizid															
Karate Zeon W-6098	Erbsenraupen, Erbsenblattrandkäfer	12-14	1	0.075 l/ha	0.075 l		G20					nur mit Sonderbewilligung			
												SPe 8: Gefährlich für Bienen - Darf nur außerhalb des Bienenfluges am Abend mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind.			
Korrektur Gräser															
Fusilade Max W-6085	Ungräser		1	1.5 - 3 l/ha	3 l		42								
Blattläuse															
Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.15 kg/ha	150 g		14		1P			Max. 1 x			
Fungizid															
Horizont W-5468	Graufäule (Botrytis cinerea), Rost der Erbse, Brennfleckenkrankheit der Erbse	60-70	1	1 l/ha	1 l		21					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. ab Blühbeginn			
Moon Sensation W-6961	Graufäule (Botrytis cinerea), Sclerotinia-Fäule	60-70	1	0.8 l/ha	0.8 l		14	S2 + Sh	G20	1P		Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Wartefrist 2 Wochen			

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial