


Erbsen 2026

Variante Standart

Fläche 0 ha



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Sklerotinia												
Lalstop Contans WG W-7498	Sclerotinia-Fäule	Vorsaat	0	4 kg/ha							Anwendung vor Saat: Nach der Anwendung sofort in den Boden einarbeiten!	
Herbizid (+ Blattrandkäfer) Pendimethalin SA-400 SC mischbar mit Stomp aqua												
Pendimethalin SA-400 SC W-7097	Unkräuter, Ungräser	12-14	0	1 l/ha						●		
+ Bandur Bayer W-6149	Unkräuter, Ungräser	12-14	0	0.5 l/ha				G20	2P	●	Bandur kann Aufhellungen verursachen, nicht überspritzen!	
+ Basagran SG BASF W-5320	Unkräuter	12-14	0	0.6 kg/ha			S2 + Sh + Karst	B3			Max. 960gr/ha Bentazon in 2 Jahren auf derselben Parzelle. Achtung: bei Nachbau Bohnen!	
+ev. Karate Zeon PI F-4040	Blattrandkäfer	12-14	0	0.1 l/ha		7		G20		●	Sonderbewilligung erforderlich!	
Herbizid ohne Bentazon S2 (+ Blattrandkäfer) Pendimethalin SA-400 SC mischbar mit Stomp aqua												
Pendimethalin SA-400 SC W-7097	Unkräuter, Ungräser	10-14	0	1 l/ha						●		
+ Bandur Bayer W-6149	Unkräuter, Gräser	10-14	0	0.5 l/ha				G20	2P	●	Bandur kann Aufhellungen verursachen, nicht überspritzen!	
+ Bolero BASF W-6099	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	10-14	0	0.5 l/ha				B3		●		
+ev. Karate Zeon W-6098	Blattrandkäfer	10-14	0	0.1 l/ha		7		G20		●	Sonderbewilligung erforderlich!	

Erbsen 2026



Variante Standart

Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Korrektur Gräser												
Select Stähler W-6010	Gräser / Hirsen	30	0	0.5 l/ha			S2 + Sh	B6			Maximal 1 Behandlung pro Kultur.	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	30	0	0.5 l/ha								
Blattläuse Kontrolle auf Blattläuse ab Vorblüte!												
Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse		0	0.15 kg/ha		7			1P	●	Kontrolle ab Vorblüte! Max. 2 Behandlungen!	
+ Borstar			0	2 l/ha								
Falscher Mehltau / Brennflecken												
Priori Top W-6461	Brennfleckenkrankheit der Erbse, Falscher Mehltau der Erbse		0	1 l/ha		7			2P	●		
Revus Syngenta W-6509	Falscher Mehltau		0	0.6 l/ha		14					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von 10 Tagen.	
Sufrostar	Brennflecken		0	3 l/ha								
Korrektur Winden / Disteln												
MCPB 400 Schneiter W-5165	Winden		0	3.5 - 4 l/ha		21					Behandlung vor der Blüte!	
Kartoffelkäfer												
Gazelle SG W-6581	Kartoffelkäfer		0	0.1 kg/ha		14					Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
Erbsenwicklerfallen												
Erbsenwicklerfalle 1 ST			0	1 Stk/ha								
+ Erbsenwickler Pheromon			0	2 Stk/ha								
Erbsenwickler												
Decis Protech W-6381	Erbsenwickler		0	0.5 l/ha		14		G50	1P		Nach Aufrauf von Anbauleiter! Keine SoBe erforderlich. Max. 2 x mit diesem Produkt.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen

Erbsen 2026

Variante Standart

Fläche 0 ha



Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial