


Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schadereger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Beizung beim Kartoffellegen												
Sercadis BASF W-7134	Rhizoctonia-solani-Krankheit		0	0.5 l/ha							● Beim Legen auf die Knolle sprühen. Bei Furchenbehandlung vor und auf die Knolle ist 0.8 lt/ha möglich.	
+ Symbac netto	Teilwirkung Rhizoctonia Solani, Förderung des Wurzelwachstums		0	0.5 l/ha								
Herbizid Vorauflauf												
Boxer PI D-7296			0	2.5 l/ha								
+ Bandur Bayer W-6149	Ungräser und Unkräuter		0	2 l/ha				G20	3P	●	nur im Vorauflauf verwenden	
+ Sencor SC W-6630	Ungräser und Unkräuter		0	0.5 l/ha						1P	●	
Korrektur Gräser und Hirsen												
Select Stähler W-6010	Hirsen, Gräser		0	0.5 - 1 l/ha			S2 + Sh	B6			vor Reihenschluss anwenden. Keine zu späten Spritzungen.	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	1 l/ha							nur bei Solo-Anwendung dazugeben	
Korrektur Winden												
Titus Stähler W-4701	Winden, Hirsen		0	40 g/ha							Ca. 20 cm Staudenhöhe	
+ Boxer PI D-7296	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)		0	3 - 4.5 l/ha						1P		

Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha

Produkt	Schadereger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 1												
Polyram DF BASF W-2935	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	2.5 - 3 kg/ha							Aufbrauchsfrist: 01.07.2025	
oder Shirlan PI D-3844	Alternari, Kraut und Knollenfäule		0	0.4 l/ha		14		G20	4P			
+ Cymoxanil WG Schneiter W-6693	Kraut- und Knollenfäule, Alternaria		0	0.25 kg/ha		21					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Patastar Plus Landor			0	5 l/ha							Phosphor Blattdüngung zur Förderung des Knollenansatzes	
Fungizid 2												
Infito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●		
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14						
+ Patastar Plus Landor			0	5 l/ha							Phosphor Blattdüngung zur Förderung des Knollenansatzes	
Fungizid 3												
Revus Top PI F-5399	Alternaria spp., Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14			1P	●		
+ MagMan Plus			0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha								
Fungizid 4												
Infito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh			●	Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. max. 4 Behandlungen	
+ MagMan Plus			0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha							zur Stärkung der Pflanzen	
evt Calstar	Teilwirkung gegen Eisenflecken		0	4 l/ha							Bei anfälligen Sorten: Lady Rosetta, Lady Christl, Chalenger, Charlotte, Laura, Gourmandine, Erika, Venezia, Victoria, Markies, Belmonda	

Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha

Produkt	Schadereger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 5												
Revus Top PI F-5399	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14				1P	●	
+ Bor 150 Lebosol	Aufbau der Zellwandstruktur, innere Qualität und Stärke		0	2 l/ha								
+ Yukan netto	Pflanzenstärkung		0	1 l/ha							zur Stärkung der Pflanzen	
Fungizid 6												
Infito W-6706	Kraut- und Knollenfäule		0	1.6 l/ha		21	S2 + Sh				● Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. Max. 4 x	
+ Calstar	Teilwirkung Eisenflecken		0	4 l/ha							Bei anfälligen Sorten: Lady Rosetta, Lady Christl, Challenger, Charlotte, Laua, Gourmandine, Erika, Venezia, Victoria, Markies, Belmonda	
+ Sulfomag			0	0 l/ha							Magnesium und Schwefel fördert die Photosynthese und Stärke	
Keimverhinderung/ Durchwuchs												
Itcan SL 270 W-6933	Verhinderung von frühzeitiger Keimung am Lager und Kontrolle der Durchwuchskartoffeln		0	11 l/ha		21		W3			Anwendung ab einer Knollengröße von: 25 mm bei festkochenden Sorten 35 mm bei mehligkochenden- und Industriesorten Nicht bei Temperaturen über 25°C anwenden, 24 h kein Regen nach der Applikation Nur solo anwenden!	
Fungizid 7												
Revus Top PI F-5399	Alternaria., Kraut- und Knollenfäule		0	0.6 l/ha		14				1P	●	
+ Sulfomag			0	3 l/ha								
Fungizid 8												
Eleto W-7205	Kraut- und Knollenfäule		0	1 l/ha		21		G6	1P		Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
+ Signum BASF W-6994	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit		0	0.2 kg/ha		14						

Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Fungizid 9												
Shirlan PI D-3844	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	0.4 l/ha		14		G20	4P			
+ Cymoxanil WG Schneider W-6693	Kraut- und Knollenfäule, Alternaria		0	0.25 kg/ha		21					Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.	
Fungizid 10												
Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					max. 3 Behandlungen Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist	
oder Shirlan PI D-3844	Alternaria, Kraut- und Knollenfäule		0	0.4 l/ha		14		G20	4P			
Krautfäule Abstopp - Spritzung												
Sporex W-7534-1	Kraut- und Knollenfäule		0	0.25 kg/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. ist identisch mit Cymoxanil WG von Schneider	
+ Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. max. 3 Behandlungen	
Schnecken 1. Behandlung vor Reihenschluss												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken		0	5 - 7 kg/ha								
1. Kartoffelkäfer												
Audienz Omya W-6020	Kartoffelkäfer		0	0.05 l/ha		21					Schadschwelle: 1 -2 Herde/ a Max. 2 x	
+ Silwet L 77 W-6406	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.1 l/ha							nur bei Solo-Anwendung dazugeben	
2. Kartoffelkäfer mit Sonderbewilligung												
Coragen PI D-6566	Kartoffelkäfer		0	60 ml/ha		14						
+ Silwet L 77 W-6406	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.1 l/ha							nur bei Solo-Anwendungen dazugeben	

Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Blattläuse u. Kartoffelkäfer mit Sonderbewilligung												
Gazelle SG W-6581	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.2 kg/ha							braucht Sonderbewilligung Schadschwelle: 10 Läuse/ Fiederblatt Erfasst auch Kartoffelkäfer: Schadschwelle 1-2 Herd/are Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
oder Mospilan SG PI D-4866	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.2 kg/ha							braucht Sonderbewilligung Schadschwelle: 10 Läuse/ Fiederblatt, Erfasst auch Kartoffelkäfer: Schadschwelle 1-2 Herd/a Max. 1 x	
Blattläuse												
Movento SC W-6742	Blattläuse (Röhrenläuse)		0	0.75 l/ha		14					ohne Sonderbewilligung möglich Schadschwelle: 10 Läuse/ Fiederblatt, Max. 2 x	
Abbrennen von abreifenden Stauden												
Firebird Plus W-7340	Desikkation, Abbrennen		0	2 l/ha				G20 B20	3P		am Vormittag in den abgehenden Tau spritzen Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					Max. 3 x.Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist	
+ Mero W-6720	Verbesserung der Brennwirkung		0	2 l/ha							oder Parafol 2 lt (noch nicht bewilligt) hat noch bessere Brennwirkung	
2. Behandlung 7 Tage später												
Firebird Plus W-7340	Desikkation, Abbrennen		0	2 l/ha				G20 B20	3P		am Vormittag in den abgehenden Tau spritzen Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
Mero W-6720	Verbesserung der Brennwirkung		0	2 l/ha							Parafol 2 lt brennt noch stärker, nur in Saatkartoffeln erlaubt	
oder Spotlight Plus Ewia PI I-6117			0	0 l/ha								

Speise- und Industriekartoffeln 2025



Fläche 0 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schlegeln u. Abbrennen innerhalb von 24h												
Firebird Plus W-7340	Desikkation, Abbrennen		0	2 l/ha				G20 B20	3P		am Vormittag in den abgehenden Tau spritzen Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
oder Spotlight Plus Ewia PI I-6117	Desikkation, Abbrennen		0	1 l/ha							am Vormittag in den abgehenden Tau spritzen. Max. 2 x	
+ Ranman Top Leu Gygax W-6889	Kraut- und Knollenfäule		0	0.5 l/ha		14					Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. max. 3 Behandlungen	
oder Shirlan PI D-3844	Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Knollenfäule		0	0.4 l/ha		14		G20	4P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	2 l/ha							Parafol 2 lt brennt noch stärker, nur in Saatkartoffeln erlaubt	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial