

HOCHSTAMM KERNOBST / STEINOBST SPRITZPLAN 2026

Sprayer mit Hochstammaufsatz _____-fach



Fleischmann Pius
Hauptstrasse 26
8580 Sommeri
Natel 079 / 816 84 73
pius.fleischmann@omya.com

1-fache Brühmenge für Gun-Applikation
2-3-fache Brühmenge für Sprayer-Applikation

Stadium		Kernobst		Steinobst		Aufzeichnungs-Protokoll	
Mittel / Tankmischung		%, l, kg/ha		%, l, kg/ha			
Datum/Vis. Spritzung: WF: Pistol 21 Tage WF: Rest 1 Tag		Datum/Vis. Spritzung: WF: Pistol 21 Tage WF: Rest keine		Datum/Vis. Spritzung: WF: Pistol 21 Tage WF: Rest keine		Betriebsdaten Betriebs Nr.	
Datum der Unternutzung: Sprayer/Konz		Datum der Unternutzung: Sprayer/Konz		Datum der Unternutzung: Sprayer/Konz		Name / Vorname:	
1. Spritzung Mausehr-Rotknospe (Brühmenge)		1. Spritzung Mausehr-Rotknospe (Brühmenge)		1. Spritzung Mausehr-Rotknospe (Brühmenge)		PIZ / Ort:	
Funguran Flow (Schorf) 0,3% + Elosal Supra (Mehltau) 0,3% + Weissöl (Blattläuse, Milben) 1,0% + Pistol (Apfelblütenstecher) 0,02% (300 ml + 300 g + 1 l + 20 g / 100 l Wasser) (Funguran Flow mit Vitigran 35 austauschbar)		Funguran Flow (Schorf) 0,3% + Elosal Supra (Mehltau) 0,3% + Weissöl (Blattläuse, Milben) 1,0% + Pistol (Apfelblütenstecher) 0,02% (300 ml + 300 g + 1 l + 20 g / 100 l Wasser) (Funguran Flow mit Vitigran 35 austauschbar)		Funguran Flow (Schorf) 0,5% + Weissöl (Blattläuse, Milben) 2,5% + ev. Pistol (Blattläuse) 0,015% (500 ml + 2,5 l + 15 g / 100 l Wasser) (Funguran Flow mit Vitigran 35 austauschbar)		Anwender:	
Datum/Vis. Spritzung: (kaltes Wetter) WF: keine		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Gerät:	
2. Spritzung Rotknospe-beg. Blüte (Brühmenge)		2. Spritzung Rotknospe-beg. Blüte (Brühmenge)		2. Spritzung Rotknospe-beg. Blüte (Brühmenge)		Die Aufzeichnung der Spritzungen kann direkt im Plan vorgenommen werden. Notieren Sie folgendes: Brühmenge, Mittelmeng	
Espiro Plus (Schorf+Monilia) 0,075% + Elosal Supra (Mehltau) 0,3% + Funguran Flow (Schorf) 0,15% + Epso Bortop 0,5% + Complesal Microplant 0,1% + Harnstoff 0,5% (75 ml + 300 g + 150 ml + 500 g + 1 dl + 500 g / 100 l Wasser)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Beachten Sie die WF (Wartefrist) für den Unternutzen: Weitere Aufzeichnungen auf der Rückseite	
Datum/Vis. Spritzung: (kaltes Wetter) WF: keine		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Bemerkungen:	
3. Spritzung Rotknospe-beg. Blüte (Brühmenge)		3. Spritzung Blüte (Brühmenge)		3. Spritzung Blüte (Brühmenge)		Bewilligte Anwendungen / Konzentrationen von Fungiziden in Kernobst und Steinobst.	
Espiro Plus (Schorf+Monilia) 0,075% + Elosal Supra (Mehltau) 0,3% + Funguran Flow (Schorf) 0,05% + Epso Bortop 0,5% + Complesal Microplant 0,1% + Harnstoff 0,4% + ev. Ethephon 0,02% (75 ml + 300 g + 150 ml + 500 g + 1 dl + 500 g / 100 l Wasser)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kernobst Steinobst Captan (Schorf, Bitterfäule, Schrotschuss) 0,1% 0,1% Lumino (Schorf, Monilia, Schrotschuss) 0,015% 0,02% Pican (Mehltau) 0,031% nicht bewilligt	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Keine Insektizide während der Blüte!	
4. Spritzung Nachblüte (Brühmenge)		4. Spritzung Nachblüte (Brühmenge)		4. Spritzung Nachblüte (Brühmenge)		Bei allen Produkten mit der Einstufung «Gefährlich für Bienen» dürfen auch im Unternutzen keine blühenden Pflanzen sein	
Captan (Schorf, Mehltau) 0,10% + Lumino (Schorf, Mehltau) 0,015% + Pican (Mehltau) 0,031% + Complesal Microplant 0,1% + Epso Bortop/Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + ev. Ethephon 0,03% + ev. Pistol (Sägewespe / Läuse) 0,02% (100 g + 15 ml + 31 ml + 1 dl + 500 g + 400 ml + 30 ml / 100 l Wasser)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Pistol (Sägewespe / Läuse) 0,02% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml + 20 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Elosal Supra 0,2% + Microplant 0,1% + Epso Bortop 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Pistol (Sägewespe / Läuse) 0,02% (100 g + 20 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 400 ml + 20 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Die WF (Wartefrist) der Produkte hat auch dieselbe Gültigkeit auf den Unternutzen.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Kernobst:	
5. Spritzung 1. Apfelwickler 5.-10. Juni (Brühmenge)		5. Spritzung 1. Apfelwickler 5.-10. Juni (Brühmenge)		5. Spritzung 1. Apfelwickler 5.-10. Juni (Brühmenge)		Die Bekämpfung der Sägewespe ist in den wenigsten Fällen notwendig. Zur Lausbekämpfung (bei jungen Bäumen) kann Pirimicarb (0,04%), Tepecki (0,01%) oder Pistol (0,015%) der Tankmischung beigelegt werden.	
Captan (Schorf, Mehltau) 0,10% + Lumino (Schorf, Mehltau) 0,015% + Pican (Mehltau) 0,031% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 31 ml + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Pistol (Kirschenfliege + KEF) 0,02% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 ml + 20 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Pistol (Kirschenfliege + KEF) 0,02% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 ml + 20 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Steinobst:	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Bei Zwetschgen ist die Behandlung der Sägewespe empfehlenswert (Pistol) zugleich werden die Blattläuse erfasst.	
6. Spritzung 2. Apfelwickler 5.-10. Juli (Brühmenge)		6. Spritzung 2. Apfelwickler 5.-10. Juli (Brühmenge)		6. Spritzung 2. Apfelwickler 5.-10. Juli (Brühmenge)		Kernobst:	
Captan oder Phaltan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Die Wicklerbekämpfung 5-10. Juni ist sinnvoll. ev. 2. Wicklerbekämpfung nach 4 Wochen mit Zoro einplanen.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Steinobst:	
7. Spritzung Fäulnis + Marssonina (Brühmenge)		7. Spritzung Fäulnis + Marssonina (Brühmenge)		7. Spritzung Fäulnis + Marssonina (Brühmenge)		Die Kirschenfliegen-Behandlung (Pistol) ist nach 14 Tagen zu wiederholen. Für die Behandlung der Kirschessigfliege (KEF) ist Audienz (0,02% / 7 Tage WF) einzuplanen.	
Captan oder Phaltan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Microplant 0,1%, +Combipol 0,5%, +Harnstoff 0,4% (100 g + 12,5 g + 1dl + 500 g + 500 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Corsil» im Steinobst nicht bewilligt)		KEF-Behandlung Steinobst (Brühmenge)		KEF-Behandlung Steinobst (Brühmenge)		Kernobst:	
Audienz (Kirschessigfliege) 0,02% + Microplant 0,1% + ev. Aminocal 0,3% (allg. Verfügung 2026 für Zwetschgen noch offen)		Audienz (Kirschessigfliege) 0,02% + Microplant 0,1% + ev. Aminocal 0,3% (allg. Verfügung 2026 für Zwetschgen noch offen)		Audienz (Kirschessigfliege) 0,02% + Microplant 0,1% + ev. Aminocal 0,3% (allg. Verfügung 2026 für Zwetschgen noch offen)		Bei nasser Witterung (Juni-August) sind bei Marssonina-anfälligen Sorten (Boskoop, Jerseyred, Topas, Rubinola, Grafensteiner) die Spritzungen 5-7 wirksam und sinnvoll.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Steinobst:	
8. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		8. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		8. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Die Pflaumenwickler-Bekämpfung ist Zorro nach 14 Tagen zu wiederholen. (Die Notfallzulassung 2026 ist noch offen)	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kernobst (Tafelobst):	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 21 Tage		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
9. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		9. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		9. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kernobst (Tafelobst):	
10. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		10. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		10. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
11. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		11. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		11. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kernobst (Tafelobst):	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
12. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		12. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		12. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kernobst (Tafelobst):	
13. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		13. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		13. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
14. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		14. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		14. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kernobst (Tafelobst):	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
15. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		15. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		15. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kernobst (Tafelobst):	
16. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		16. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		16. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
17. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		17. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		17. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kernobst (Tafelobst):	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10% + Lumino (Monilia) 0,02% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Azolon Fluid 0,4% + Zorro (Pflaumenwickler) 0,019% (100 g + 20 ml + 1 dl + 500 g + 400 g + 17 g / 100 l Wasser) (Tankmischung auch im Kernobst bewilligt)		Bei der Produktion von Tafelobst sind die Spritzungen 4-7 sinnvoll. Zur Reduktion von Stippe ist Harnstoff mit Aminocal (0,5%) zu ersetzen.	
Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Datum/Vis. Spritzung: WF: 7 Tage		Kelpak (neu im Spritzplan 2026):	
18. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		18. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		18. Spritzung Zwetschgen ca. 12. + 26. Juli (Brühmenge)		Kelpak ist ein Algen-Dünger mit natürlichem Auxin. Kelpak fördert das Frucht- und Triebwachstum. Es reduziert frühen Fruchtfall und Stress bei Trockenheit.	
Captan (Schorf) 0,10% + Corsil (Mehltau) 0,0125% + Elosal Supra (Mehltau) 0,15% + Kelpak 0,2% + Epso Combipol 0,5% + Harnstoff 0,4% + ev. Zorro (Apfelwickler, Schalenw.) 0,0125% (100 g + 15 ml + 200 g + 1 dl + 500 g + 500 g + 12,5 g / 100 l Wasser) (Tankmischung «Zorro» im Steinobst nicht bewilligt)		Captan (Schrotschuss) 0,10					

Bemerkungen:

Aktuell gültiger Text-Auszug von Agroscope aus den «Pflanzenschutzempfehlungen für den Erwerbsobstbau 2020/2021»

Je nach Baumgrösse rechnet man zwischen 10 bis 30 Liter Brühmenge pro Hochstamm. (1-fache Brühmenge)
 Schutz vor Vieh- und Milchvergiftungen. Es darf kein Gras verfüttert werden, das Verunreinigungen von Spritzmitteln aufweist. Solches Gras ist nicht nur geschmacklich beeinträchtigt, sondern auch hygienisch und gesundheitlich bedenklich. Werden Obstbäume oder Obstanlagen mit Unternutzung mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, so gilt für die Beweidung und den Schnitt die Wartefrist für bewilligte Herbizidbehandlungen auf Weiden und Wiesen beziehungsweise die Wartefrist für die Obsternte für ins Laub applizierte Pflanzenschutzmittel.

Ration Sticks

Gebrauchsfertige Köder-Sticks für die gezielte und nachhaltige wirksame Wühlmaus-Bekämpfung. Sehr effektiver Wirkstoff, neu in der Schweiz. Für die Anwendung im Freiland.



aktueller Bewilligungsstand (BLW / SAIO) vom 27.10.2025

	Abstand zu Oberflächengewässer			Einschränkungen (BLW / Agroscope)	Warte- fristen	gefährlich
Pflanzenschutzmittel	0. -Punkt Massnahme	1. - Punkt Massnahme	2. - Punkt Massnahmen			
Vitigran 35	6 m	6 m	6 m	Saio-Vorschriften: KO: 1.5 kg Reinkupfer/Jahr SteinO: 4 kg Reinkupfer/Jahr		-
Funguran Flow	6 m	6 m	6 m			-
Elosal Supra	6 m	6 m	6 m	max. 5 kg/ha/ Spritzung		-
Captan WDG	20 m	6 m	6 m	max. 10x / Jahr (Captan-haltige Produkte)	3 Wo	-
Phaltan 80 WDG	20 m	6 m	6 m	nicht in Birnen bewilligt	3 Wo	-
Norec (Delan Pro)	20 m	6 m	6 m	max. 3400 g Dithanon 2 Punkte für Abschwemmung	5 Wo	-
Espiro Plus (Anilino)	20 m	6 m	6 m	max. 3x/Jahr bis ende Blüte		-
Lirus (Delan WG)	50 m	20 m	6 m	Kernobst nur bis 30. Juni max. 3.4 kg Wirkstoff/ha/ab Blüte	3 Wo	-
Pican	6 m	6 m	6 m	max. 2x/Jahr	3 Wo	-
Corsil (Strobilurine)	6 m	6 m	6 m	max. 4x/Jahr (bis 31. Juli)	3 Wo	-
Vitisan	6 m	6 m	6 m		8 Tg	-
Armicarb / Vitisan	6 m	6 m	6 m		8 Tg	-
Funga (Grundstoff)	Funga ist kein PSM und hat somit wenig Auflagen. (Natriumhydrogenkarbonat)				1 Tag	-
Lumino (SSH)	20 m	6 m	6 m	SSH: max. 4x/Jahr / bis 31. Juli In Tankmischung Delan/Captan	3 Wo	-
Sercadis (SDHI)	20 m	6 m	6 m	max. 3x/Jahr aus SDHI-Gruppe	5 Wo	-
Moon Privilege (SDHI)	20 m	6 m	6 m	max. 3x/Jahr aus SDHI-Gruppe	2 Wo	-
Syllit	6 m	6 m	6 m	max. 2x/Parzelle/Jahr	60 Tg	-
Weissöl Omya	6 m	6 m	6 m			-
Zorro	50 m 100 m	20 m 50 m	6 m 20 m	max. 2 Behandlungen/Jahr (in Birnen „300 g/ha“ = 100 m)	3 Wo	Ja
Teppeki	6 m	6 m	6 m	max. 2 Behandlungen/Jahr	3 Wo	Ja
Pirimicarb	50 m	20 m	6 m	max. 2 Behandlungen/Jahr	3 Wo	Ja
Audienz	20 m	6 m	6 m	max. 4 Behandlungen/Jahr	3 Wo	Ja
Madex Top / Carpovirusine Evo 2	6 m	6 m	6 m	8-10 Tage Wirkungsdauer	7 Tg	-
Pistol (Gazelle SG)	20 m	6 m	6 m	max. 2 Behandlungen/Jahr	3 Wo	-
Glyphosat-Produkte	6 m	6 m	6 m	bis 31. August bewilligt		-
Plüsstar	6 m	6 m	6 m	Keine Applikation mit Hand-/Rückenspritze		-
Firebird Plus	20 m	6 m	6 m	max. 2 Behandlungen/Jahr		-

Aktueller Stand der Bewilligungen 20.01.2026

 Produkt	Bewilligte Kulturen					Wirkungsweise / Wirkungseigenschaften					Wirkungsspektrum					Bemerkungen
	Äpfel	Birnen	Kirschen	Zwetschgen	Aprikosen	kontakt / systemisch lokalsystemisch	Kurativ auf Schorf (rückwirkend)	Geschützter Neuzuwachs	Regenbeständig nach	Regenbeständigkeit (mm)	Schorf	Echter Mehltau	Monilla	Kelchfäule	Weitere Fungizidwirkung	● bewilligt ○ Nebenwirkung
Vitisan/Armicarb	●	●	●	●	●	k	-	-	1 h	20	○	●	○		○	
Lumino (Slick)	●	●	●	●	●	k/l/s	3-4 Tage	Ja	3 h	40	●	●	●		●	warmes Wetter nur in Tankmischung mit Delan oder Captan
Captan WDG	●		●	●	●	k	-	kein	2 h	35	●				●	
Phaltan 80 WDG	●		●	●	●	k	-	kein	2 h	35	●			●	●	
Lirus, Delan WG	●	●	●	●		k	-	kein	2 h	40	●	○			○	max. 6 x / Jahr
Norec	●	●				k/s	-	Ja	3 h	60	●					
Syllit	●	●				k/l/s	1 Tag	Kein	2 h	80	●				●	Kontakt mit Tiefenwirkung
Espiro Plus	●	●				k/l/s	2-3 Tage	teil	3 h	50	●		●	●	●	Neue Formulierung, enthält bereits den Kontaktwirkstoff
Pican	●	●				k/l/s	ja	teil	3 h	50		●				Einsatz bereits ab Rotknospe sinnvoll. Gute Mischbarkeit
Corsil (Strobilurine)	●	●				k/l/s	1-2 Tage	teil	3 h	50	●	●				Corsil im Sommer bis 31. Juli auf Mehltau einplanen
Sercadis (SDHI)	●	●				k/l/s	-	teil	3 h	50	●	●	●	○	●	Witterung 8-28°C mit Kontaktwirkstoff mischen
Elosal supra	●	●	●	●		k	-	kein	2 h	30	○	●			●	
Vitigran 35	●	●	●	●	●	k	-	kein	2 h	30	●				●	
Funguran Flow	●	●	●	●	●	k	-	kein	2 h	35	●				●	

Lirus (W-6060-5)	Kontaktfungizid	<i>(identisches Produkt wie Delan WG)</i>
Kudos (W7620-1)	Phytohormon	<i>(moderne Formulierung von Regalis Plus)</i>

Zorro	(Aufbrauchfrist 01.01.2027)	Movento SC	Aufbrauchfrist. 30.06.2027)
Capex 2	(Aufbrauchfrist 01.07.2026)	Ruman, Asulam, Asulox, (Aufbr. 01.07.2026)	
Alle Produkte mit dem Wirkstoff Ethephon (prov. Aufbrauchfrist bis 31.12.2026)			

Sythane C + Max / Cercobin / **Frupica SC / Bion**
 Reldan 22 / Alanto / Mimic HG / Envidor / Prodigy / Arabella / Steward / **Apollo / Vertimec Gold**
 Paloka / Basta 150 / Barala (Reglone) / Surflan
 Arvicolon 200 CT / Polytanol / Mauskiller U2

➔ **Der Einsatz von Produkten nach deren Aufbrauchfristen ist verboten!!!**

[illegible]