

Gerste – Spritzplan 2025



| | Problem / Zeitpunkt | Wirkungs-Schwerpunkte | Produkt | Bedarf / ha | Bedarf | Bemerkung |
|--------|---|-------------------------------|-----------------|--------------|--------|---|
| | (Winter-) Gerste (konventionell) _____ ha | | | | | |
| Herbst | Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Aduka | 0.6 l | | Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen. |
| | | unterstützt die Gräserwirkung | + Arlit | + 1-2 l | | |
| | Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Trinity* | 2 l | * | Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung. |
| | | unterstützt die Gräserwirkung | + Arlit | + 1-1.5 l | | |
| | Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Trinity* | 2 l | * | |
| | | inkl. Raigras-Horste | + Grant | + 0.9 l | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Frühjahr - Herbizid | Korrektur-Behandlungen oder Frühjahr-Strategien siehe bei Extenso-Varianten (min. 5 Tage Abstand zum Verkürzen) | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------|---------------|---|--|
| ❶ | 1-Fungizid-Strategie | Blatt- / Ährenkrankheiten | Bronco Top * | 2 l | * | Fahnenblatt (bevor Grannen / Ähre sichtbar) |
| | | Blatt- / Ährenkrankheiten | oder Casac | oder 1 l | | |
| | | Halmverstärkung | + Elotin | 0.75 l | | |
| 1 | Fungizid mit Halmverkürzung | Blattkrankheiten + Mehltau | Bronco Top | 2 l | * | 1-Knoten-Stadium <i>bei Temperaturen: tags >12-14° nachts > 8°</i> |
| | | Halmverkürzung | + Milo | 0.5 l | | |
| | | Halmverkürzung | + Elotin | 0.4 l | | |
| 2 | Fungizid mit Ährenstielverkürzung | Blatt- / Ährenkrankheiten | Casac | 1 l | | Fahnenblatt (bevor Grannen / Ähre sichtbar) |
| | | Halmverstärkung | + Elotin | 0.75 l | | |
| Zu jeder Fungizid-Spritzung (trockener Bestand) 3 l Sulfix + 5 kg Combitop zugeben | | | | | | Bei Temperaturen < 23° |
| ❶ | = 1-Fungizid-Strategie nur für standfeste Sorten | | | | | |
| 1 + 2 | = 2-Fungizid-Strategie (mit Halmverkürzung) für alle ertragreichen Sorten, die zur Lagerfrucht neigen. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-----------------|--------------|---|---|
| | (Winter-) Gerste (extenso) _____ ha | | | | | |
| Herbst | Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Aduka | 0.6 l | | Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen. |
| | | unterstützt die Gräserwirkung | + Arlit | + 1-2 l | | |
| | Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Trinity* | 2 l | * | Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung. |
| | | unterstützt die Gräserwirkung | + Arlit | + 1-1.5 l | | |
| | Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov. | Unkraut + Ungräser | Trinity* | 2 l | * | |
| | | inkl. Raigras-Horste | + Grant | + 0.9 l | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------|--------|---|--|
| Frühjahr | Gräser ohne Unkraut | Ungräser (ungenügend auf einj. Rispe) | Grant | 1.2 l | | bis BBCH 32 (2-Knoten) >10° |
| | Einjährige Rispengras | einjährige Rispe + Unkraut | Zepter | 200 g | | bis BBCH 29 (Bestockung) >10° |
| | Kor.: Blacken, Disteln, Mohn, Raps | Unkraut (ohne Klebern, Winden) | Biplay SX* | 45 g | * | bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >10° |
| | Kor.: Disteln, Raps, Kornblume | Unkraut (ohne Klebern, Ehrenpreis) | Taxi SX | 45 g | | bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >10° |
| | Kor.: Klebern, Blacken, Taubnessel | Unkraut (ohne Disteln, Raps) | Pixxaro EC | 0.5 l | | bis BBCH 39 (Fahnenblatt) > 5° |
| | Kor.: Klebern, Disteln | Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel) | Starane XL | 1.8 l | | bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >15° |
| | Kor.: Blacken, Winden, Klebern | Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel) | Hoestar | 40 g | | bis BBCH 49 (Ähreschieben) >15° |
| | Breite Tankmischung auf Unkräuter und Ungräser | Ungräser | Grant | 1.2 l | | bis BBCH 32 (2-Knoten) breite, komplette Tankmischung mit vitalisierender Blattdüngung |
| | | div. Unkräuter | + Biplay SX* | 25 g | * | |
| | | | + Pixxaro EC | 0.3 l | | |
| | | Schwefeldüngung | + Sulfix | 3 l | | |
| | Blattdüngung Mg, S, Mn, Zn | | + Epso Combitop | 6-8 kg | | |

| Produkte mit Anwendungs-Auflagen | SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen) | Spe 2 (Anwendungs-Verbote) | | | Spe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen) | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-----------|
| | Einsatz / Jahr (Jahre) | S2 | Sh | Karst | Abdrift | Abschwemm |
| Trinity | - | X | - | - | 20 m | 1 Punkt |
| Biplay SX | Verkauf bis 01.10.2026 / aufbrauchen bis 01.10.2027 | - | - | - | - | 1 Punkt |
| Bronco Top | max. 1 Behandlung (SDHI) / Jahr | - | - | - | 6 m | 1 Punkt |
| Aduka | | - | - | - | 6 m | 2 Punkte |

Unabhängig vom Produkt muss im ÖLN zur Verminderung von Abdrift und Abschwemmung mindestens 1 Punkt erreicht werden.