


2026 Erdbeere

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid Fj. bis spätestens Blühbeginn												
Beetup 160 EC W-6938-1	Unkräuter	0-59	1	0 l/ha							Kein Einsatz mehr, Anwendung verboten!!!!	
+ Fusilade Max W-6085	Ungräser	0-59	1	1.5 l/ha	1.5 l	42					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.	
1. Austrieb												
Alfil WG Stähler W-7605	Rote Wurzelfäule, Rhizomfäule	10-19	1	5 kg/ha	5 kg							
+ AminoCare Plus		10-19	1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor		10-19	1	1 l/ha	1 l							
2. Austriebsspritzung												
Kumulus WG W-4458	Echter Mehltau	55	1	2 - 2 kg/ha	2 kg							

2026 Erdbeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Vorblütenbehandlung												
Slick Syngenta W-5056	Echter Mehltau	57	1	0.5 l/ha	0.5 l	21				2P	●	
+ Topas Vino W-4260	Echter Mehltau	57	1	0.25 l/ha	0.25 l	21	S2 + Sh					
evtl. Kiron W-4579	Spinnmilben, Erdbeermilbe	57	1	2 l/ha	2 l	21		G20	1P		Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
evtl. Audienz Omya W-6020	Thripse, Erdbeerblütenstecher	57	1	0.2 l/ha	200 ml	3						
AminoCare Plus		57	1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor		57	1	1 l/ha	1 l							
evtl. Einsatz Nützlinge												
Majuscupak W-7456			1	0 Stk/ha								
Blühbeginn												
Moon Privilege W-6828	Graufäule (Botrytis cinerea), Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten	61	1	0.5 l/ha	0.5 l	14					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
Calstar		61	1	5 l/ha	5 l							
AminoCare Plus		61	1	2 l/ha	2 l							
1. Vollblüte												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)	65	1	1 kg/ha	1 kg	14					●	

2026 Erdbeere



Fläche 1 ha


Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Vollblüte												
Flint Bayer W-5994	Blattfleckenkrankheiten der Erdbeere, Echter Mehltau der Erdbeere, Graufäule (Botrytis cinerea)	65	1	300 g/ha	0.3 kg	14	S2 + Sh	G6	2P			
1. Botrytis												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)	81	1	1 kg/ha	1 kg	14					● Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr.	
Calstar		81	1	5 l/ha	5 l							
2. Botrytisspritzung												
Saphire Syngenta W-5361	Graufäule (Botrytis cinerea)	67	1	0.5 kg/ha	0.5 kg	3					●	
oder Amylo X W-7151	Graufäule (Botrytis cinerea)	67	1	2.5 kg/ha	2.5 kg							
vor dem Stroheinlegen												

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

2026 Heidelbeere

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
erste neue Blätter												
Blühknospen sichtbar												
Armicarb W-6432	Echter Mehltau		1	4 kg/ha	4 kg	3						
Switch Syngenta W-5218	Zweig- und Beerenkrankheit, Graufäule (Botrytis cinerea)		1	1 kg/ha	1 kg	7		G20		●	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
AminoCare Plus			1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor			1	0 l/ha								

2026 Heidelbeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Vorblüte												
Flint Bayer W-5994	Zweig- und Beerenkrankheit, Graufäule (Botrytis cinerea)		1	300 g/ha	0.3 kg	14	S2 + Sh	G20 W3	2P			
evtl. Pirimor Syngenta W-1899	Gemeine Kommaschildlaus, Blattläuse (Röhrenläuse)		1	0.4 kg/ha	400 g	21		G20	1P	●		
evtl. Kiron W-4579	Spinnmilben		1	2 l/ha	2 l	21		G50 B6	1P		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
AminoCare Plus			1	2 l/ha	2 l							
Blütenspritzung												
Switch Syngenta W-5218	Zweig- und Beerenkrankheit, Graufäule (Botrytis cinerea)		1	1 kg/ha	1 kg	7		G20		●		
Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
Nachblüte												
Flint Bayer W-5994	Zweig- und Beerenkrankheit, Graufäule (Botrytis cinerea)		1	300 g/ha	0.3 kg	14	S2 + Sh	G20 W3	2P			
+ AminoCare Plus			1	2 l/ha	2 l							
+ Calstar			1	5 l/ha	5 l							

2026 Heidelbeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Vorernte												
Teldor W-5751	Graufäule (Botrytis cinerea)		1	1.5 kg/ha	1.5 kg	7		G6				
+ Calstar			1	5 l/ha	5 l							

Bemerkungen


La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial

2026 Brombeere

Fläche 1 ha



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Herbizid 1-2 Wochen nach Neupflanzung bzw. Neuaustrieb												
Stomp Aqua BASF W-6880	Einjährige Ungräser, Einjährige Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						●	
Austriebsspritzung												
Curenox 50 WG W-6556	Rutenkrankheiten der Himbeere, Rutenkrankheiten der Brombeere	51	1	2 KG	2 kg							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.
Parafol netto W-1454-2	Spinnmilben, Frostspanner, Napfschildläuse	51	1	35 l/ha	35 l							
2. Herbizid												
Stomp Aqua BASF W-6880	Einjährige Ungräser, Einjährige Unkräuter		1	3 l/ha	3 l						●	
Fusilade Max W-6085	Mehrfjährige Ungräser		1	3 l/ha	3 l							Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
1. Vorblüte												
Ridomil Vino W-5975	Falscher Mehltau der Brombeere	55	1	2.25 kg/ha	2.25 kg	21		G20				Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
+ Kumulus WG W-4458	Gallmilben	55	1	10 kg/ha	10 kg							

2026 Brombeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Vorblüte												
Ridomil Vino W-5975	Falscher Mehltau der Brombeere	55	1	2.25 kg/ha	2.25 kg	21		G20			Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
Kumulus WG W-4458	Gallmilben	55	1	10 kg/ha	10 kg							
3. Vorblüte												
Flint Bayer W-5994	Rutenkrankheiten, Roste	55	1	200 g/ha	0.2 kg		S2 + Sh	G20 W3	1P			
evtl. Milbeknock W-6526	Spinnmilben, Brombeermilbe	55	1	1.25 l/ha	1.25 l			G50			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evtl. Pirimor Syngenta W-1899	Blattläuse (Röhrenläuse)	55	1	0.4 kg/ha	400 g	21		G20	1P	●		
+ AminoCare Plus		55	1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor		55	1	1 l/ha	1 l							
Blühbeginn												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)	61	1	1 kg/ha	1 kg	14		G20		●		
Calstar		61	1	3 l/ha	3 l							
1. Vollblüte												
Moon Sensation W-6961	Graufäule (Botrytis cinerea)	65	1	0.8 l/ha	0.8 l	14	S2 + Sh	G20 W3	2P			
+ AminoCare Plus		65	1	2 l/ha	2 l							
2. Vollblüte												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)	65	1	1 kg/ha	1 kg	14		G20		●		
Spritzung Ende Blüte												
Moon Sensation W-6961	Graufäule (Botrytis cinerea)	69	1	0.8 l/ha	0.8 l	14	S2 + Sh	G20 W3	2P			
AminoCare Plus		69	1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor		69	1	0.5 l/ha	0.5 l							

2026 Brombeere




Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Vorerntebehandlung												
Amylo X W-7151	Graufäule (Botrytis cinerea)	79	1	2.5 kg/ha	2.5 kg						Maximal 6 Behandlungen pro Jahr im Abstand von mindestens 7 Tagen.	
+ Calstar		79	1	0 l/ha								
2. Vorerntebehandlung												
Amylo X W-7151	Graufäule (Botrytis cinerea)	81	1	2.5 kg/ha	2.5 kg						Maximal 6 Behandlungen pro Jahr im Abstand von mindestens 7 Tagen.	
Calstar		81	1	3 l/ha	3 l							
3. Vorerntebehandlung												
Amylo X W-7151	Graufäule (Botrytis cinerea)	89	1	2.5 kg/ha	2.5 kg						Maximal 6 Behandlungen pro Jahr im Abstand von mindestens 7 Tagen.	
+ Calstar		89	1	0 l/ha								
KEF												
Audienz Omya W-6020	Kirschessigfliege		1	0.2 l/ha	200 ml	3					Gefährlich für Bienen	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial



Berater Wolfram Lempp
Tel. +41 79 578 84 19

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Herbizid 1-2 Wochen nach dem Pflanzen bzw. Neuaustrieb											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Stomp Aqua BASF W-6880	Ungräser und Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						● Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
Spritzung Austrieb												
Curenox 50 WG W-6556	Rutenkrankheiten		1	2 KG	2 kg						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Atemschutzmaske (P3) tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
Parafol netto W-1454-2	Spinnmilben, Frostspanner, Napfschildläuse		1	35 l/ha	35 l							
2. Herbizid ca. 3 Wochen nach 1. Behandlung												
Stomp Aqua BASF W-6880	Ungräser und Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						● Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Keine Anwendung auf Sandböden.	
Fusilade Max W-6085	Ungräser		1	2 l/ha	2 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.	
Giessen bis Blütenknospen sichtbar											Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha	
Ridomil Vino W-5975	Wurzelsterben		1	0.5 %	5 kg					1P	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	

2026 Himbeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Vorblüte												Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha
Slick Syngenta W-5056	Rost		1	0.5 l/ha	0.5 l			G20		●		
Flint Bayer W-5994	Rutenkrankheiten, Rost		1	200 g/ha	0.2 kg		S2 + Sh	G20 W3	1P			
Kumulus WG W-4458	Gallmilben		1	10 kg/ha	10 kg							
3. Herbizid												
MCPB 400 Schneiter W-5165	Zaunwinde, Ackerwinde		1	4 l/ha	4 l							
2. Vorblüte												Wasseraufwandmenge: 1000 l/ha
Flint Bayer W-5994	Rutenkrankheiten, Rost		1	200 g/ha	0.2 kg		S2 + Sh	G20 W3	1P			
Kumulus WG W-4458	Gallmilben		1	7 kg/ha	7 kg							
Hasorgan Profi Landor			1	3 l/ha	3 l							
Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							
Spritzung Blühbeginn												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)		1	1 kg/ha	1 kg	14		G20		●	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.	
Kumulus WG W-4458	Gallmilben		1	7 kg/ha	7 kg							
Spritzung Vollblüte												
Moon Sensation W-6961	Graufäule (Botrytis cinerea), Rutenkrankheiten der Himbeere, Rost der Himbeere		1	0.8 l/ha	0.8 l	14	S2 + Sh	G20 W3	2P			
Spritzung Ende Blüte												
Switch Syngenta W-5218	Graufäule (Botrytis cinerea)		1	1 kg/ha	1 kg	14		G20		●		
AminoCare Plus			1	2 l/ha	2 l							
Borstar Landor			1	1 l/ha	1 l							

2026 Himbeere



Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
KEF												
Audienz Omya W-6020	Kirschessigfliege		1	0.2 l/ha	200 ml	3					Gefährlich für Bienen, ausserhalb des Bienenfluges am Abend einsetzen	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial