

Mais – Spritzplan 2026



Problem / Zeitpunkt		Wirkungs-Schwerpunkte		Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung
Unkrautbekämpfung im Mais (Tankmischungen)					Fläche _____ ha		
Frässaat / Mulchsaat	Totalherbizid vor Frässaat oder Blacken-/ Winden-Schachtelhalmsanierung	Grasnarbe / Wiese abspritzen Bei Verunkrautung im Stoppelfeld mit	Glyfosate (div. Produkte)		4 - 6 l		In die Grasnarbe innert 36 Std. nach dem Schnitt oder nach 5 cm Wiederaustrieb (max. 1.5 l/ha «Glyphosate-Wirkstoff» damit die Ressourceneffizienzbeiträge „pfluglos“ gelten) mit 200 l Wasser / ha auf trockene Pflanzen applizieren
		Stoppelfeld (Winden, Schachtelhal, Blacken mit genügend aktiver Blattmasse)	+ ev. 2,4-D plus		1.5 l	*	
		PH-Wert-Absenkung / Wasserenthärtung (Checkpoint immer vor Toxer / Kyleo einfüllen)	+ Checkpoint		0.5-2 dl/100 l (bis Wasser färbt)		
Breite Wirkung auf Gräser, Unkräuter (inkl. Raigras, Quecke)	Unkraut + Raigras + Hirsen	Azur Mais *		2 l	*	2-6 Blatt-Stadium (nicht gleich nach starken Niederschlägen)	
	Bodenherbizid (Versiegelung)	+ Loper		1.2 l			
	bei Blacken, Winden, Disteln	+ ev. Lunar		1 l			
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxysol	350-500 g				
	Blattdüngung MG, S, Bor	+ Epso Bortop	5-10 kg				
offene Ackerfläche / Plug	Unkraut + Ungräser inkl. Hirse	Barst		1.5 l		1-3 Blatt-Stadium Boden-Herbizid betont oder 4-8 Blatt-Stadium Blatt-Herbizid betont Lunar nur bis 6-Blatt Stadium einsetzen! Oxysol und Bortop immer möglich.	
	Bodenherbizid (Versiegelung)	+ Hysan Aqua		2.5 l			
	Bodenherbizid (Versiegelung)	+ Loper		1.2 l			
	bei Blacken, Winden, Disteln	+ ev. Lunar		1 l			
	Unkraut + Ungräser inkl. Hirse	Barst		2 l			
	Bodenherbizid (Versiegelung)	+ Loper oder Hysan Aqua	1.2 l oder 2.5 l				
	bei Blacken, Winden, Disteln	+ ev. Lunar		1 l			
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxysol	350-500 g				
	Blattdüngung MG, S, Bor	+ Epso Bortop	5-10 kg				
Sehr breites Wirkung	Unkraut + Raigras + Hirsen	Azur Mais *		1.5 l	*	2-6 Blatt-Stadium Anforderungen der Boden-Herbizide: Produkt Wasserbedarf Halbzeitwert Hysan Aqua gross 100 Tage Loper gering 16 Tage Bodenherbizid den Bedingungen anpassen (Loper ab 2026 nur noch bis 2-Blatt bewilligt)	
	Unkraut + Hirsen (inkl. Fingerhirse)	+ Barst		1.5 l			
	Bodenherbizid (Versiegelung)	+ Loper oder Hysan Aqua	1.2 l oder 2.5 l				
	bei Blacken, Winden, Disteln	+ ev. Lunar		1 l			
	Pflanzenstärkung / vitalisierend	+ Oxysol	350-500 g				
	Blattdüngung MG, S, Bor	+ Epso Bortop	5-10 kg				
	Blattdüngung für vitale und ertragreiche Felder	Bakterien zur N-Fixierung	Utrisha N		333 g		Kurz vor Reihenschluss
Pflanzenstärkung / vitalisierend		+ Oxysol	350-500 g				
Blattdüngung MG, S, Bor		+ Epso Bortop	5-10 kg				
Schädlingsbekämpfung im Mais							
	Schneckenfrass	Schneckenlinsen	3 kg		beim Auflaufen auf Schnecken achten		
		oder Steiner Gold	5 kg				
Bekämpfung durch Schlupfwespen	Maiszünsler	Tricho-Karten	2 x 50 Karten/ha	ha	jeweils 2 Freilassungs-Termine Lieferung mit Postversand (nach Erhalt sofort freilassen)		
		oder Trico-Kugeln	2 x 100 Kugeln/ha	ha			
Auf Wunsch bringen wir die Tricho-Kugeln mittels Drohne direkt auf Ihrem Feld aus. Infos unter: Smart Farming Sky-Work Farming Drohnen-Service Trichonline Precision Farming - trichonline oder 079/816 84 73 (Pius Fleischmann)							
Empfohlene Düngungsvariante im Mais							
Zeitpunkt	Dünger	Menge/ha	Bemerkung				
Vor oder nach der Saat	Gülle	30-40 m3/ha	Die Düngungsvariante mit Novatec 26 hat sich in den letzten Jahre bewährt. Die N-Düngung wird zur Saat abgeschlossen. Dies benötigt keine Nachdüngung im 6-8 Blatt wenn oft der Regen fehlt.				
Zur Saat als Unterfuss	DAP (18 N + 46 P)	100-200 kg/ha					
Vor oder nach der Saat	Novatec 26 (26 N + 13 S)	300-400 kg/ha					
Blattdüngung mit Herbizid	Epso Bortop (Mg + S + B)	5 kg	Epso Produkte sind bei genügend starker Wachsschicht vom Mais mit dem Herbizid mischbar. Epso-Produkte nicht mit Ca und P Dünger mischen. (Complestal P Max + Epso-Produkte sind nicht mischbar)				
	Epso Combitop (Mg + S + Mn + Zn)	+ 5 kg					
Produkte mit Anwendungs-Auflagen	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)		SPe 2 (Anwendungs-Verbote)			SPe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)		S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
1-1.5 l/ha Azur Mais	max. 1 Behandlung / Jahr		-	-	-	6 m	1 Punkt
2 l/ha Azur Mais	max. 1 Behandlung / Jahr		-	-	-	6 m	2 Punkte
2.4-D Plus	max. 1 Behandlung / Jahr		-	-	-	20 m	1 Punkt
Unabhängig vom Produkt muss im ÖLN zur Verminderung von Abdrift und Abschwemmung mindestens 1 Punkt erreicht werden							