


Zuckerrüben 3-Split 2026

Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner											Wasseraufwandmenge: 300 l/ha	
Axcela W-6886	Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	10	1	7 kg/ha	7 kg							
oder Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	1	5 - 7 kg/ha	7 kg						Kein manuelles Ausbringen des Granulats. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln das Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Produkt sofort zusammenkehren und entfernen. Befüllen der Maschinen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabinen) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Erdflöhe mit Sonderbewilligung Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid											Wasseraufwandmenge: 300 l/ha	
Karate Zeon W-6098	Rübenerdflöhe	10-12	1	0.075 l/ha	0.075 l	42		G20		●	Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid Schadschwelle: Keimblatt-Stadium: 50% befallene Pflanzen, 2-Blatt-Stadium 80% befallene Pflanzen	
oder Decis Protech W-6381	Rübenerdflöhe	10-12	1	0.5 l/ha	0.5 l	42		G50	1P		Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid Schadschwelle: Keimblatt-Stadium: 50% befallene Pflanzen, 2-Blatt-Stadium 80% befallene Pflanzen evt. als 2. Behandlung	

Zuckerrüben 3-Split 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Blattläuse: Spritzfolge gemäss Kant. Fachstelle											Wasseraufwandmenge: 300 l/ha	
1. Teppeki	Grüne Blattlaus	10	1	140 g/ha	140 g						gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
2. Movento SC	Grüne Blattlaus	10	1	0.45 l/ha	0.45 l						gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
3. Gazelle SG	Grüne Blattlaus	10	1	200 g/ha	200 g						Braucht Sonderbewilligung gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
+ Mero W-5168	für bessere Benetzung	10	1	1 l/ha	1 l							
Herbizid 1. Split											Wasseraufwandmenge: 300 l/ha	
Sugaro Gold W-7087-1	Ungräser u. Unkräuter	10-12	1	3 - 1.5 l/ha	1.5 l						Vor- und Nachauflauf.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter	10-12	1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Lenacil Schneiter W-2485	Ausfallraps, Melden etc	10-12	1	0.05 - 0.1 kg/ha	0.1 kg				G20	1P	● Nachauflauf. Tiefere Aufwandmenge auf Mineralböden, höhere Aufwandmenge auf humusreichen Böden und Moorböden.	
oder Tanaris W-7320	speziell gegen Klebern u. Hundspeterli	10-12	1	0.3 l/ha	0.3 l		S2 + Sh + Karst		B3 W3		Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha.	

Zuckerrüben 3-Split 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 7 - 10 Tage später												
Metamitron 700 SC Syngenta W-6638-3	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 - 2 l/ha	2 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Venzar FMC PI I-4097	Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)		1	0.2 kg/ha	200 g					G20 1P ●		
oder Tanaris W-7320	Klebern, Hundspeterli		1	0.6 l/ha	0.6 l		S2 + Sh + Karst	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmliges Hemd + lange Hose) tragen. SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha.	
evt. Mero W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 l/ha	0.5 l						zur Wirkungsverstärkung	

Zuckerrüben 3-Split 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 3. Split												
Metamitron 700 SC Syngenta W-6638-3	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser und Unkräuter		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evt Mero W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 - 1 l/ha	1 l						zur Wirkungsverstärkung	
Gräserherbizid												
Fusilade Max W-6085	Hirsen u. Gräser		1	1.5 - 3 l/ha	3 l	56					Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. gegen kleine Hirsen 1 lt zum Split beimischen	
oder Select Stähler W-6010	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)		1	0.5 - 1 l/ha	1 l		S2 + Sh	B6				
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 - 1 l/ha	1 l						Als Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden.	
Flüssigdünger												
Borstar Landor	gegen Bormangel		1	3 l/ha	3 l						kurz vor Reihenschluss	
1. Fungizid												
Spyrale Syngenta W-7031	Rost, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau		1	1 l/ha	1 l	28		G50	1P	●	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	

Zuckerrüben 3-Split 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
2. Fungizid 18 -21 Tage später											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Proline W-6339	Echter Mehltau , Rost, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	0.6 l/ha	0.6 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille + Atemschutzmaske (A2) tragen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
3. Fungizid 18 - 21 Tage später											Wasseraufwandmenge: 400 l/ha	
Spyrale Syngenta W-7031	Rost der Rüben, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau		1	1 l/ha	1 l	28		G50	1P	●	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotop (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial


Zuckerrüben Conviso 2026

Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner												
Axcela W-6886	Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	10	1	7 kg/ha	7 kg							
oder Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	1	5 - 7 kg/ha	7 kg						Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln das Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Produkt sofort zusammenkehren und entfernen. Befüllen der Maschinen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabinen) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	

Zuckerrüben Conviso 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Erdflöhe mit Sonderbewilligung Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid												
Karate Zeon W-6098	Rübenerdföhe	10-12	1	0.075 l/ha	0.075 l	42		G20			● SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Maximal 1 Behandlung pro Kultur. Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid Schadschwelle: Keimblatt-Stadium: 50% befallene Pflanzen, 2-Blatt-Stadium 80% befallene Pflanzen	
oder Decis Protech W-6381	Rübenerdföhe	10-12	1	0.5 l/ha	0.5 l	42		G50	1P		Braucht Sonderbewilligung. Mischbar mit Herbizid Schadschwelle: Keimblatt-Stadium: 50% befallene Pflanzen, 2-Blatt-Stadium 80% befallene Pflanzen Maximal 1 Behandlung pro Kultur. SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. evt. als 2. Behandlung	
Blattläuse: Spritzfolge gemäss Kant. Fachstelle												
1. Teppeki	Grüne Blattlaus	10	1	140 g/ha	140 g						gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
2. Movento SC	Grüne Blattlaus	10	1	0.45 l/ha	0.45 l						gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
3. Gazelle SG	Grüne Blattlaus	10	1	200 g/ha	200 g						Braucht Sonderbewilligung gegen Virusvektoren (übertragen Vergilbungsvirus), gemäss Warnung der Rübenfachstelle oder 50 % befallene Pflanzen	
+ Mero W-5168	für bessere Benetzung	10	1	0.5 - 1 l/ha	1 l							

Zuckerrüben Conviso 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 1. Split wenn Melden 2 echte Blätter aufweisen												
Conviso One netto W-7261	Mehrfährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	10-12	1	0.5 l/ha	0.5 l			G6 B6	1P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	10-12	1	1 l/ha	1 l							
+evt Tanaris W-7320	Ehrenpreisarten	10-12	1	0.7 l/ha	0.7 l		S2 + Sh	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. gute Wirkung bei kleinem Ehrenpreis	

Zuckerrüben Conviso 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 2 - 3 Wochen später Tage später												
Conviso One netto W-7261	Mehrfährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)		1	0.5 l/ha	0.5 l			G6 B6	2P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	1 l/ha	1 l							
evt Tanaris W-7320	Ehrenpreisarten		1	0.7 l/ha	0.7 l		S2 + Sh	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Gräserherbizid												
Fusilade Max W-6085	Hirsen u. Gräser		1	1.5 - 3 l/ha	3 l	56					gegen kleine Hirsen 1 lt zum Split beimischen Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
oder Select Stähler W-6010	Hirsen u. Gräser		1	0.5 - 1 l/ha	1 l		S2 + Sh	B6				
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 - 1 l/ha	1 l						Als Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden.	
Flüssigdünger												
Borstar Landor	gegen Bormangel		1	3 l/ha	3 l						vorbeugend einsetzen	

Zuckerrüben Conviso 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
1. Fungizid												
Spyrale Syngenta W-7031	Rost, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau der Rüben		1	1 l/ha	1 l	28		G50	1P	●	SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 1 Punkt reduziert werden. SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
2. Fungizid 18 -21 Tage später												
Proline W-6339	Echter Mehltau , Rost, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	0.6 l/ha	0.6 l						Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
3. Fungizid 18 - 21 Tage später												
Spyrale Syngenta W-7031	Rost der Rüben, Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau der Rüben		1	1 l/ha	1 l	28		G50	1P	●	SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen muss das Abschwemmungsrisiko gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle um 1 Punkt reduziert werden. SPe 3: Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.	
+ Funguran Flow W-6393	Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l	14					Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung Schutzhandschuhe + Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial


Zuckerrüben 3-Split IP Suisse 2026

Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner												
Axcela W-6886	Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	10	1	7 kg/ha	7 kg							
oder Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	1	5 - 7 kg/ha	7 kg						Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln das Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Produkt sofort zusammenkehren und entfernen. Befüllen der Maschinen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabinen) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	

Zuckerrüben 3-Split IP Suisse 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 1. Split												
Metamitron 700 SC Syngenta W-6638-3	Ungräser u. Unkräuter	10-12	1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter	10-12	1	1 - 1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Tanaris W-7320	speziell gegen Klebern u. Hundspeterli	10-12	1	0.3 l/ha	0.3 l		S2 + Sh + Karst	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha.	

Zuckerrüben 3-Split IP Suisse 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 2. Split 7 - 10 Tage später												
Metamitron 700 SC Syngenta W-6638-3	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 - 2 l/ha	2 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
+ Tanaris W-7320	Klebern, Hundspeterli		1	0.6 l/ha	0.6 l		S2 + Sh + Karst	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen. SPe 1 - Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha.	
evt. Mero W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 l/ha	0.5 l						zur Wirkungsverstärkung	
Herbizid 3. Split												
Metamitron 700 SC Syngenta W-6638-3	Ungräser u. Unkräuter		1	1.5 l/ha	1.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	
+ Beta Star Schneiter W-6932-1	Ungräser und Unkräuter		1	2 - 2.5 l/ha	2.5 l						Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
evt Mero W-5168	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 - 1 l/ha	1 l						zur Wirkungsverstärkung	

Zuckerrüben 3-Split IP Suisse 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Gräserherbizid												
Fusilade Max W-6085	Hirsen u. Gräser		1	1.5 - 3 l/ha	3 l	56					gegen kleine Hirsen 1 lt zum Split beimischen Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
oder Select Stähler W-6010	Hirsen u. Gräser		1	0.5 - 1 l/ha	1 l		S2 + Sh	B6				
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	1 l/ha	1 l						Als Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden.	
Flüssigdünger												
Borstar Landor	gegen Bormangel	30	1	3 l/ha	3 l						kurz vor Reihenschluss	
Flüssigdünger mit Cu												
Cuprostar			1	0.33 l/ha	0.33 l						max. 100 g Reinkupfer/ha und Jahr	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial


Zuckerrüben Conviso IP-Suisse 2026

Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha



Berater Harald Reiner
Tel. +41 79 128 60 18



Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Schneckenkörner												
Axcela W-6886	Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten	10	1	7 kg/ha	7 kg							
oder Carakol 5 W-7057-2	Schnecken	10	1	5 - 7 kg/ha	7 kg						Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln das Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Produkt sofort zusammenkehren und entfernen. Befüllen der Maschinen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabinen) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.	

Zuckerrüben Conviso IP-Suisse 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid 1. Split												
Conviso One netto W-7261	Mehrfährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)	10-12	1	0.5 l/ha	0.5 l			G6 B6	2P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens	10-12	1	1 l/ha	1 l							
+ Tanaris W-7320	gegen Ehrenpreisarten	10-12	1	0.7 l/ha	0.7 l		S2 + Sh	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	
Herbizid 2. Split 2 - 3 Wochen später Tage später												
Conviso One netto W-7261	Mehrfährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser), Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Mehrjährige Dicotyledonen (Unkräuter)		1	0.5 l/ha	0.5 l			G6 B6	2P			
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	1 l/ha	1 l							
+evt Tanaris W-7320	gegen Ehrenpreisarten		1	0.7 l/ha	0.7 l		S2 + Sh	B3 W3			Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten (inkl. Erntearbeiten) in behandelten Kulturen: Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd + lange Hose) tragen.	

Zuckerrüben Conviso IP-Suisse 2026



Variante Musterspritzplan

Fläche 1 ha

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Gräserherbizid												
Fusilade Max W-6085	Hirsen u. Gräser		1	1.5 - 3 l/ha	3 l	56					gegen kleine Hirsen 1 lt zum Split beimischen Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.	
oder Select Stähler W-6010	Hirsen u. Gräser		1	0.5 - 1 l/ha	1 l		S2 + Sh	B6				
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		1	0.5 - 1 l/ha	1 l						Als Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden.	
Flüssigdünger												
Borstar Landor	gegen Bormangel		1	3 l/ha	3 l						vorbeugend einsetzen kurz vor Reihenschluss	
Flüssigdünger mit Cu												
Cuprostar			1	0.33 l/ha	0.33 l						max .100 g Reinkupfer/ha u. Jahr	

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartefrist in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial