





Stadium	Fungizide (l, kg/ha)	Insektizide, Akarizide, Ernährung (l, kg/ha)	Ergänzungen (l, kg/ha)	Bemerkungen
Austrieb 	Schrotschuss / Narrenkrankheit Zwetschge Kocide 2000 4,0–6,4 kg oder Bordeaux S 8,0–12,0 kg oder Oxykupfer 35 6,9 kg Cupric Flow 8,0–12,0 l Atollan 0,8 kg	Austernschildläuse / Frostspanner / Rote Spinne Napfschildläuse / Gallmilben Zofal D 56,0 l (Stadium B–C) oder Zofal R 30,0–40,0 l/ha (Stadium B–C)	Kocide 2000 , Oxykupfer 35 , Bordeaux S Max. 4 kg Reinkupfer / ha / Jahr Zofal D : Rote Spinne 32 l (Stad. D) Zofal D : Rote Spinne 16 l (Stad. E) Atollan : Nicht mit Zofal D mischen. Max. 2,4 kg / ha / Jahr	
Vorblüte 	Schrotschuss Atollan 0,8 kg Monilia / Schrotschuss Slick 0,32 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg Amistar 1,6 l Monilia / Schrotschuss bei Kirsche Fezan 0,48 l + Atollan 0,48 kg Schrotschuss / Zwetschgenrost Sufralo 4,8–12,0 kg	Frostspanner Elvis 0,32 l oder Wormox 0,8 kg Schalenwickler Elvis 0,32 l oder Wormox 1 kg Läuse Gazelle SG 0,24 kg oder Pirimor 0,64 kg Rote Spinne / gem. Spinnmilbe Nissostar 0,32 l Oleate 20 5–15 l (Blattläuse, Spinnmilben) Ernährung: alle Spritzungen Goëmar Start 2,0 l oder Goëmar Multi 2,0 l Naturamin WSP 1,0 kg Lufix 1,0–2,0 l (UV-Schutz)	Wormox : Nicht bei kalter Witterung, >12 °C, pH < 8 Nissostar : + Sticker 0,15 l Goëmar Start : Algenfiltrat mit Bor, Mg, Mo, SO ₃ Goëmar Multi : Algenfiltrat mit Bor Ab Ballonstadium bis abgehende Blüte Sufralo : Max. 5 kg / Behandlung Nebenwirkung Rostmilben	
Blüte 	Monilia / Schrotschuss Slick 0,32 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg Amistar 1,6 l Monilia / Schrotschuss bei Kirsche Fezan 0,48 l + Atollan 0,48 kg Blüten- und Zweigdürre bei Zwetschge Avatar 1,0 kg oder Trezor 1,6 kg/ha Blüten- und Zweigdürre Kirschen, TW Armcarb 3,2 kg oder Trezor 1,6 kg/ha	Ernährung: alle Spritzungen Goëmar Start 2,0 l Goëmar Multi 2,0 l Naturamin WSP 1,0 kg Schalenwickler (Verwirrung) CheckMate Puffer Leaf Multi Ausdünnen Zwetschge Armcarb 10–15 kg	Prävention Frost: Naturamin WSP GreenOn Plus : Mehrnährstoffdünger mit Mg 1–3× 0,5 kg/ha Amistar : Bis Ende Blüte, 3× / Jahr CheckMate Puffer Leaf Multi : Kontakt mit Stähler Aussendienst Montage : Vorblüte Fezan Kirsche: 4× / Jahr, Blüte bis Schorniggestadium Folpet 80 WDG : 2,0 kg	
Nachblüte 	Monilia / Schrotschuss / Sprühflecken / Bitterfäule Slick 0,32 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg Monilia / Schrotschuss bei Kirsche Fezan 0,48 l + Atollan 0,48 kg	Ernährung: Alle Spritzungen Goëmar Start 2,0 l Goëmar Multi 2,0 l ReadiCal 2,0 kg Röteln bei Kirsche Dirigol N 320 g + Lufix 1,0–2,0 l Schalenwickler Elvis 0,32 l oder Wormox 1,0 kg Röhrenläuse / Sägewespe bei Zwetschge Gazelle SG 0,24 kg Oleate 20 5–15 l (Blattläuse, Spinnmilben)	Goëmar Start : Algenfiltrat mit Bor, Mg, Mo, SO ₃ Goëmar Multi : Algenfiltrat mit Bor Slick : 4× / Jahr	
Beginn Fruchtreife  	Monilia / Schrotschuss / Sprühflecken / Bitterfäule Slick 0,32 l + Atollan 0,48 kg oder + Captan S WG 1,6 kg Schrotschuss Sufralo 4,8–8,0 kg Frucht-Monilia bei Zwetschge Avatar 1,0 kg Frucht-Monilia bei Kirsche und Zwetschge Trezor 1,6 kg/ha Zwetschge: Slick 0,32 l + (Atollan 0,48 kg) oder + Captan S WG 1,6 kg	Röhrenläuse Pirimor 0,64 kg Rote Spinne Nissostar 0,32 l Läuse / Kirschenfliege Oleate 20 5–15 l (Blattläuse, Spinnmilben) Gazelle SG 0,32 kg Kirschenfliege WF 14 Tage Kirschessigfliege Kirschen Elvis 0,32 l, Wartefrist 7 Tage Gazelle SG 0,32 kg, Wartefrist 7 Tage (gemäss Allgemeinverfügung BLV / Jahr) Kirschessigfliege Zwetschgen Elvis 0,32 l, Wartefrist 7 Tage Gazelle SG 0,32 kg, Wartefrist 14 Tage (gemäss Allgemeinverfügung BLV / Jahr) Pflaumenwickler Atac 3,2 kg Qualität und Calciumernährung Calshine 2,4 l	Pirimor : Zur Haftverstärkung Sticker 0,15 l 2× / Jahr Nissostar : 1× / Jahr. Bis Ende Juni Oleate 20 : Wartefrist 3 Wochen Gazelle SG : 2× / Kultur / Jahr Atollan : Wartefrist 3 Wochen Wormox : Schalenwickler 1,0 kg, WF 2 Tage Trezor : Wartefrist 3 Wochen Obstkulturen ohne Regenabdeckung: Wartefrist 10 Tage Slick + Atollan oder Captan : WF 3 Wochen Atac Zw. : Nur in Obstanlagen, WF 3 Wochen gemäss Allgemeinverfügung BLV / Jahr 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr in Hoch- und Halbstammkulturen	
Nach der Ernte	Bakterienbrand bei Kirsche Kocide 2000 4,0–6,4 kg oder Bordeaux S 8,0–12,0 kg oder Oxykupfer 35 6,9 kg. Bei Blattfall Cupric Flow 8,0–12,0 l Kirschenblattlaus Surround 32,0 kg	Ernährung: Goëmar Start 2,0 l oder Goëmar Opti 2,0 l	Goëmar Opti : Algenfiltrat mit Mg, Zink, SO ₃ N-Power : 5–10 l/ha	

Herbizide	Behandelte Fläche	Verschiedenes	
Bis August	Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha (ab 2. Standjahr) Natrel 16 l (ab 2. Standjahr) Mizuki 1,25–2,5 l/ha (ab 3. Standjahr) 2 x / Jahr	Gondor 0,5 l/ha Lufix 1,0–2,0 l/ha Heliofix 0,5 l/ha Sticker 0,15 l/ha Triagol 2,5 l/ha / Radi S 3× 3–5 l/ha Prosulf GR / Sulfo S 2,0–3,0 l X-Change 0,15–0,2 l/100 l Anti-Mousse S 10–45 ml/200 l Vapi Clean 500 ml/100 l	Fördert die Benetzung, reduziert Abdrift UV-Schutz Netzmittel Verbessert die Haftfähigkeit Bodenverbesserer, Mikronährstoffe Granulierter und flüssiger Schwefelblattdünger Korrigiert Wasserhärte und pH-Wert Schaumstopp, vor PSM in den Tank Spezialreiniger für Pflanzenschutz-Spritzgeräte
Ganze Saison	Exelor 1,5–2,5 l/ha (ab 2. Standjahr) 1× / Jahr Xenturion 1,0–3,0 l/ha (ab 1. Standjahr) 1× / Jahr (Gräser und Hirsen)		



Produkte	W-Nummer	kg, l / ha	%	kg, l / ha	%	Formul.	Kirsche	Zwetschge	Gewässer Abstand	Spezielle Auflagen	Einschränkungen (ÖLN)	Behandlungen max. / Jahr	Wartezeit (Wochen)	Gefährlich für Bienen
Amistar	W-5481-2	1,6	0,1			SC	•	•	20 m	Verbot S2		3	bis Ende Blüte	
Armicarb	W-6432	3,2	0,2			SP	•				während der Blüte			
Armicarb	W-6432			10–15	1,0–1,5	SP		•			Ausdünnen während der Blüte			
Atollan	W-5417-1	0,8	0,05	0,48	0,03	WG	•	•	50 m		max. 2,4 kg / ha / Jahr		3	
Avatar	W-5218-2	1,0	0,06			WG		•	20 m			3	3	
Bordeaux S	W-2116-1	8,0–12,0	0,5–0,75			WG	•	•			max. 4,0 kg RK / ha / Jahr			
Captan S WG	W-6246	2,4	0,15	1,6	0,1	WG	•	•	20 m			10	3	
Captan WG	W-7201	2,4	0,15	1,6	0,1	WG	•	•	20 m			10	3	
Cuprix Flow	W-2710-4	8,0–12,0	0,5–0,75			SC	•	•			max. 4,0 kg RK / ha / Jahr			
Fezan	W-6589-2	0,48	0,03			EC	•		20 m		Blüte bis Schornigeltadium	4		
Folpet 80 WDG	W-6660-1	2,0	0,125	1,4	0,1	WG	•	•	20 m				3	
Kocide 2000	W-7010-1	4,0–6,4	0,25–0,4			WG	•	•			max. 4,0 kg RK / ha / Jahr			
Oxykupfer 35	W-7315-1	6,9	0,43			WP	•	•			max. 4,0 kg RK / ha / Jahr			
Slick	W-5056-2	0,32	0,02			EC	•	•	20 m	1 P. AS	+ Mischpartner	4	3	
Sufralo	W-18-1	4,8	0,3	3,2	0,2	WG	•	•					3	
Trezor	W-5751-1	1,6	0,1			WG	•	•				2	3 (10 Tage)	
Calshine		2,4	0,15			SC	•	•					2	
Dirigol N	W-3004	0,32				WP	•				abgehende Blüte			
Goëmar Start / Multi		2,0	0,125			SC	•	•						
GreenOn Plus		0,5	0,03			SG	•	•						
Heliofix	W-7491	0,5				EC	•	•					15 Tage	
Lufix		2,0				EC	•	•						
Naturamin WSP		1,0				WSP	•	•						
N-Power		5,0–10,0				SL	•	•						
Prosulf GR / Sulfo S		2,0–3,0				GR / ST	•	•						
ReadiCal		2,5				WP	•	•						
Triagol		2,5				SL	•	•						
Vapi Clean			0,5	1 l/100 l		ST	•	•						
Vitex – Die homöopathische Produktlinie									Kontakt mit Stähler Aussendienst					
Atac	W-6748-3	3,2	0,2			SG		•	50 m	100 m, Biotop	Nur in Obstanlagen	2	3	•
CheckMate Leaf M	W-7523					VP	•	•		1–2 ha	Kontakt mit Stähler Aussendienst			
Cobra Forte	W-7606	3–5 Pellets	pro 3–10 m			GE	•	•						
Elvis	W-6020-2	0,32	0,02			SC	•		20 m		Kirschessigfliege	2	7 Tage	•
Elvis	W-6020-2	0,32	0,02			SC		•	20 m		Kirschessigfliege (Allgemeinverf.)	2	7 Tage	•
Gazelle SG	W-6581	0,24	0,015			SG	•	•	20 m		max. 1 Behandlung/Blattlausart	2	3	•
Gazelle SG	W-6581	0,32	0,02			SG	•	•	20 m		Kirschenfliege	2	2	•
Gazelle SG	W-6581	0,32	0,02			SG	•	•	20 m		Kirschessigfliege (Allgemeinverf.)		7 Tage	•
Gazelle SG	W-6581			0,32	0,02	SG		•	20 m		Kirschessigfliege (Allgemeinverf.)		14 Tage	•
Nissostar	W-6982	0,32	0,02			SC	•	•	50 m		1 Behandlung bis Ende Juni		3	
Oleate 20	W-5761	5,0–15,0				SC	•	•			max. 30 l/ha (3%)		3	
Pirimor	W-1899-1	0,64	0,04			SG	•	•	50 m	20 m, Biotop	1 Behandlung / Jahr / Blattlausart	2	3	•
Wormox	W-7380	0,8	0,05	1,0	0,06	WP	•	•					2 Tage	
Zofal D	W-1526	56,0	3,5	32,0	2,0	EC	•	•			nicht mit Atollan mischen			
Zofal R	W-5168-3	30,0	2,0	40,0	2,5	EC	•	•						
Exelor	W-4220	1,5–2,5				SL	•	•			ab 2. Standjahr, 1 Behandlung			
Mizuki	W-7340-1	1,5–2,5	0,5			EC	•	•	20m, 3P. AS		ab 3. Standjahr	2		
Natrel	W-7319	16,0				EC	•	•			ab 2. Standjahr	2	Mai–August	
Roundup PowerMax	W-6646-1	1,5–7,5				SL	•	•			ab 2. Standjahr		bis Ende Aug.	
Xenturion	W-6085-3	1,0–3,0				EC	•	•			ab 1. Standjahr	1	4	

Anwenderschutz der Stähler Produkte auf den Sicherheitsdatenblättern und den Technischen Merkblättern beachten.

Reihenfolge der Produktzugabe bei Tankmischungen Etikettentext und Technisches Merkblatt beachten!

1. Tank 3/4 mit Wasser füllen, Wasseroptimierer (reduzieren Wasserhärte oder pH mit X-Change), Anti-Mousse S
2. Granulate und Pulver (WP, WG, SG) oder andere, nicht erwähnte Formulierungen (ST)
3. Suspensionskonzentrate (SC) oder andere, nicht erwähnte flüssige Formulierungen
4. Emulsionskonzentrate (EC). Vorsicht bei Tankmischungen
5. Haftmittel (Netzmittel), Öle oder Lufix / Heliofix
6. Flüssigdünger
7. Brühe sofort ausbringen / Tank reinigen

Problematische Punkte

Bei folgenden Produkten ist erhöhte Vorsicht geboten:

- Blattdünger mit hohen Salzgehalten (= hoher Gesamtgehalt an Nährstoffen)
Diese Produkte können heute oft mit folgenden Stähler-Produkten ersetzt werden:
Calshine bei CA-Behandlungen
Goëmar-Produkte zur Ernährung

Angaben zum Betrieb

- Produktionsform (z.B. OELN, SwissGap, Abnehmer)
- Gewässerabstand, Abschwemmung (Parzelle, Kultur)
- Baumvolumen (1. Austrieb, 2. nach der Blüte)
- Verwirrung (Schalenwickler)
- Diverses
- Probleme Vorjahr

Allgemeinverfügungen BLV / Jahr sind nicht komplett aufgeführt!