



Berater Thomas Kim
Tel. +41 79 671 76 06

Produkt	Schaderreger	Stadium	ha	Menge	Total	WF	GS	D	A	R	Auflagen / Bemerkungen	Datum
Herbizid VA Voraufwurf auf feuchten Boden												
Spectrum BASF W-6075	Unkräuter, Ungräser	0	0	1.2 l/ha				B6 W6	1P		Voraufwurf.	
+ Clomastar PI F-6013	Unkräuter, Gräser	0	0	0.2 - 0.25 l/ha							Entspricht: Cargon S 1:1 mischbar!	
Schnecken												
Carakol 5 W-7057-2	Schnecken		0	5 - 7 kg/ha							Max. 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha / Jahr anwenden. Entspricht 14 kg / ha Carkol5!	
Unkraut Nachbehandlung NA												
Bolero BASF W-6099	Unkräuter	12	0	0.8 l/ha				B3		●		
+ Basagran SG BASF W-5320	Unkräuter	12	0	0.6 - 0.8 kg/ha			S2 + Sh + Karst	B3			Unkräuter im Keimblattstadium! nicht mehr als 0.96 kg des Wirkstoffs Bentazon pro Hektar auf derselben Parzelle innerhalb von 2 Jahren anwenden.	
Korrektur Gräser												
Fusilade Max PI D-7001	Hirsen, Gräser		0	1 - 3 l/ha		90						
oder Select Stähler W-6010	Ungräser, Hirsen		0	0.5 l/ha			S2 + Sh	B6			max. 1 Behandlung / Kultur	
+ Mero W-6720	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens		0	0.5 l/ha								

Bemerkungen

La = Lagerbestand, WF = Wartezeit in Tagen, GS = Verbot in Grundwasserzone, D=Auflage Pufferzone Drift [m] entlang von: Oberflächengewässern (G), Biotope (B), Wohnflächen und öffentlichen Anlagen (W), blühenden Pflanzen (P), A = Reduktion Abschwemmungsrisiko [Punkte], R = PSM mit besonderem Risikopotenzial