

Sprinter bietet das Grundgerüst und ist bei einer schwachen Verunkrautung in Sol oanwendung ausreichend.
Im Raum Oberthurgau ist in der Tankmischung 130 g Sprinter meist ausreichend. Im westlichen Thurgau und Raum Zürich ist 150-200 g Sprinter in der Tankmischung empfohlen.
Bei Ackerfuchsschwanz-Standorten ist eine Herbstbehandlung oder die Tankmischung Sprinter + Agiliti bevorzugt.

1	= 1-Fungizid-Strategie (Rost-tolerante aber Septoria-anfällige Sorten)
1 + 2	= 2-Fungizid-Strategie (Rost- und Septoria-anfällige Sorten)
1 + 2 + 3	= 3-Fungizid-Strategie (Rost-, Septoria- und Fusarien-anfällige Sorten „Mykotoxin“ im Stroh) «Vorfrucht Mais ohne Pflug»

Produkte mit <u>Anwendungs-Auflagen</u>	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	SPe 2 (Anwendungs-Verbote)			SPe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Trinity, Sirocco	-	-	-	-	20 m	1 Punkt
Aduka	Verkauf bis 01.01.2026 / aufbrauchen bis 01.01.2027	-	-	-	6 m	2 Punkte
Bronco Top	max. 1 Behandlung (SDHI) / Jahr	-	-	-	6 m	1 Punkt

Unabhängig vom Produkt muss im ÖLN zur Verminderung von Abdrift und Abschwemmung mindestens 1 Punkt erreicht werden.